



**ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា**

ប័ណ្ណបច្ចេកទេស ២០១៥/០១

**ជំងឺស្លឹកអូអ៊ីដ្យូមឬប្រផេះស
Oidium Leaf disease**



**ការផ្សាយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
ការិយាល័យដាំដុះនិងការពារ**

១. លក្ខណៈទូទៅ

ជំងឺស្លឹកអូអ៊ីដ្យូមឬប្រផេះស (*Oidium leaf disease*) អាចកើតមានក្នុងកម្រិតខុសៗគ្នានៅតំបន់ដាំកៅស៊ូ។ បញ្ហានេះបណ្តាលមកពីការជ្រុះស្លឹកយឺតឬពន្យារពេលជ្រុះស្លឹករបស់កូនកៅស៊ូ។ ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺប្រែប្រួលទៅតាមរដូវជ្រុះស្លឹក អាយុស្លឹក កូនងាយចម្លងជំងឺនិងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុនៅពេលស្លឹកលាស់ឡើងវិញ។ កូនកៅស៊ូដែលជ្រុះស្លឹកមុនដូចជា PB86 អាចគេចផុតពីជំងឺស្លឹកអូអ៊ីដ្យូម ឬប្រផេះស។ ជំងឺនេះរីករាលដាលដោយសារស្លឹកហើរតាមខ្យល់និងបង្កបញ្ហាខ្លាំងនៅតំបន់ខ្ពស់និងមានតិចតួចនៅតំបន់មានរយៈកំពស់ទាបជាង៩០ម៉ែត្រ។

២. រោគសញ្ញាជំងឺ


ជំងឺ *Oidium leaf disease* បង្កឡើងដោយផ្សិត *Oidium hevea* Stein។ ផ្សិតនេះបង្កើតស្លឹកមានលក្ខណៈជាម្សៅដែលមានមុខងារដូចជាភ័ស្តុតាង (បញ្ជាក់ក្តី)។ កត្តាអាការធាតុមានសារសំខាន់ជាងគេដែលធ្វើឲ្យជំងឺរីករាលដាលបាន។ កំដៅនិងសំណើមមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរស់នៅ ការលូតលាស់ ការបំបែកស្លឹកនិងការចម្លងជំងឺនៃពពួកផ្សិត។ ពពួកផ្សិតរីកសាយភាយទៅគ្រប់ទិសទីដោយសារខ្យល់នាំទៅនូវពពួក *Conidia* ហើយការកកើតស្លឹកនិងការរាលដាលគឺទទួលឥទ្ធិពលពីអាកាសធាតុ ជាពិសេសសំណើមទាប កំដៅខ្ពស់ ជាទូទៅអាស្រ័យលើខ្យល់ក្នុងខ្លាំងខណៈពេលដែលស្លឹកត្រូវរីកសាយភាយ។

ស្លឹកខ្ចីមានពណ៌ទង់ដែងនិងបៃតងក្លាវ ជា
តំណាក់កាលងាយទទួលរងជំងឺ។

រោគសញ្ញាលេចចេញជាស្នាមផ្ទាំងម្សៅ
ពណ៌សលើផ្ទៃស្លឹកទាំងសងខាងនិងផ្ទៃក្រោមស្លឹក
ជិតទ្រុឌ (Veins)។ ផ្សិតរាលដាលតភ្ជាប់ពីផ្ទាំង
មួយទៅផ្ទាំងមួយទៀត ជួនកាលគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃ
ស្លឹកទាំងស្រុង។ នៅពេលស្លឹកខ្ចីកើតជំងឺវាក៏ស្លូត
ហើយជ្រុះ បន្ទាល់តែទង់ស្លឹកជាប់ដើម។ នៅពេល
ស្លឹកកំពុងលូតលាស់ទទួលរងនូវជំងឺ នឹងបណ្តាលឲ្យ
ផ្ទៃនិងទម្រង់ស្លឹកប្រែប្រួលខុសធម្មតា ហើយស្លាកស្នាម
នៃជំងឺជិតជាប់លើផ្ទៃស្លឹកមានពណ៌លឿងក្លាវបន្ទាល់
ទុកលើស្លឹកពេញមួយវដ្តជីវិត។



ស្លឹកខ្ចីដែលរងនូវជំងឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់
នូវស្នាមម្សៅពណ៌សលើស្លឹក ហើយស្នាមនេះចាប់ផ្តើម
ប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ត្នោតនិងក្លាយជាដំបៅរលួយ។
ការរាតត្បាតខ្លាំងរបស់ *Oidium* ធ្វើឲ្យស្លឹកជ្រុះច្រើន
និងបុស្សក (Canopies) មានសភាពអន់ថយ ហើយ
ទិន្នផលធ្លាក់ចុះ។



ជំងឺ *Oidium* ធ្វើឲ្យការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ មានភាពយឺតយ៉ាវ ហើយការដុះសំបកថ្មីក៏យឺតផងដែរ។ នៅតំបន់មានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ការជ្រុះស្លឹក ញឹកញាប់នាំមកនូវកង្វះអាហារបម្រុងទុកក្នុងដើម អាចបង្កឲ្យមានជំងឺ Dieback នៃមែកតូចដដែលនាំ ឲ្យមានបរាសិទ្ធិទឹកកើតឡើងគឺ *Bothryodiplodia theobromae* Pat.។ *Oidium hevea* ធ្វើឲ្យផ្កាក្លាយ ជាពណ៌សហើយជ្រុះមុនពេញវ័យ ដែលបណ្តាល ឲ្យផលិតកម្មគ្រាប់ថយចុះ។

៣. ការការពារព្យាបាល

បំប៉នជីអាសូតនិងប្លូតាសនៅពេលកៅស៊ូរៀបនឹង ចេញស្លឹកថ្មី

ដាំកូនធន់នឹងជំងឺដូចជា PR255, RRIC100, PB217,...

ព្យាបាលដោយមេឡាស្កាន់ជ័រ៦-៩គឺឡូក្រាមក្នុង មួយហិកតា

ទ្រីដេម៉ែរ (Tridemorth) កម្រិត 0.02-0.04%

ស៊ូឡុក (Sulox 1%) កម្រិត ៤-៥គឺឡូក្រាមក្នុង មួយហិកតា

នៅថ្នាលកូនប្រើឌីតាន (Dithane M45) កម្រិត ១% ចំនួន២គឺឡូក្រាមក្នុងមួយហិកតា

កាបិនដាស៊ីម (Carbendazim) កម្រិត 0.05%។



វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន: អគារលេខ ៩ មហាវិថី ប៉ែននុត (២៨៩) សង្កាត់ បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ឬ ប្រអប់សំបុត្រលេខ ១៣៣៧ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨២ ៨៣១

សារអេឡិចត្រូនិច : crri@camnet.com.kh

វិបសាយ : www.crri.com.kh