



នាយកដ្ឋានដំណើរការ និង បណ្តុះបណ្តាល

ជំងឺផ្កាសាយបក្សី



អាស័យដ្ឋាន: #៧៤ ហោរិចី ព្រះប្រសិទ្ធិ សង្កាត់វត្តភ្នំ
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ : (០២៣) ៤២៧ ៥៩០/ ៤២៦ ៩៧០
ទូរសារ : (០២៣) ៤២៦ ៩៧០/ ៤២៦ ១៦១

- ផ្កាសាយបក្សី ជាជំងឺឆ្លងដែលបង្កដោយ
វីរុស និង បង្កជំងឺលើសត្វស្លាបគ្រប់ប្រភេទរួមទាំង
មាន់ ទា មាន់បារាំង មាន់ទោ ក្រូច ក្លាន និង បក្សី
ផ្សេងទៀត ហើយឆ្លងទៅជ្រូក និង មនុស្ស ។

ការចម្លង

- ជំងឺនេះឆ្លងពីបក្សី ទៅបក្សី តាមរយៈការ
ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលាមកសត្វ សំបោរ និង
របស់ប្រើប្រាស់ដែលមានជាប់មេរោគ ដោយការ
ដកដង្ហើមចូល ។

រោគសញ្ញា



- ជើង ហើម របកស្រកា និង ជាំខ្សែវ



- ក្បាលមាន់ មានជាំពណ៌ស្វាយ
- រោគសញ្ញាផ្សេងទៀតមាន ពិបាកដកដង្ហើម ក្អក ហឿនសំបោរ រាគពិពណ៌បៃតង ទៅពណ៌ស ហើមក្បាល ។



- សត្វងាប់ច្រើន

វិធានការ

- បើមានជួបករណីដូចរៀបរាប់ខាងលើ ត្រូវប្រញាប់រាយការណ៍ជូនមន្ត្រីបសុពេទ្យ ឬ ភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិដែលនៅជិតអ្នកបំផុត ។
- សត្វស្លាប់ព្រៃ សត្វស្លាប់ទឹក ផ្ទុកមេរោគ និងចំណងជំងឺ ។ ក្នុងកាលៈទេសៈនេះ ហាមទិញលក់ និងប៉ះពាល់ជាបណ្តោះអាសន្ន ។

ការទប់ស្កាត់ការរាលដាល



- សំលាប់បក្សីឈឺ និង បក្សីដែលឆ្លងជំងឺ
- ធ្វើការរំងាប់មេរោគទ្រូង និង សំភារៈ



- ជៀសវាងការធ្វើទស្សនៈកិច្ច ។
- ធ្វើការរំងាប់មេរោគ នៅក្នុងកសិដ្ឋាន និង មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនចេញ-ចូលកសិដ្ឋាន ។

ការពារការចំណង់មកមនុស្ស

- ជៀសវាង ការប៉ះពាល់ជាមួយបក្សីដែល សង្ស័យថាឈឺ បក្សីឈឺ និង សំលាប់បក្សីឈឺ និង បក្សីងាប់ដោយជំងឺ សំរាប់ធ្វើម្ហូប ។
- សាច់ និង ស៊ុតបក្សីគ្មានជំងឺត្រូវចំអិនឱ្យបាន ឆ្អិនល្អ មុននឹងបរិភោគ ។
- ជៀសវាង ចិញ្ចឹមសត្វស្លាបជាមួយនឹងជ្រូក ព្រោះមេរោគនឹងឆ្លងទៅជ្រូក រួចឆ្លងបន្តទៅ មនុស្ស ។

- ហាមឃាត់ចលនាបក្សី ចេញ-ចូល ក្នុងតំបន់ ផ្ទះជំងឺ ។
- ចាក់ថ្នាំការពារសត្វស្លាបដែលមិនទាន់ឈឺ

វិធានការរើសសុវត្ថិភាព

- ការពារការប៉ះពាល់ជាមួយបក្សីព្រៃ
- ប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតដែលគ្មានមេរោគ
- ជៀសវាងការដាក់បក្សីដែលចិញ្ចឹមមុន និង បក្សីដែលនាំចូលថ្មីជាមួយគ្នា ។
- អនាម័យ សំលៀកបំពាក់របស់អ្នកបំរើការ នៅក្នុងកសិដ្ឋាន និង អនុញ្ញាតតែបុគ្គលិក បំរើការឱ្យចូលក្នុងកសិដ្ឋាន ។

