

ចំណេក ១
របៀបទិញត្រូវតម្លៃ

ន.ល.អ.គ. AIDOC

១. ចំណេក ប្រព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋ

ជំរក ប្រព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋ: សំខាន់ណាស់សម្រាប់
ការពារទេប់ទល់ជាមួយកំដៅព្រះអាណិត្យ ទីក្រោង និង
កត្តាចំព្លែងផ្សេងៗទៀត ។ ទីតាំងត្រូវស្នើសុំនៅលើដី
ទីឡូលមិនលិចទីក បុទិកហ្មរកាត់ ហើយបាតត្រូវត្រូវស្នើ
ជានិច្ច ។ ត្រូវត្រូវស្នើសុំនៅខាងក្រោមខ្សែលំនៃផ្ទះ ដើម្បី
កំចុចដែលជាផលមិនល្អ និងប៉ះពាល់ដែលសុខភាពអ្នក
ចិត្តឱ្យ ។

ត្រូវបានសំអាត កៅបលាមកចេញពីត្រូវជារៀង
រាល់ថ្វី ។ ម៉ោងទៀតត្រូវពេមានកន្លែង សម្រាប់ជាក់លា
មកសត្វសម្រាប់ធ្វើដី ដោយធ្វើនៅឆ្នាយពីត្រូវ ។



ពេជ្ជគោដប្រក់ស្អែរ



ពេជ្ជគោដប្រក់ស៊ីអីស

Code: _____
Date: _____
Donated by: _____

២. ស្ថាកចំណើ និងឯករាជ្យ

ក្នុងត្រូវជាក់ស្នើសុំចណ្តាត់តាមបណ្តាណប្រឈម
ដើម្បីគោរយស្អែលសុំ និងមិនខ្ចោយចំណើតាល ។
យើងអាចជាក់ទីក្នុងផុងយ៉ែត្រសម្រាប់គោដីក ។
ត្រូវជាក់ផុងទីក្នុងឱ្យបានច្រើន និងមានទីក្រុចប់ត្រាន់តាម
ចំណួនគោ ។



ស្នើសុំចំណើដីកបន្ទះបុស្សី



ធម៌ទីក (ប៉ែត្រ) និងស្នើសុំចំណើដីកបន្ទះ

៣. គារប្រើប្រាស់និងពិនិត្យតម្លៃ

ឱ្យជាបានត្បូនាទីសំខាន់សម្រាប់ដលិតកម្មគោ។
កាលណាប្រើប្រាស់និងពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវ នៅពេល
បានទិន្នន័យលូន់ ។

លាស់ ការបន្ទូដ ការផលិតទីកដោះ ។ ល។ ដូច្នេះដើម្បី
បំពេញសេចក្តីផ្តើវការរបស់សាច់ ត្រូវធ្វើលំចំណុះដោះ ជំនួយ
ស្រី និងត្រូវត្រាន់ទាំងបិរិយាណ និងគុណភាព ។

សេចក្តីផ្តើវការចំណុះដោះប្រចាំលម្អិត តាមដែរកំណត់
កាលលូតលាស់ ការបន្ទូដ ការអូសទាយ ការផលិត
ទីកដោះ ។

សារធាតុទាំងឡាយនៅក្នុងចំណុះ ត្រូវបានបែង
ចំកទៅត្រូវបែងចំនៃសារពាយកាយសាច់ តាមរយៈ
ចរន្តិយាម ។ ដូច្នេះបើធ្វើលំចំណុះដោះត្រូវបានចំនួយ
ឬ លូតលាស់លើវិនាយក្រោមក្នុងចំណុះដោះ ។

- ① លូតលាស់លើវិនាយក្រោមក្នុងចំណុះដោះ
- ② បន្ទូដបានលូ (បង្កំណើតលូ) និងសំបុរ
ីកដោះ
- ③ មានកាយសម្រាប់ម៉ា កម្លាំងត្រូវបានចំនួយ
សម្រាប់អូសទាយ និងទប់ទល់ដំឡើ
- ④ ផលិតផលសាច់មានគុណភាព
ផ្លូវការនៅក្នុងចំណុះដោះ ។
- ⑤ មានការលូតលាស់យើត
- ⑥ ការបង្កំណើតមិនបានលូ ដូចកាលធ្វើឱ្យសាច់
មិនរកញ្ញី ឈ្មោះ ប្រចាំនាក់មួយជីវិត
- ⑦ បាត់បង់ប្រព័ន្ធការពារខ្ពស់ សាច់ដែលនឹងទទួល
ធម្មីផ្សេងៗ និងអាចស្វាប់
- ⑧ បាត់បង់លទ្ធភាពអូសទាយ
- ⑨ កុនក្នុងពេះមានការលូតមិនដម្លាត់
- ⑩ សាច់គ្នានរសជាតិ
- ⑪ ខាតបង់ចិវិក

៤.១. ចំណុះដោះចាមពល

ចំណុះដោះចាមពលមានប្រភពចេញពី ត្រាប់ចេញ
ជាតិ ស្វៀ ក្នុងជាតិ ស្វៀ ទីក្រោត ។ ល។ ដែលជាសមាជ
សាច់គ្នាចំបាច់ក្នុងចំណុះដោះ ហើយវាដាកត្តាមួយសំខាន់
បំផុតក្នុងរបៀបអាហារ ដែលមានត្បូនាទីធ្វើឱ្យសាច់មាន
កម្លាំងខ្សោយ ហើយវាកំដោះក្នុងខ្សោយសាច់ ប្រាំនៅនឹងធម្មី
ផ្សេងៗ សម្រាប់ការជំជាតិ ការបន្ទូដ និងការផលិត
ទីកដោះ ។

ចំណុះដោះចាមពល បណ្តាលឱ្យសាច់ត្រូវបាន

សុចំណុះ ធ្វើឱ្យវាចិត្តលួយប្រើប្រាស់ និងសារធាតុប្រើប្រាស់

បានត្រូវបានដែរ ។

ការធ្វើឱ្យឱ្យជាតិ គឺជាបុណ្យការលូតលាស់
របស់អតិសុខុមប្រាសាធ ដែលធ្វើឱ្យការរំលាយស្វៀ និង
ចំបើនក្នុងពេះរៀនជំមិនបានលូ ។



៤.២. ចំណុះដោះប្រើប្រាស់

ប្រើប្រាស់ (ជាតិសាច់) ជាសារធាតុចិត្តឱ្យក្នុង
ចំណុះដោះ មាននៅក្នុងត្រី ស្តីកដំឡើងឈើ/មី សំណួកសៀវភៅ
សំណួកបាយ ប្រភេទស្វៀនាំចូល ។ ល។ មានត្បូនាទី
ធ្វើឱ្យសាច់មានការលូតលាស់ជំជាតិ ។

៤.៣. ចំណុះដោះជីវិជាតិ (វិតាមីន)

មានត្បូនាទីចំបាច់សម្រាប់ដំណើរការត្រូវបាន
សិរីក្នុងនៃសារពាយកាយសាច់ ។ ពួកវិជាមីន មានប្រភព
មកពីផ្សេងៗ ហើយស្រស់ ស្រស់ ខាងក្រោម ពន្លកត្រាប់
ចេញជាតិ ។

ក្នុងវិជាមីន អាចបណ្តាលឱ្យសាច់ ៖

- ① មិនជំជាតិ
- ② ការបង្កំណើតមិនបានលូ គ្នានកុន
- ③ រកឈ្មោះលូមិនប្រកែតិ



ស្ម័គិត្យានពណ៌

- រលកសំរូក ហេមប៊ែន ដូចគេ ហេម ត្បានពណ៌ (ប្រពណ៌ពីលើងឡាតា ពណ៌ប្រធែះ) ទាច់
កម្លា ខ្សោយ ...
- ឃីតដ្ឋុក ខូចគ្រប់ដ្ឋុក ឧត់មាន់.មិនសូវសុំ
ចំណុំ ...



នៅនៅ. ធម្មវិជ្ជកសារធាតុដឹង

ជាតិនៃខេត្តប្រយោជន៍សំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្យឯក្តឹងមាន
ការល្អតណាស់ណ្ហ ។ ក្នុងករណីដែលសត្វ ពំបានទទួល
នូវសារធាតុដឹងបានគ្រប់គ្រាន់ អាចបណ្តាលឱ្យសត្វក្រិន
ផ្តឹងកោង វិនិសន្ទាក់ ក្រាកមិនរួច មានដំដីស្រួលផ្តឹង
ទន់ផ្តឹង រហកសន្ទាក់ផ្តឹង ពកក គ្រួនទីកដោះ (ចំពោះ
មេបំបោកុង) ... ។

នៅនៅ. តម្រូវការទិក

ទិកមានសារ៖ សំខាន់ណាស់សម្រាប់ មនុស្ស សត្វ
និងរួមូរិក្ខជាតិ ។ គោដែលសុីចំណុំស្វែនក្រោរការទិកប្រើន
ជាងសុីស្វោខី ។

គោម្រូន់ ២៥០គីឡូម៉ែត្រ ត្រូវការទិកប្រែបែល
៣៥លីគ្រក្សុងមួយថ្ងៃ ។ បើសិនជាជាល់ទិក ពំបានគ្រប់
គ្រាន់ទេ ធ្វើឱ្យការសុីចំណុំរបស់សត្វគ្រួចយុទ្ធម៌៖ ។

គំពូក ២

ជំនាន់បំណើសត្វស្របតាមលោ

ដំណរចំណើសត្វមាន ប្រចាំខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ គីឡូ

១. ពាក្យសន់:

ប្រភេទពុធស្សាសំខាន់ៗ ដែលមានគុណភាព
ខ្លួនៗ:

- ① មុខ្ញាត
- ② តេវឃុំស
- ③ ហូុន
- ④ សិម្បង
- ⑤ មាក់នំខ្មែរ
- ⑥ ស្សាប់ ។ល។




២. ពាក្យសនេហ្ឌិ៍:

- ① សំណុកបាយ
- ② សំណុកសៀវា
- ③ សំណុកដី
- ④ ពុពុកស្សារ
- ⑤ ពុពុកស្សាយទ្វូ ។ល។



ជាតុទៅដំណរចំណើសត្វដែលមានត្រាតំនើនស្រុក និងដំណរចំណើសត្វដែលនាំចូលពីបរទេសមកជាន់
ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឱ្យនាថែលបច្ចុប្បន្ន ត្រូវចែកជាលំដាប់ថ្នាក់ដូចខាងក្រោម ៖





ចំណុចជំណុះរបស់ស្សាន

៣.៤.ការថែទាំ

មុនពេលជាំត្រូវភ្លាមសំហាលដីឱ្យបាន ២ ខែ ៣ដងដើម្បីសម្រាប់ស្សានចំពោះ។ ត្រូវតាមជានការលួត លាស់របស់ស្សាន ហើយបានស្សានចំពោះ និងស្រាចទឹក នៅពេលដីស្អុត។

ករណីជាំត្រូវសំអាតស្សានចំណុះដី ឱ្យបាន ពីកញ្ចប់ ព្រោះស្សាន៖អាចលួតសង្គត់លើស្សានជាំដើរ ទិន្នន័យបាប់ផ្ទើមលួតលាស់ដំបូង។

៣.៥.ការប្រមូលជំនួយ

ស្សានចំណុះដី អាចកាត់លើកដំបូងក្រោយពី ជាំ ៣០ ខែ ៤៥ ថ្ងៃ និងប្រមូលជំនួយបន្ទាប់ពេល រាល់ ១៥ ថ្ងៃមួន។ បើនេះនៅរដ្ឋវំព័ិ៍នត្រូវពន្យាការប្រើបានកាត់យុរជានេះ បុមិនប្រើបានកាត់រហូតដល់មានទឹកស្រាច ស្រី។

គេអាចប្រើបានពេញមួយឆ្នាំ ជោយនៅរដ្ឋវំគាន ក្នុងត្រូវស្រាចទឹកស្សាន ២ ខែ ៣ដងក្នុង ១ខែ។

៤. តាញកស្សាន និងត្រូវស្រាចទឹកស្សាន :

៤.១. មុលន្យាតូ (Mulato) :

ជាប្រភេទស្សានកាត់។ នៅប្រទេសកម្ពុជា យើង មិនអាចធានិតត្រូវបានទេ។ ជាស្សានដើរមាន លក្ខណៈជនត្រាំបំជុំតែនៅរដ្ឋវំគាន សម្របនឹងការកាត់ ឱ្យជាថីស្សាន។ វាមានគុណភាពល្អជាងពួកស្សាន

ជំឡើងទៅក្នុង

ការជាំដូចតីការបំបែកដើមជាំនៅរដ្ឋវំស្សានត្រូវ ការប្រភេទដីដែលមានជីជាតិសមមួម។

៤.២. ម៉ោងខ្មែរ (Marandu) :

ជាប្រភេទស្សានដីដែលជាថីស្សានពេញវេយ។ ជាស្សានដីដែលជាលួតលាស់លួយ នៅលើដីដែលមានជីជាតិ ពិសេស លើប្រភេទដីក្រហម វាលួតលាស់លួយ បំជុំតែ បើនេះបើជាំនៅ លើដីដីដីខ្មែរ វាលួយ លួយបង្គុង។ ស្សាន៖ មានលក្ខណៈជនត្រាំបំជុំនៅ រដ្ឋវំព័ិ៍នត្រូវប្រើបាននឹងមុលន្យាតូដើរ។ គេអាចជាំវាគោយត្រាប់ និងដោយបំបែកដើមជាំនៅ រដ្ឋវំស្សាន។



៤.៣. ង្ហាមបារ (Gamba) :

ជាប្រភេទស្សានដីដែលស្សានចិត្តសិរីជាងប្រភេទស្សាន



តែប្រសិនបើមេរោគជាបុរីស នោះអង់ទីបីយីទិក
មិនមានប្រសិទ្ធភាពលើវាទេ ហើយអង់ទីបីយីទិកគ្នា
តែអាចទទេចល់ជាមួយវីសតបុណ្យណាំ ។

បាក់តែវិបុរីស ជាប្រភេទមេរោគធ្វើការបំបេកខ្លួន
បានឡើន ហើយសាយកាយពេញសរុបដាច់មួល ។
ប្រសិនបីសត្វមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតអង់
ទីតំរទទេចល់ជាមួយបាក់តែវិបុរីស នោះសត្វនឹងឈើ
ហើយស្មាប់ ។

ដំឃីឆ្លងសំខាន់ៗ ដែលពេងតែកៅតញ្ញិកញ្ចាប់
ចំពោះគោក្រូបីតីដំឃីអុត្តភាម និងសារទិក ។ ដូច្នេះគោ
ក្រូបីត្រូវបាក់វិក់សាំងការពារដំឃីទាំងនេះ ឱ្យបានគ្រប់
គ្រាន់ និងទ្រៀងពេលរោះ ។ ដំឃីទាំងនេះភាពត្រឹមកៅត
ឡើងនោរដូរស្មារ ដូច្នេះត្រូវបាក់មុនដូរស្មារ ។ ខែ ដើម្បី
ទទេចល់នឹងដំឃី ។

វាក់សាំងគឺជាការបាក់បញ្ចូលនូវមេរោគ ដែល
មេរោគនោះត្រូវបានបន្ថយសកម្មភាពសម្រាប់ បុមិនបង្កើ
ដំឃី ។ ទម្រង់របស់បាក់តែវិបុរីស ដែលជិតជាថ្នាំការ
ពារនេះ មិនចង់ឱ្យមានដំឃីទេ តែវាបង្កើតអង់ទីតំរែ ។ អង់
ទីតំរែនឹងមាននោរក្នុងខ្លួនសត្វជាប្រើប្រាស់ខ្លួន ហើយអាចទទេ
ចល់ជាមួយបាក់តែវិបុរីស ដែលធ្វើឲ្យសត្វមិនឈើ ។

វាក់សាំងគឺជាថ្នាំបាក់ការពារដំឃី ។ វាអាមានសារ៖
សំខាន់ណាស់ក្នុងការទទេចល់ជាមួយដំឃី ។ វាក់សាំង
មួយមុខអាចបាក់ការពារបានតែជមីមួយមុខបុណ្យណាំ ។
អង់ទីតំរែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលខ្លី មិនអាចមាន
ពេញមួយជីតែនោះទេ ដូច្នេះត្រូវគោរពតាមកម្បវិធីបាក់
វាក់សាំង ។

ជំនួយបុសខ្សែការចិត្តស្ថាប់រយៈពេលពី ១២ -២៤ម៉ោង ដោយមិនបានឈ្មោះពេលស្ថាប់ទាំងអស់ ។ ជាទូទៅតែយើងគោរពស្ថាប់ ដោយពុំមានយើង ភាករៈលើឡើយ ហើយកិច្ចចម្លងពីសត្វមួយទៅសត្វមួយទៀតដែរ លើក្រាត់សត្វដែលពុំមានជំនួយសុំស្មោះ ឱ្យកែវកនឹងដែលមានមេរក ទីបអាចលើបាន ។

ករណីមិនស្មូចស្រាវ សត្វមិនចង់ដើរ ដោយសារលើធីន ។ នៅសាច់ដំត្រគៀក ស្ថាបុក មានហើម និង ឲសុរសម្លងខ្សែក ។ ពេលចាប់ធ្វើមជំបួន កន្លែងហើម មានទំហំតូច ត្រូវ និងឈើចាប់ខ្លាំង ។ ដោយសារជំនួយនីត្តនិលីន ធ្វើឱ្យកន្លែងហើមនេះវិកជំឡើង ហើយ ពេលស្ថាបុកឲសុរសម្លង ប្រើបាន ។

ការព្យាពាល


ពេលដែលដើរជាសត្វឈើត្រូវចាក់ប៊ីសុំលីន បុអាម៉ុក សុំលីន ដោយចាក់សាច់ដុំ និងចាក់នៅជុំវិញ កន្លែងដែលហើមក្នុងសាច់ដុំ ។

ការចាក់វាក់សំង

វាក់សំងដែលចាក់ឡើមានប្រសិទ្ធភាព តើវាក់សំង ឬមុខ ដែលអាចប្រាំងបានត្រូវក្នុងស្រីដ្ឋីម ។

ការចាក់វាក់សំង :

- ① លើកទី ១ ពេលដែលក្នុងគោរមាយ ២ខែ
- ② លើកទី ២ ធ្វើឡើង ១ខែ ក្រាយលើកទី ១
- ③ លើកទី ៣ ធ្វើឡើង ១ឆ្នាំ ក្រាយលើកទី ២




ស្ថាបាតំមានជំនួយ



ស្ថាបាតំមានជំនួយ



ពេលរហកស្ថាបាប់ធ្វើម មានសំប្តារហ្មរខ្មៅ




សំប្តារក្រាយជាទុំ៖ ពេលមានទុំ៖នៅស្ថាប បុទ្ធស្ថាប

- ចាក់លីករៀងរាល់ ធម្មោះមួង ។
- ២.៣. ជំនួយសារីក

ជំនួយនេះបង្កើងដោយចាក់តែវិញ្ញាតេះ បានស្ថើរើល ឯក មុលត្វសុំជាប្រភេទ បេ (*Pasteurella Multocida Type B*) ។ ចាក់តែវិប្រភេទនេះបង្កើងតែនៅលើសត្វ

គោលនឹងក្របី ។ ពួកវារស់នៅ និងបំបែកខ្ពសនៅក្នុងដើមក ។ សត្វខ្លះជាមួកដូចកដំឡើ តែវាមិនឈើទេ ។ សភាពដំឡើ កែវត្រួចដោយពួក ។



ប្រុនស្អត (Dictyocaulus) នៅក្នុងស្អត

ស្ថានភាពសៀម ប្រយោមមុខនឹងការ សាយកាយ ដំឡើខ្សោះ ។ ហូងសត្វប្រមូលដូចតាមច្រើន រួមជាមួយអាកាស ធាតុសៀម ពិសេស នៅដូរក្រោង ជាសកម្មភាពនៃការ សាយកាយ ដំឡើ ។

សត្វចាប់ធ្វើឈើចាប់ពី ២-៣ ម៉ោង ក្រោយពី បាក់តែវិជ្ជាបច្ចុលក្នុងខ្ពសនៅត្រូវ ។ ការស្វាប់ របស់សត្វ កែវតាមណាតី ៦-១៤ម៉ោង ។

ពេតសញ្ញានេះជីវិសាទីក គីសត្វមិនចង់ដើរ គ្រឿង ក្រោខ្សោះ ហូរទីកមាត់ និងសំបារ ពិចាកដកដើរ មាន យាមតាមច្រមុះ ហើយនៅក្រោល ក និងឡាង ។ ការផ្តល់ តាមរយៈដោយធ្លាល់ និងដោយប្រយោល ។

ក្រោយពេលសត្វស្វាប់ យើសិនជាដើរការរោះកាត់



ការស្វាបនៅដើមក

នៅកន្លែងដែលហើរ នោះនឹងបង្ហាញឱ្យយើងមានដំ យាមកក និងទីកនោកក្នុងស្រាមបេះដឹង ឡាង និងពោះ។

ការព្យាបាល

ដោយដំឡើនេះមានការវិភ្លោះ ធ្វើឲ្យមានការ លំបាកក្នុងការព្យាបាលបានទាន់ពេល ។ ត្រូវចាក់សុល ហ្មាលាមិត និងតេត្តាសីតិតិន តាមសរស់ដីន ។ ពេល ចាក់ដំបូងគ្រូរបៀកមិតឡើដង ។

ការចាក់វាក់សាំង

ត្រូវចាក់វាក់សាំងនៅរៀងរាល់ ៦ខែ ជាពិសេស មុនដូរក្រោង ។

ដើម្បីឱ្យមានភាពស្ថាសំដល់ក្នុងដែលទីបនិងកែវត្រូវចាក់វាក់សាំង ដល់មេដើមនៅតំណាក់កាលចុងក្រោយ នៃការធើមរបស់វា ។

២.៤. ជីវិអុត្តភាម

ជីមិត្តអុត្តភាមបង្ហាញឱ្យដោយវិសាទីបានច្រើនប្រភេទ។



ការគោះនៅតំបន់ខ្ពស់ប្រមុះ

ប្រភេទវិសាទីអុត្តភាមសី១ (Type O, A, Asia1) ត្រូវបានរកដើរ ហើយតាមរកបានដំឡើដល់គោលនៅត្រោះរាជរាជ ចក្ខុមជាយើង ។

ការប្រើអង់ទីបីយូទិក តុមានប្រសិទ្ធភាពលើដំឡើនេះទេ ។

វិសាទីអាចសាយកាយ ដំឡើពីគ្រកទោគោ ព្រោះគ្រក បញ្ចូលវិសាទីប្រើប្រាស់ ហើយគោដាយទូលនូវការចម្លង តាមខ្សោះដែលមានមេរាត ។ ការចម្លងដំឡើនេះនេះ គឺតាមរយៈខ្សោះ ដកដើរ ការបែះពាល់ធ្លាល់ជាតិ

មួយសត្វូយ៍ ការបែះពាល់ដោយប្រយោល (សេវ្យកដើង
ដែលមានមេរភ័ទ) ។

រាជសញ្ញានៃជំនួយអុត្តភាមតី គ្រុនភ្លោ មិនសូចំណើ
ហូរទីកមាត់ ពងដោនៅលើអណ្តាត អញ្ញាប្ប បុរុមាត់




ការរាជដោយមានស្ថាមប្រឡាក់នៅក្នុង និងគឺជាក្នុង
ភ្លាមដោះ កន្លោមដោះ មានខ្សាយៗនៅតុល់ក្រចក និង
ចំង់កដើង ។

ការព្យាបាល

ជំនួយនេះបង្ហើរើងដោយវីស ដូច្នេះត្រានការព្យាបាលទេ ។

ការព្យាបាលដោយចាក់៖

- ទ្រឹមេត្តូត្រីម / សុធម៌ ឬអុកសុីតេត្រាសុីតីន
រយៈពេលពី ៥-៧ថ្ងៃ



រាយករាលមានពណ៌រប្រផែ៖

- លាងដំបោជាមួយសាបូ ឬសាថ់ជូរ ឬទីកម្មរ
- បាយៗចាំសម្ងាត់មេរភ័ទដែលមានជាតិវិយូទេ
ហ្មង់ក្រាន និងអុកសុីតេត្រាសុីតីន

ការព្យាបាលនេះ គឺការពារការជ្រាបចូលនៃបាក់
តេវីធ្លើឱ្យឯកទេ ។

គោមិនអាចដើរសុីចំណើ និងជីកទីកទេ ដូច្នេះ
ត្រូវផ្តល់ស្វែ និងកន្លែកដែលវាទ់ ឬទុកក្នុងម្បប់ ដើម្បីកាត់
បន្ថយការខ្សាយៗទីក ។

ការចាក់វាក់សាំង

ត្រូវចាក់វាក់សាំងប្រកែទេ ឬ អានិង អាសុំ
(Type O, A, Asia1) ។



រាយករាលមានពណ៌រប្រផែ៖ និងប្រើប្រាស់

- ចាក់វាក់សាំង លើកទី ១ នៅពេលគោមាន
រាយ ៤-៦ខែ
- ១ខែក្រោយមកទេរោតចាក់ជាលើកទី ២
- ចាក់រូបីកង់រាយ ឬ ៦ខែ
- ត្រូវចាក់ឱ្យឯកវិញ ប្រសិនបើនៅក្នុងធនោះ
មានជូះជំនួយនេះ ។

៣. ឧបនីមួយៗនៃភាសាត និងឧបនីមួយៗទេរោត

៣.១. គ្រុនភ្លោ

នៅពេលដែលគោមានគ្រុនភ្លោខ្សោំ ជាងមុតាដើឱ្យ
រាយកមិនចង់សូចំណើ អសកម្មភាព ធមិតកម្ម ទីកដោះចែយ
ចុះ ។ ត្រូវបំបែកគោដែលយើចេញពីហ្មុង ឬទុកនៅ
ក្រោមម្បប់ ឬកន្លែងត្រជាក់ ។ ត្រូវផ្តល់ទីកស្ថាតុវិញវាជីក

ការព្យាបាល

ថ្ងៃដំបូងត្រូវទុកសត្វុវិញនៅស្វែម ដោយមិនធ្វើ
ការព្យាបាលឡើយ ។ ថ្ងៃទី ២ ត្រូវចាប់ធ្វើមចាក់ចាំអង់
ទីធមិយូទីក ដែលមានសកម្មភាពឡូលាយ ដូចជា អុកសុី



ពេលគោស្អាម កតុរំវិះ សូមកំឡើចនឹកដល់ដង្គរប៉ីម

តែត្រាសីតិ៍ន បុប្ផិះមេត្តព្រឹម ជាមួយសុធលហ្ម ។


បន្ទាប់ពីការព្យាពាលពី ៣-៥ថ្ងៃ សូត្រនៅតែមិន
មានភោគស្រាវស់ត្រូវប្រញាប់បញ្ញនិយាយមកមន្តរ
ពិសោធន៍ ។

៣.២. បរសិតកុងឈាម

ភាគច្រើនបង្គជាចាំងីរុំវិះ ដោយមិនមាន ភោគ
ស្រាវស់លាស់ ។ សូត្របាប់ដ៉ីមខ្សោយ មិនសីចំណើ
ចុះស្អូម ពោមបោះ ។

ការធ្វើការងារខ្សោះ ផ្តល់ចំណើកអាហារមិនត្រប់
ត្រាន់ ជាកត្តាភ្វើឱ្យជាំងីងងាយឆ្លងចូល ។

គ្រុនភ្លាមៗមានសភាពមិនទេំងទាត់ ហើយការស្អុង



លាមកកតុណុកដាប់គ្មាន

សីតុណ្ឌភាពមានសភាពធម្មតា ។

៤. រាយរាយស្អាម

ដែងឱ្យគិតជាកត្តាកំងារចម្លងជាំងីនេះ ហើយ ដំណរកំ
កាលសម្រែមធនិយាយ:ពេលដោះ គី ១០ សុត្តាប៉ា ។

៥. ភោគស្រាវ

- ពេលអាជិត្យបាប់ដ៉ីម សូត្រគ្រុនភ្លាម
- ចុះស្អូម ពោមបោះ
- សែវកនៅជុំវិញត្រូក និងច្រមុះមានសភាព
ស្អុកស្អាតំង



លាមកកតុណុកដាប់គ្មាន

- កេវ រសាប់រសល់ ។

៦. ការព្យាពាល

ប្រើអុកសុំតែត្រាសីតិ៍ន កុងកម្រិត ១០មក្រ /គក្រ
ដោយប្រើកុងរយៈពេល ១០ថ្ងៃជាប់គ្មាន ឬ ២០មក្រ /គក្រ
ប្រើកុងរយៈពេល ៥ថ្ងៃជាប់គ្មាន ។

គ្រឿចិញ្ញាស្អាតំង

ចម្លងដោយសាររួយ ។ ត្រានភោគស្រាវស់
លាស់ តែបង្គតទូទៅអាណករកំឡើលើការប្រើប្រាស់ជាកម្លាំងអូសទាញ ។ ការបង្គិច្ឆុសត្រូវធ្វើការងារកាន់តែខ្សោះ
វិតតែធ្វើឱ្យជាំងីនេះនៅទីនេះ កាន់តែធ្វើនៅទីនេះ ។

ការព្យាពាល

- ចុះដែលមានប្រសិទ្ធភាពលូនោះ គី ឬ ឯកាល



ណុល់តែវាមិនមានលក់នៅលើទីផ្សារនេះ ប្រទេស
យើងទេ

① គាថប្រើច្បាំបេរើនិល ក្នុងកម្រិត ៥ម.ក្រ/គក្រ។
ជាយស្តា

ជាទូទៅមានពេតសញ្ញាផួចប្រឹងបានសុខៗ និង
អាណាព្យាស្តាដែរ ។ នៅប្រទេសយើង យើងមាន ហេ.
បីហេមិនា (B. Bigemina) និងហេ. បូវីស (B. Bovis) ។

ក. ពេតសញ្ញាបស់បេ. បីហេមិនា

① ទីកនោមពណ៌ត្រាត

② លាមករតពណ៌ខ្មោះ

③ ចាត់ពន្លឹង

ខ. ពេតសញ្ញាបស់បេ. បូវីស

① គោដីរឡើតត្រាតដួចប្រសើរៗ

② ផ្លែង

គ. ការព្យាពាល


① ប្រើច្បាំបេរើនិល ក្នុងកម្រិត ៥ម.ក្រ/គក្រ ។
ដែលរួរ

ផ្លូវដោយសារដែង ។ ជាទូទៅពេតសញ្ញាមិន
សុវត្ថភាស់លាស់ទេតែជីនីនេះវិតតែធ្លីនៅទៀត ឡើងប្រសិន
បើ មានបញ្ហា ៖

③ ស្រីស (ធ្វើការធ្លីន់)

④ ការចម្លងរួមបន្ថែម (អាណាព្យាស្តា បាយស្តា)

⑤ ការខ្សោយ



ការព្យាពាល

① ប្រើច្បាំអុកសុត្រាសុត្រិន ។

② រាប់ហាសិតក្នុងយោម មានពេតសញ្ញាផួចប្រឹងបាន
ខ្លះព្យាពាលដោយប្រើបេរើនិល ខ្លះប្រើអុកសុ
ត្រាសុត្រិន ។ ដូចនេះ ប្រសិនបើសង្ឃឹមថា
មានជីនីនេះ គេត្រូវចាក់បេរើនិល និងអុកសុត្រា
ត្រាសុត្រិន ។

ហ្មស្សុន្យ

តីជាព្យាន ដែលជាអ្នកបីតយកដីជាតិ
ចំណើតីក្នុងពោះជីន ធ្វើឱ្យសត្វកង្វៈជីជាតិ ស្ថិ
ខ្សោយ ។

គេប្រើច្បាំអាបង់ជាប្រុល ដើម្បីព្យាពាលព្យានហ្ម
ស្សុន្យ និងព្យានក្នុង ពោះជីនដែលឡើង ។

ដីផ្លូវ

បើដែលបានចំនួនប្រើបាន ធ្វើឱ្យបាត់បង់យោម និង
ខ្សោយ ពិសេសក្នុងគោ។

ដីផ្លូវមានមាត់ដែង ហើយអាចបង់ឱ្យមានរូស
ស្តាមលើស្សុកធ្លីន់ច្បាប់ ។

គេប្រើច្បាំសមាប់សត្វលិត ដូចជាបុឃុយកុក (Butox)
ក្នុងទីក ១លីត្រ ត្រូវបាយបុឃុយកុក ២សេសេ ។

គោ ១ក្បាល ត្រូវការសូលុយស្សុងបុឃុយកុក ៣
លីត្រ ។

រណាកែវនៃក្នុក



ចំហៀងដែលត្រូវចាក់ត្រូក (Trocár)

ប្រសិនបើត្រួកម្យានឡើងពណ៌ក្រហមហើម និង
កំពុទិកកែតុក វាគាថបណ្តាលមកពី :

①ទួកធ្វើឡើងចុល ជូចជាទីខ្សោច់ ធមុលី បុ
ត្រាប់ស្វា ...

②បុស បុស្អាមជាត់នៅលើកែវកែតុក

③មានដំនឹងជាយសាររួយ បុកង់អនាម៉យ ។

ប្រសិនបើត្រួកទាំងសង្ឃានឡើងក្រហម ហើម
និងកំពុទិកកែតុក វាគារពេតសញ្ញានេះដំនឹង ។

ការព្យាពាល

①បន្ទុកត្រូវជាក់កែតុកឱ្យបានបាប់

②អាចប្រើចូលជាក់កែតុករបស់មនុស្សបាន

③ប្រសិនបើមានរលាកកែវកែតុក គេជាក់ ហ្មង់
តាមិសុន ជាមួយដិចហ្មមេតាប្បួន (Genta-
micine + Dexamethasone) បុក្សមហ្មនិកុល
ជាមួយដិចហ្មមេតាប្បួន (Chlorampho-
nicol + Dexamethasone)

④ប្រសិនបើមានរលាកកែវកែតុក គេមិនត្រូវជាក់
ត្រូវកែតុកជាមួយដិចហ្មមេតាប្បួនទេ គឺប្រើ
តែអង់ទិបីយុទ្ធគិកបុណ្ណោះ ។

កែវកែតុកអីផ្សាយឃើញ

បង្គឡើងជាយបាក់តែវិណ្ឌោះមូរកែវកែតុកមូល
(Moraxella) ។ បាក់តែវិនេះបានបញ្ចាផាតិតុល
ជាយបង្គជាបញ្ចានៅលើកែវកែតុក ហើយបណ្តាលឱ្យ
រលាក និងដំបាត់កែវកែតុក ។ រាជពេតសញ្ញាដំបូងតី៖

⑤មានពីកកែតុកបុរចឆ្ម

⑥កែតុកចាត្រ់ពន្លី

⑦ត្រួកកែតុកជាប់

⑧ក្របកកែតុកឡើងក្រហម និងហើម ។

កែវកែតុកស្អែកស្អែក / ឈរវីរៈ

បង្គឡើងជាយសារមានបរាសុំតប្រើន ជូចជា
ដំនឹង ហ្មស្យុទ្ធភាពាណាពាល ត្រើមបាតាស្អាត សូមា បុ ឬ
បេស្យា ទូរបុកសិរីសិរីស ។

ក្បិចនុស្អែកស្អែក (Leptospirosis)

ជីវិនេះផ្តើមរយៈទីកនោមសត្វដែលឈើ ។

ទម្រង់ស្រួចប្រារ៉ា :

គ្រុនក្រោមឯកជាន់សុំចំណុកឯក អស់កម្លាំង ទីកនោមពណ៌
ឡើងបុក្រហមត្រួត ពិចាកជកដែលឈើម ខណ្ឌលើដែលស្អក
ស្អាត៖

ទម្រង់កុំវិ :

ខ្សោយ ស្អែកគ្រុនក្រោមជាយពេល ខំណ្ឌលើដែល
និងហុរឈម ។

បុស

ជាបញ្ហានៅក្រោមសៀវភៅ មានសភាពហើម និង
ការឈើបាប់ជាយសារម្នារេះ ។ បុសបង្គឡើងជាយ
សារមេរក សត្វខ្មោះ ការចាកត្រូវ បុរាក់សាច់ជាយប្រើ
ម្នាមកម្មូត ។

ការព្យាពាល

បុសអាចនិងបញ្ចាយជាយដោយខ្ពស់ តែបើបុសទេន
ហើយនៅតែមិនបែក ត្រូវតែធ្វើការវេះកាត់ ជាយធ្វើការ
សំអាតនៅមុខបុស និងជីវិញបុស រួចប្រើកំបឿត បុទ្ធម
វេះមុខបុសពីលើចុះក្រោម ដើម្បីឱ្យខ្មោះហុរចេញអស់ ។
បន្ទាប់មកចាត្រ់សូលួយស្យុងអូយូធមិនបញ្ហាលនៅក្នុង
បុស រហូតដល់ធម្មេសមុខរបុស ។

៤. ចំណើនិងគិតឡើង

ម្នាលហេតុដែលបង្គជាតិដំដូរដើរដោយសារ
រលាកទេស្អត (បង្គឡើងជាយមេរក) ន្រែត្រួសការាស
ធាតុក្រោខ្មោះ ប្រពេជាក់ខ្មោះ ធមុលីប្រើន អស់កម្លាំង ខ្សោយ
ជាក់ទីកនោមពេលអូសទាយ កង់៖ចំណុកឈររារ ។ ល ។

៤.១. បង្កើតក្នុងស្ថាបន្ទាល់


ការក្នុក គឺជាសកម្មភាពនៃការខ្សែដ្ឋានឱ្យល់ តាមមាត្រានិងមានសម្រេច។

ក្នុកបង្កើតដោយសារជំងឺនៅស្ថាបន្ទាល់ បុប្ផ័ណ្ឌខ្សែ (សាក) ហើយសូតនៅស្ថាបន្ទាល់ ទីកបុសំបាន នៅក្នុងស្ថាបន្ទាល់ បុប្ផ័ណ្ឌខ្សែ។

សាកទងស្ថាបន្ទាល់/ស្ថាបន្ទាល់ (Broncho-Pneumonia) :

ការហូរសំបាន/ខ្សែបង្កើតដោយសារការមានខ្សែនៅស្ថាបន្ទាល់ ប្រសិនបើតែមិនព្យាយាលទេ នៅវានឹងបង្កើតជាដំងឺកំរើ ដោយសារវិវត្ថធម្មិកបង្កើត។

ក. ក្រោតស្ថាប



ត្រូវបញ្ជាក់តាមមាត្រា
ខ្សែនៅក្នុកបន្ទាល់ ២-៣ដំបូង

០. មិនសុចិត្ត

០. សាកកំរើក្នុក (ក្នុកក្រហម និងហូរទីក្នុក)

០. ហូរសំបាន

០. ក្នុក

០. ត្រូវកោរយៈពេលពី ៣-៥ថ្ងៃ (កម្មកើត ឬ ធម្មិកបន្ទាល់ ៤០អង្កោស)

ខ. ការព្យាយាល

០. ប្រើអង់ទិបិយីទិក មានសកម្មភាពបានយុរួម
មានអុកសុតែត្រាសុត្វិន បុញ្ញលេនីកុល (Flu-
-tenicol) បុញ្ញលេនិន (Tylosin) ។ ក្រោយ
ពេលជាកៅយ ត្រូវបន្ទាល់ព្យាយាល ពេចចេញឡើង
ឲ្យស្ថាប (Dictyocaulus) :

បង្កើតនៃស្ថាបន្ទាល់ បុប្ផ័ណ្ឌខ្សែ ។ ព្រឹនពេញ
វិយាយសំនោះ និងពន្លេក្នុងស្ថាប ។

ក. ក្រោតស្ថាប

០. ក្នុក

០. ហូរសំបាន

០. មានពុសមេងត្រីត្រក្រព្យនៅស្ថាប


០. ជាទុទេកម្មីទិន្នន័យកិច្ចិច

០. ក្នុងករណីធ្លីនៃផ្លកម្មីអាចទិន្នន័យ ដល់ ៤០
អង្កោស ។

ខ. ការព្យាយាល

ប្រើថ្វីកំតែម្មីលើកដូចជា ៖

០. អាល់បង់ជាបរូល (Albendazole) ១០មីលី




លីត្រ សម្រាប់គោឡូម៉ែន ១០០គីឡូក្រាម

០. អីវេមិចទិន (Ivermectine) ១មីលីលីត្រ

សម្រាប់គោឡូម៉ែន ៥០គីឡូក្រាម ។

ដំបោនៅដើមកៅ:

ដំណឹក បុប្ផុស បង្កើតដោយសារការមុតវត្ថុ
ឲ្យង់ ក្នុងពេលសត្វសុស្ស ជាពិសេសភាសុនៅតំបន់



សម្រាម ១

ក. ភោគសញ្ញា

- ① ពិបាកដែកដើងឱ្យម ពិស់សពលស្រួលដើងឱ្យមចូល
- ② ពេល ស្រួលដើងឱ្យមចូល មានពុស្តុរសមេងក្រិកទៅ
- ③ ពេលស្ថាបនោះដើមក ធ្វើឱ្យគោមានសភាពយើតាប់ខ្សោះ និងក្នុក។

ខ. ការព្យាពាល

- ① ប្រើប្រើមេឡូត្រីម ជាមួយ សុិលហ្សា (TMP + Sulfa) រយៈពេល ៥ថ្ងៃ ។

៥.២. បង្ហាញហ្សារសំបាន (Nasal Discharge) :

រណាកន្លឹងខ្លួនប្រមុះ (Sinusitis) :

ដោយសារការជួល់ត្រា រណាកដេឡូមុខ ក្រឡូ:

វិតតិងពេក ... ។

ក. ភោគសញ្ញា



បន្ទាប់ពីកែតក្នុនក្នាម មេហ៊គោគ ធ្វើយក្របច្ចុលនិងធ្វើការបម្លឺនទៅស្ថាន

- ① ហ្សារសំបារប្រុងប្រុង ប្រុងប្រុងសង្កាត់
- ② សត្វមិនគ្រឿនកោត
- ③ ពេលប៉ះត្រូវចាស សត្វមានសភាពយើតាប់ខ្សោះ និងមានសមេងស្អែក ។

ខ. ការព្យាពាល

- ① ប្រើភាមុកសុិលីន មានសកម្មភាពបានយុរ ចាក់បិជិង ដោយចាក់រលង ២ថ្ងៃម៉ោង ។

៥. គំនឹងផ្ទះត្រូវសម្រេចនាយករាជការ

៥.១. ជំនួយ

ការរកអាមេរិកកែតឡ្វេដោយគោមានភោគសញ្ញាទេ ធ្វើនៅក្នុងពេក ។

ការរក គីលាមករវិជ្ជៈប្រើប្រាស់ដើម្បីរកឃើសក្នុងមួយចំណោម ការរកមិនស្ថិតជាប់ត្រា វិនិងក្នុងអាណាព្យក់ ។ លាមកខែមានពណ៌រំបែកងារបានស្ថិត ពណ៌ត្រាត បុណ្យពណ៌ក្រហមបានស្ថិត ដោយសារមានលាយឈាម ។ ជូនកាលគេមិនអាមេរិកយើងាល់មករាតជាតាល់ទេ វិតគេអាមេរិកយើងាល់ស្ថាមប្រឡាក់ជាប់ក្នុងបុគ្គល់កន្លួយ។

រាល់ដោយគោមានភោគសញ្ញា

បង្ហាញឡ្វេដោយសារចំណុះអាណាព្យក់ ការបូរចំណុះលើវិនិងពេក ការសុិលីប្រើប្រាស់ដើម្បីរកឃើសក្នុងមួយចំណោម ចំណុះសល់យុរ មានសភាពជូនដូចមួយ ប្រុងប្រុង ជូន (ពេក កន្លួយ) ។

ការការពារ និងព្យាពាល



ចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យទារបន្ទាប់ដោយគ្មានលើមួរអង់គ្លេសលើបញ្ហាប្រាប់ខ្លួន

- ① ផ្តល់ចំណុះដែលសត្វមិនដែលសុិលីបន្ទិចម៉ោង ។

- ② យកចំណុះដូរដូរដែលបានយក្ស ។

រាល់ដោយសារពេត្តករយោស់ត្រូវ និងបាក់ត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីរកឃើសក្នុងពេក

នៅពេលគោមានសុិលីដោយក្នុនព្យុន ក្នុនព្យុននឹងចូលទៅក្នុងពេក ។ បានបាក់ត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីរកឃើសក្នុងពេក ។

ក. ភោគសញ្ញា

- ① ស្រកទម្យន់

- ② មិនសុិលីចំណុះ តែមិនគ្រឿនកោត

- លាយកកតពណ៌បែបង និងមានបរិមាណច្រើន
- ហេមបាស់



2. ការព្យាពាល

- ប្រើទូរស្សារីសុល (Levamisole) ប្រអប់ដោសុល (Abendazole)
- អីវេមិចទីន ១% (Ivermectine 1%) ប្រើ ១ សេសេស សម្រាប់គោទម្ល័ន ៥០គីឡូក្រាម ដោយ ចាក់ក្រាមសែវក ។
ជួរថ្មីម
ពេលដែលប្រើប្រាស់ចូលដល់បំពង់ទីក្រប្រាស់ វាត្រូវ ឱ្យស្ថែកប្រាស់ និងខូចថ្មីម ។

ក. ភេគសញ្ញា

- ស្រកទម្ល័ន ស្ថុមកប្រើបង
- ស្អែកស្អាតំង រាជកុំដៃ
- ហើមតល់ច្ចាម

ខ. ការព្យាពាល

- ប្រើដូវិមិច (Dovimect) ដោយចាក់ក្រាម សែវក ១សេសេស សម្រាប់គោទម្ល័ន ២៥ គីឡូក្រាម ប្រើប្រាស់ជួរថ្មីម (Abendazole) ។
ក្នុងសិដ្ឋសិតិស
- កែតមាននៅលើគោទោ ។

ក. ភេគសញ្ញាកត

- មិនស្ថុរសិចំណើ ស្រកទម្ល័ន ស្ថុម
- កន្លែយ និងធំនឹងក្រាយប្រឡាក់ លាយកកតពណ៌ខ្មៅ សិតជាប់គួច
- ក្នុងករណីផ្ទៃនៃ លាយកមានលាយលាយ និង ស៊ុបោរ
- ពេលដុះក្នុងគោខំប្រើបងខ្សំង

ខ. ការព្យាពាល

- ប្រើសិលហ្ឌ ៣៣ (Sulta 33) ១ បាក់នៅ ឪក្នុលី (E. coli)

ការរកនេះកែតឡើលើក្នុងគោកំពុងថ្វោះ ។
ក្នុងគោឆ្លងបាក់កែវនេះនៅពេលដែលវាត្រូវ ប្រើបានដែលដូចខាងក្រោមនេះ ។

ក. ភេគសញ្ញា



សុកមានសភាពពណ៌លើវ៉ីដ

៦. លាយកកតមានពណ៌សលើវ៉ីដ

ខ. ការការពារ

ត្រូវឱ្យក្នុងគោពោះដំបូងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ពិសសចន្ទោះពីកែតរហូតដល់ ៦ម៉ោង ។

គ. ការព្យាពាល

- ប្រើអង់ទីបីយីទីក ដូចជាកូលីសីន (Colistine) ឬត្រីមេកូត្រីមជាមួយសិលហ្ឌ (TMP + Sulfa) ឬអង់រូហ្មុកសាក់សីន (Enrofloxacin)
- កំឱ្យក្នុងថ្វោះ
- បង្កើនជាតិទីក ដោយប្រើស្ថុចំនួន ៦ស្ថាបត្រ




បង្កើកត្រាងេចញមកក្រា


ការឃុំនិងអំបិលកន្លែងស្ថាប្រពាការឃុំ ឱយ
ជាមួយទីកន្លឹនមួយលើត្រា ។
សាន់មួយផាណនខ្សោយសុំស

ក. ភោគសញ្ញា

- ត្រូវក្រោត កម្មាធី ៤០-៤១អង្គរសេ
- សត្វខ្សោយខ្សោយ និងមិនសុំចំណើ
- ភាពធ្លន់ធ្ល មានក្រុនសុំយុទ្ធស័ំ



ក្រាលក្នុនគោបត់ទៅក្រោយ




គូចក្នុនគោចញមកមុន

អាចមានឱយឈាម បុសំបារ

- ចំពោះក្នុនគោភោគសញ្ញាមានភាពធ្លន់ធ្លរហើយ
វានិងស្ថាប់នៅថ្ងៃនោះ ពី ២-៣ ថ្ងៃ


ខ. ការព្យាយាល

- មានការលំបាកខ្សោយ ព្រោះបាក់ពេវីសាល់មួយ
ឈាមខ្សោយមានភាពធ្លន់នឹងច្បាំ អូកសុំពេត្រា
សិត្សិន (Oxy tetracycline) ដូច្នេះត្រូវប្រើប្រើប្រើប្រាស់
ព្រីមជាមួយសុំលហ្ម (TMP + Sulfa) បុអង់



ទីតាំងក្នុនគោជម្រើន


- ភាពធ្លន់ធ្ល មានក្រុនសុំយុទ្ធស័ំ ហើយឈាមក



ក្នុនគោបញ្ចាស



លួកដែងដូយអនុកម្រនីមួយាតាមប្រជាប់បន្ទូដ



ដើម្បីមុខកូនគោម្លាយបត្រទៅក្រាយ



ប្រើប្រាស់ដើម្បីមុខលើក្របក



ធ្វើស្ថាបន្ទាន់ដើម្បីកូនគោបេញ




ពាល់កូនគោបេញមកក្រា

- វិហុកសាក់សីន (Enrofloxacin) រយៈពេល
យ៉ាងតិច ៦ថ្ងៃ ។
- គុកស្ពក់រោង (Toxocara vitulorum)**
- ① កែតមាននៅលើកូនគោកំពុងថ្ងៃជោះ ។
 - ② កូនគោអាចខ្សោយខ្សោយ អាចស្មាប់នៅអាយុ
៣-៥ឆ្នាំ
 - ③ បញ្ចាន់បង្គដោយប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្គដោយប្រើប្រាស់បានស្ថិតនៅក្នុង
កំណែងពីរស្ថាប់បន្ទាប់ពីកែត (រូបទី ៤)
 - ④ ព្រឹនលួតលាស់ក្នុងកូនគោ ធ្វើឱ្យកូនគោខ្សោយ



ដូចសំអាតកូនគោ

- ហើយដូនកាលធ្វើឱ្យកូនគោស្មាប់ (រូបទី ១)
- ⑤ ព្រឹនពេញរីយនៅក្នុងពោះកូនគោចាប់ផ្តើមពង
ហើយបញ្ចប់ក្រោតាមលាយក (រូបទី ១)



ការធ្វើយទាល់យកសុកគោបេញ

- ④ ធនធានកំទោលឱស្សារ ហើយមេគោសីស្សាដែល
មានកូនដង្គុរនេះ ធ្វើឱ្យកូនដង្គុរធ្លើលួតលាស់
នៅក្នុងខ្ពស់មេគោ (រូបទី ១) ។
- ⑤ ដើម្បីការពារកូនដោកកំឱ្យមានព្យូន ដែលធ្វើឱ្យ
ខ្សោយ និងស្ថាប់ ត្រូវបញ្ចូកពីរដៃពេល ២៥០
មក្ខ (Pyrantel 250 mg) សម្រាប់កូនដោ
ម្មយក្តាល នៅពេលវាមានអាយុ ១៥ថ្ងៃ ។

៤.២. ហើមពោះដោយសារមានឧស្សាហ៍នូងពោះ

គោចសម្ងាត់ដោយពោរអាមេរិក នៅពោះ
ជាបច្ចុប្បន្ន ១៥ថ្ងៃ ។

ក. ភេទសញ្ញា

- ① ពេលគោះដ្ឋីកពោះជំរាបញ្ញ នៅដោយឧស្សាហ៍
នៅពេលទីនាក់របៀបបញ្ចូលខ្សោយលែន
- ② ពេលដំពារអេវ៉ីន មិនអាចកែបញ្ចូលខ្សោយលែន
មានកូនពោះ
- ③ ពោះជំរឿកសង្គត់ទោលឱស្សារ៖ ឡើង ជាបច្ចុប្បន្ន
ធ្វើឱ្យគោតិបាកដកដង្កើម
- ④ កម្រោងក្នុងខ្ពស់មានធម្យតា ។

ខ. ការព្យាពាល

- ① កូនករណីធ្លីនៃផ្ទូរត្រូវប្រើប្រើ (Trocár) ចាត់
ពោះជំ ដើម្បីទម្លាយខ្សោយលែន

ហើមពោះដោយសារស្សារៈវត្ថុធ្លើង ។

ស្ថិតិការណ៍ ធ្លីយើ ... តែងតែបង្កើរមានការស្សារៈ
នៅបំពង់ភាគរារ ដូចនេះត្រូវស្ថាបនៅដើមក និងបំពង់
ភាគរារ ។



ក្នុងដោះពីរមានបញ្ញា

ការព្យាពាល

- ① ត្រូវព្យាយាមលួកយកដែលស្ទះចេញ
 - ② ត្រូវចាក់អង់ទិបិយ៉ូទិក ដើម្បីការពារកំឱ្យរហក
ត្រូវស្រីដែល ។
- ហើមពោះដោយសារស្សារៈសីម (មានទីកច្ចើន)
បញ្ញាបែកដោះពីរមានបញ្ញីនៅក្នុងបញ្ញា
ជាបច្ចុប្បន្នពោលគោសីស្សារមានជាប់ទិកសន្យាបញ្ញាបែល
បញ្ញីម សីស្សារីខ្លឹមច្រើននៅដើមរដ្ឋវត្ថុ ។ ការបែកដោះ
នេះ ធ្វើឱ្យគោសីស្សាប់លើវីន ដូច្នេះមិនត្រូវឱ្យគោដែលអត់
ចំណុច ឡើង នៅស្សារីនៅក្នុងដែលមានស្សារីខ្លឹមច្រើន បុស្សា
សីមខ្សោយ ។

ការព្យាពាល

- ① បញ្ចូកប្រែងឆាតី ៣០០-៥០០មល ។
 - ② ហើមពោះដោយសារពុលដីអូយី
- ការពុលនេះអាចកែត្រូវបញ្ចូលដោយសារគោលិខូ
នូវជីអូយីដែលមានសល់ក្នុងបាន ។

ក. ភេទសញ្ញា

- ① ហើមពោះខ្សោយ
- ② បញ្ចូកបញ្ចូកសាច់ដុំ មិនអាចបញ្ចូលខ្សោយបាន
- ③ ការស្ថាប់អាចកែត្រូវបានរយៈពេល ២ម៉ោង
ក្រោយ ។

ខ. ការព្យាពាល

ប្រើទីកខ្លះពី ២-៥លីត្រ លាយជាមួយទិក ។

៤.៣. ស្នូន

ជាបញ្ញាមួយដែលធ្វើឱ្យសត្វមិនជុំ បុជុំដោយ
មានការលំបាក ។ ក្នុងគឺជាបច្ចុប្បន្នមួយ ក្នុងចំណោម
បច្ចុប្បន្នធ្លើង នៃជីវិ៍ ។ វាបានធែកធ្វើឱ្យសត្វគ្រុន
ក្នុងខ្សោយ ដោយសារសត្វមិនសុំចំណុច បុករបញ្ចូល
មកមកយើត ។ ការពុលចំណុចកំរើអាចធ្វើឱ្យមានបញ្ញា
ក្នុងធ្លីនៃផ្ទូរ ។

ការព្យាពាល

- ① ត្រូវឱ្យគោដីកទិកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់
- ② ត្រូវព្យាពាលបុញ្ញលេកបង្គុជីជី ដើម្បីឱ្យសត្វ
បានដើមសុំចំណុចកំរើនិងវិញ ។



ស្ថូរករហេក និងហេរិយដើសគោ

បញ្ហាខ្សែម និងប្រជាប់លាយអាហារ

ធ្វើមានសារ៖ សំខាន់ណាស់សម្រាប់ធ្វើឱ្យសត្វ
មានសុខភាពល្អ ។ ធ្វើមាតកនៃងួនធមុក សារធាតុចិញ្ចីម
និងមានក្នុងទីផ្សេងៗសំខាន់ក្នុងដំណើរការរំលាយអាហារ ។

ធ្វើមាននឹងនួវការខុចខាតដោយសារដង្គរ
ធ្វើមានការពុលដោយសារប្រើចាំអ្នីវិមុចទីន (Ivermectin)
លើសក្រិត ដំឡើលាសដោះ រលកស្សន ប្រុងដឹងឆ្លង ។
ចំណោកបញ្ញាលើការរំលាយអាហារតី មិនសី
ចំណួន ខំណ្ឌលើង ដួនកាលក្នុង ដួនកាលរត្រ។

កាសំយោនធផ្លូវព្រះអាគិត្យ

នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រើនកៅតិបញ្ញានេះដោយ
សារធ្វើមិនបានបំបែកក្នុងរឿងប្រើបានដែលមាននៅក្នុងរួចជាតិ
ជាបោកតុធ្វើឱ្យកៅតិបញ្ញានៅនូវសារធាតុតិមិ ដែលធ្វើឱ្យចាប់
ពន្លឹះច្រើន ។

នៅពេលគោត្រវត្ថុព្រះអាគិត្យ ធ្វើឱ្យគោមាន
បញ្ញាដូចជា ៖

① ពងលីស្ថូរក

② ស្ថាមបេកប្រែ៖ មានហុរិយាម

ការព្យាពាល

③ ចងកោទុកនៅក្រោមម្បប់

④ ទប់ស្ថាត់ការពារុយ ដែលអាចបង្កើតឱ្យមាន
របួសស្ថាម

⑤ ត្រូវចាក់អង់ទិបិីយូទិក ដូចជា អាមុកសីលីន



ស្ទាក់គោហេម

បុអុកសីលីត្រាសីតិន (Amoxilline + OTC)
ដើម្បីការពារដំពោក


⑥ ព្យាពាលបញ្ញាខ្សែម

⑦ ប្រើចាំដែលមានសកម្មភាពធ្លួយជំរុញការ
បញ្ញាបញ្ញីកប្រមោត ដូចជា ឈព័ត៌មូល [He
patol (Coophavet)]

⑧ វិតាមីនបេកតិច (B- Complex) មានសារ៖
សំខាន់ណាស់ ក្នុងការធ្លួយតាំប្រមុខងារ របស់
ធ្វើម

⑨ ឱសចដែលមានសមាសធាតុ ឌីអិល - មេត្យីនីន
+ អីណុកសីតុល + វិតាមីនអី (DL-methionine
+ Inositol + Vitamin E)

⑩ ត្រូវធ្លួយចំណួន ព្រះអាគិត្យ ដើម្បីឱ្យពេះចំ



សកាតក្រចកដើសគោមនពេលភាគត់

បំពេញមុខងារបានល្អ ដូចជាចំណី ត្រូវមាន
ចាមពល និងប្រុងគីន ត្រូវប៉ះតាន់

- ①គោដើសមានបញ្ហាថ្វីម ត្រូវការចំណាយពេល
វេលាយូរក្នុងការព្យាពាលឱ្យជាសេវីយ។



សកាតក្រចកមុនពេលភាគត់



ត្រូវពិនិត្យមិលដើរប៉ះនោបាតដើសគោ

៦. ឥឡូវីជីប្រជាចែកល្អត្បៃ (Reproductive symptoms)

៦.១. បញ្ហាអិនកិលូណុល

ក្រោយពេលកែពីក្នុន និងកំពុងបំបោក្នុន មេគោ
មិនរកិលូណុល តើជាតំណាក់កាលធម្យតា ។ តែដូនកាល
វាមានបញ្ហាឌែន្ទោដល់ការរកិលូណុល ដូចជា ៖

០ រហកស្ស្រួល

០ មានគីសនៅក្នុងអូវ (Cystic Ovaires)

នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង ៥០% នៃការក្ររក
ិលូណុល បណ្តាលមកពីស្ថានភាពដឹងខ្ពស់មិនល្អ (ស្ថុម
ស្តាំង) ឬចំណីអាហារបំបែន។

ការព្យាពាល

បញ្ហាផីស

០ ចាក់ប្រុស្ថាត្តីខិន ដូចជាលុយតាមីស ៥សេ
ស៊ី (Lutalyse) និង

០ ផ្តល់បន្លេមន្ទីស្តីកដំឡុងមីស្តុក រួមជាមួយស្រោះ
ដើសមានគុណភាពល្អ

០ ផ្តល់បន្លេមន្ទីចំណីសម្រចចុំដោយខ្ពស់នឹង
បុតិទិន្នន័យ



កំចាក់ច្បាប់ដើសមានសកម្មភាពបានយុរ
នៅសាប់ដុំត្រូគោក

០ ចាក់វិតាមីនចប្បេះជាប្រចាំ ។

៦.២. បញ្ហាបង្ហាគមិនជាប់

មេគោរកិលូណុលធម្យតា តែពេលបង្ហាគត្រូចមិន
ជាប់ បុមិនធើម ។

បញ្ហាសំខាន់អាចបណ្តាលមកពី ៖

◎ រាកស្សនដែលបង្ហើនដោយ ចាកតេវជាបច្ចុល និងវាយលុកលើស្សន ជាពិសសក្រាយ ពេលកែតក្នុងភ្នាម (អំប្លិយុងមិនអាចលួតលាស់ ក្នុងស្សន ដែលមានបញ្ជាលាកនេះទេ

◎ តែង្វនកាលបញ្ញានេះ អាចបណ្តាលមកពីមេគោរា ។

ការព្យាពាល បញ្ញាលាកស្សន



"ការថែរក្សាសុខភាពសត្វជាការកិច្ចចម្លៃ"

បញ្ហាលាក់ស្សន

- ថាក់ប្រុសត្ថូងខិន ដូចជាលុយតាលីស ៥សែស (Lutalyse) ដោយថាក់ពីរដែន ហើយការថាក់លើកទី ២ ធ្វើឡើងក្នុងរយពេល ១១-១៤ថ្ងៃក្រោយលើកទី ១ ។
- ថាក់អង់ទីបីយីទីក ដូចជាតេត្រាសីត្ថូន (Tetracycline) ឬទួយសីន (Tylosine) ៥ថ្ងៃជាប់ត្រា ។

ធមានបញ្ហា

- នៅពេលម្នាស់សត្វប្រយោមុខនឹងបញ្ហាដាក់មិនជាប់នេះហើយកំណត់ថា មកពីថា ដូចនេះគឺជាប្រើប្រាយបែងចាយ ។

៦.៣. បញ្ហាប្រុខុះតាមផ្លូវបន្ទូន

ក្រោយពេលកែតក្នុន ស្សនមានមេភេទជាថ្វីនចូលតាមផ្លូវបន្ទូន ។ ជាងម្ខាតា ២-៣ថ្ងៃក្រោយ ស្សនអាចធ្វើការបញ្ចប់មេភេទទាំងនេះមកក្រោ និងការពារកុឃុមានបញ្ហាបង្គិជីជល់វា ។



ទាំងប៉ុន្មានក្នុងបន្ទូន ដែលបានបញ្ហាបញ្ហាប្រុខុះ

ការព្យាពាល

- ថាក់ប្រុសត្ថូងខិន ដូចជាលុយតាលីស ៥សែស (Lutalyse) ដោយថាក់ពីរដែន ហើយការថាក់លើកទី ២ ធ្វើឡើងក្នុងរយពេល ១១-១៤ថ្ងៃក្រោយលើកទី ១ ។
- ថាក់អង់ទីបីយីទីក ដូចជាតេត្រាសីត្ថូន (Tetracycline) ឬទួយសីន (Tylosine) ៥ថ្ងៃជាប់ត្រា ។

ការការពារ

ក្រោយមេគោកឱកតក្នុនបាន ២៤ថែង ត្រូវថាក់ប្រុសត្ថូងខិន (Prostaglandin) ម្នង ហើយត្រូវថាក់ម្នងទៀតនៅ ២សប្តាហ៍ក្រោយ ។



៦.៤. បញ្ហាលុយត្ថូន

ជំងឺប្រុយសេលទួយសីស (Brucellosis)

នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងរកយើងប្រកែទជំងឺប្រុយសេលទួយសីសនេះនៅឡើយ ។ ជំងឺនេះអាចបង្គគ្រោះថាក់ចុងក្រោមដែលមនុស្ស ។

គោលការណ៍ដំឡើនេះដោយសារលេបចូលនូវបាក់តែ វិដែលមានប្រើប្រាស់នៅក្នុងកូនរលួត ភ្លាសស៊ីន បុទិកវំអិល ខ្លួនបែរចេញពីស្អែន។

ពេលបាក់តែវិចេញមកមធ្យជានខាងក្រោម វាមាន ធ្វើការចម្លងទៅមនុស្ស ហើយបង្ហាញបញ្ហាប្រឈម ដូចជា គ្រុនក្រោល ឬមិនទៀងមុនក្រោម មុនត្រជាក់។

ការព្យាពាល

- ① ប្រើកែត្រាសីតិន (OTC) បុយកលូចាក់ភ្លើវតែ ត្រាសីតិន (Chlortetracycline) រយពេល ២ សប្តាហ៍។

ជំនួយបុគ្គលិកសីស (Leptospirosis)

សត្វកណ្តាល គឺជាមួកដួរកជំនួយបុគ្គលិកសីសហើយ ធ្វើការចម្លងតាមរយៈទីកនោមរបស់វា។

ក. ភោគសញ្ញា

- ① រលូតកូន ពិស់សលើមេកូនជំបុង
- ② កូនស្ថាប់ក្នុងពោះ បុកូនកើតមិនគ្រប់ខែ បុកូន កើតមកខ្សោយ
- ③ ចំពោះកូនគោ មានភោគសញ្ញាគ្រុនក្រោម មិនសុចិត្ត ពិចាកដដើម្បីម ខំណ្ឌាលើវីង នៅមុខមាន និងស្រែកស្អោះ។

2. ការព្យាពាល

- ① តែត្រាសីតិន (Tetracycline)
- ② បុប័ណ្ឌស្រីប បុប័ណ្ឌស្រីខិះអេចអេស (Peni DHS)


ជំនួយសាកល់មួរណាលទ្វូសីស (Salmonellosis)

ក. ភោគសញ្ញា

- ① រលូតកូន
- ② ប្រើប្រាស់មេកូត្រីមជាមួយសុលប្រា (TMP + Sulfa)
- ③ អង់រូបុកសាក់សីន (Enrofloxacin)
- ៦.៤. បញ្ចាតិចាកកកើតកូន

ការធ្វើយសផ្ទាងពេលធ្វើបង្រាតិចាកកកើតកូន


នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង កូនគោកើតមកក្រោម ថ្វាសដ្ឋុលណាស់ តែមេគោត្រវការជំនួយ ព្រោះកូនគោស្ថិតនៅទីតាំងខុសប្រក្រតី។ តែមេគោដែលបង្ហាត់ដោយសិប្បនិមិតជាមួយពួជសាន់តាត កូនអាចថ្វាស សម្រាប់មេគោ សម្រាលកូនវិចាល់ជាចម្លាត់ ចំណាយពេល ២ម៉ោង ក្រោយពេលបេកទិកត្រោះ។ ប្រសិនបើលើសពីនេះ គោត្រវលូកដែងចូលតាមប្រជាប់បន្ទូដ ដើម្បីកំណត់ពីបង្ហានៗឱ្យបានច្បាស់លាស់។



ជំនួយគោកក្រោះចេញមកក្រោម



សុកមានសកាតណាក់លើវីង



ក្រាលបត់ទៅក្រោយ

បញ្ហាថ្វីនជូនប្រទេស


◎ ក្នុងក្នុងស្បែនដែលមានទីតាំងជម្លាតាតីដើរដឹងមុខ ទាំងពីរហាងទៅមុខ ហើយធ្វើការជាងស្តាំលើកទេវីន្យរម ជាមួយចង្ការដើរដឹងមុខ ។

◎ តែងជាលកាលក្នុងគោលការណ៍លមកដូចបង្កើតក្នុងទីតាំង ខុសប្រក្រតិដូចជា បញ្ញាស បុគ្គចមកមុន ដើរដឹងមុខមួយ បុព្ទិរបត់មករករាយ ក្នាលបត់ទៅរករាយ ។ ឥឡូវខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ និងផែនល្អប្រចាំខែ៖

ការលួកដោ

ត្រូវសម្ងាត់ដែលឱ្យស្ថាត ដោយកាត់ក្រចកឱ្យខ្លួចលួកដែលចូលទៅក្នុងប្រជាប់បន្ទូន ដើម្បីឱ្យដឹង ច្បាស់ពីសភាពរបស់ក្នុងគោលប្រចាំថ្ងៃ សភាពក្នាលបុគ្គចេញ មកមុន ទីតាំងដើរដឹង ។


ដើម្បីឱ្យដឹងថាក្នុងគោលសំខាន់សំខាន់ប៉ុណ្ណោះ ត្រូវចូច អណ្តាត ក្នុងគោល ប្រសិនបើនៅរៀសក្នុងគោលនឹងប្រើប្រាស់ទាញអណ្តាត ចូលរិញ្ញ ។




គួរបានបញ្ជូនកម្ពុជា

ការធ្វើយក្នុងគោលរករាយពេលធ្វើយបង្កើតវិច

- ជួរសំអាតទីករអិលនៅមាត់ និងត្រួន
- ជួរខ្លួនវាទូស្ថាត ដើម្បីធ្វើយសម្រាប់ឱ្យក្នុងគោល
- ត្រូវយកចំបើនថាកំត្តារន្លែច្រម៖ បុ ដាក់វាទូ យុំងសំយុំងក្នាលចុះរកាម ហើយទេះវាទូមួយ
- ប្រើអីយីទីន ដើម្បីសំអាត និងសម្ងាប់មេហោត នៅទីនជីត



ទីតាំងក្នុងជម្លាតា




ក្នុងបញ្ញាស



លួកដែលចូលបានបន្ទូន

- ④ ពាក់ប្បសាត្សដែលជីន ដូចជាលុយតាមីស ៥សេ




ដើម្បីមុខម្ចាយបត់ទោករាយ



ប្រើខ្សែបន្ទូនដើម្បីមុខលើក្រុចក



ផ្តួចទាញដើម្បីបែង



ទាញក្នុងគោលបែងមកក្រា

- ⑤ ប្រសិនបើមេគោមិនព្រមលិខូក្នុង ត្រូវយកអំបិល មកលាបលើខ្លួនវា

- ⑥ ត្រូវពិនិត្យមើលលើការបញ្ចីកដោះដំបូង ។ បញ្ជាសុកមិនធ្លាក់

- ⑦ ប្រសិនបើកែតក្នុងរួចបាន ២៥ម៉ោង សុកនៅ តែមិនធ្លាក់ នោះវានឹងធ្វើឱ្យ មានបញ្ហា ដូចជាការផ្តួចយបង្កើតក្នុង

ស្ថានមិនរួចឡើង រកសភាពដើម និងមានការ ផ្តួចមេគោត


- ៨ ២៥ម៉ោងក្រោយពេលកែត សុកនៅតែមិនធ្លាក់ ប្រសិនបើអាច ត្រូវទាញយកដែកដែលជំចេញ ដោយខ្សែក មិនត្រូវយកដែលទាញយកសុកខាងក្រុងទាំងអស់ចេញនោះទេ ។



ដូចសំអាតក្នុងគោ

ការពេញបាយ

- ⑧ ពាក់តេត្រាសីតីន (Tetracycline)



ការទាញយកសុកបែង

សែ (Lutalyse) ដោយចាក់ពីរដង ហើយការ
ចាក់លើកទី ២ នៅ ១៥ថ្ងៃក្រោមឡើត ។

វិធានការបង្ហាន់

- ០ យកសុកនៅសល់ចេញ ហើយលាងសំអាតស្តូវ
- ០ ពេលរួលស្តូវចូលខាងក្បួនត្រូវចំនួនតាំងល្អហើយ
ត្រូវចាក់ច្នាំអុកសុធម៌តុកសុធម៌ ៤សេសេ
- ០ ដែឡារបន្ទូជុកចោលរយៈពេលបីថ្ងៃ
- ០ ចាក់គេត្រាសីតិធន (Tetracycline) រយៈពេល
បីថ្ងៃ ។

៧. ឧំនឹវាសធោះ (Mastitis)

ជំងឺលាសដោះបង្គទ្វីនដោយមេគោតចូលតាម
មុខរបស ប្រួនទីកដោះ ហើយធ្វើឱ្យ៖

- ០ ការផលិតទីកដោះចិយចុះ ធ្វើឱ្យក្បួនគោមិន
អាចចោរបានត្រប់ត្រាន់
- ០ ទីកដោះមានគុណភាពអន់ ធ្វើឱ្យក្បួនគោរក
ច្បែនផ្លូវ
- ០ ក្បួនករណីស្រួចស្រាវ ធ្វើឱ្យមេគោយីច្បែនផ្លូវ
ការសម្ងាត់លើបញ្ញាណាសដោះ
- ០ មេគោមិនឱ្យក្បួនចោរ ព្រោះវាមានការឈើចាប់
ខ្លាំង
- ០ ទីកដោះមិនស្ថាត ឬលើខុសពីធម្មតា
- ០ កនោរមោះមានសភាពក្រោ ឬឱ្យចាប់ និងហើម
- ០ មេគោយប់សុធម៌ និងត្រូវក្រោ

ការព្យាពាល

ការព្យាពាលទទួលដោតជីយទៅបានលុះត្រាតែ

ធ្វើការព្យាពាលឱ្យបានតាប់ និងត្រូវត្រូវដូចជា៖

- ០ ចាក់អុកសុធម៌តុកសុធម៌ (Oxytocin) ដើម្បីសម្រួល
ឱ្យកន្លែមដោះក្នោតបញ្ចូនទីកដោះ
- ០ ប្រចាប់បញ្ចូនទីកដោះក្នុកចេញពីកន្លែម
ដោះ ដោយប្រចាប់ មែនក្បួនក្បួន ១ថ្ងៃ
- ០ ចាក់ត្រូមេត្តត្រូមជាមួយសុធម៌ (TMP +
Sulfa) ហើយអាចចាក់បន្ថែមគេត្រាសីតិធន
(Tetracycline) ដឹងដើរ ក្បួនរយៈបីថ្ងៃ
- ០ ប្រសិនបើកន្លែមដោះទៀតវិនិច្ឆ័យ ត្រូវចាក់ដិច
ស្រាមេតាប្បួន (Dexametsone) ឬ តុលហេ
ីន (Tolfedine) ម្នាច ដើម្បីបន្ថែមការលាក់

៨. បញ្ញាលិខិតិថីឡើង (Moving)

- ៨.១. បញ្ញាលិខិតិស្តុយនៅដើរ
ដែលបានដើរដើរ ជាបញ្ញាលិខិតិដែលលួយ
នៅចំនួកដើរ បណ្តាលមកពីការធ្វើការក្បួនកក់ ។

៩. ហេតសញ្ញា

- ០ ពិចាកដើរ ពិការដើរ ជាទុទៅត្រីនកៅតែតែ
លើដើរម្នាច
- ០ ហើមនៅដើរ
- ០ វេហកស្រួកនៅចំនួកដើរ ហើយអាចយើង
មានខ្ពស់តិច។

១០. ការព្យាពាល

- ០ ចាក់សុធម៌ ៣៣ (Sulfa 33) តាម សរស់
ដីន មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ។

- ០ ចាក់ត្រូមេត្តត្រូមជាមួយសុធម៌ (TMP +
Sulfa) រយៈពេលបីថ្ងៃ ។

- ៨.២. បញ្ញាលាកស្រួកនៅដើរត្រូវក្រចកដើរ
ជាបញ្ញាម្នាចដែលធ្វើឱ្យជាតិស្រួកនៅចំនួក៖
ក្រចកដើរ និងខ្លួនដើរ ហើយធ្វើឱ្យគោមិនសភាព
មិនស្រួល ចិយកម្នាំងធ្វើការងារ ។ បញ្ញាល់ត្រីនកៅតែ
ទៀតវិនិច្ឆ័យនៅពេលគោរពនៅក្បួនកក់ ។

បញ្ញាលាកស្រួកនៅគោលក្រចកដើរនេះ ងាយ
ស្រួលភ្លាយទៅជាដែលស្តុយរលូយនៅក្រចកដើរ ។

ក្បាលដោះពីមានបញ្ញា

ការព្យាពាល

- ④ ប្រើប្រាស់ម៉ាលីន ៣% (Formaline 3%) ពីរ



ស្ថិតិករហេក និងហេមដើធន

ដឹងក្នុងមួយចំឡ ប្រើយោទេលីថ្មី

- ④ ប្រើប្រាស់ដឹងសិលប្បាត ៥% (Copper Sulfate 5%) ។

៤.៣. ឈាកសន្លាក់

មួលហេតុដែលបង្ហូរលាកសន្លាក់មាន ៩

ក. បង្ហើនឃើនដោយ

④ រូសនៅសន្លាក់

- ④ ជីវិត្យុ (ប្រើយោស់លទ្ធសុស មិកុត្តាស្ទា)

- ④ គោប់ធោក្តុនដែលមានបញ្ហាមេខាតនូវកាល ស្សីម ធ្វើស្អោះ និងជីវិត្យុផ្សេងៗទៀត

ខ. ពេតសញ្ញា

- ④ ពិកា

- ④ ពេលស្អាយនៅសន្លាក់ គោមានការឈើចាប់ខ្នាំ

ម. មិនសូវសុវត្ថិភាព

- ④ ប្រើអនុវត្តកសាក់សុីន (Enrofloxacin) ប្រើ

ទ្វូសុីន (Tylosin) ដោយប្រើយោទេលីថ្មី

៥-ពីថ្មី

- ④ បីនីបិយតាប្បួន (Phenylbutazone)

- ④ បុខិពិន (Dypirone) មានអាងាបារំង (Analgine)

- ④ បុកាលម៉ាបារំង (Calmagine)

- ④ បុគុលប្រើខិន (Tolfedine)

ក្រចកដើធនដុះវិន



សន្លាក់ហេម

៥. ក្រចកដើធនដុះជាប្រចាំ

- ④ ជួនកាលក្រចកដុះលើវិន ហេមដើធនដុះ

- ④ ធ្វើឱ្យគោនៅមិនសុខ និងបង្ហើឱ្យវាតិការ

ការព្យាពាល

- ④ កាត់ក្រចកដែលដុះដើធននេះចេញ ដោយកាត់បន្ទិចមួយចាប់ពីកាត់ដល់ស្ទើសាង


- ④ បន្ទាប់ពីកាត់ចេញ ត្រូវយកដែកតាម មក្សសទៅ មក្រចកឱ្យស្ទើ ។

រូសដោយសារត្រូវផ្សេងៗក្នុងដី

រត្តុផ្សេងៗទៀតជូចជាចុំចុំ អំបែងដប/កែវ ប្រើដែកគោល អាចមានបង្ហប់ក្នុងដី ។

ក. ពេតសញ្ញា

- ④ គោដើរការខ្សោចដើធនបន្ទិច



សកាតក្រចកមុនពេលភាគត់

- សកាតរបសវាងអាស្រីយទៅលើទីកាំងដែលដី
ជ្រាបចូល បុសភាព របួស

២. ការព្យាពាល

- ដឹកវត្ថុដែលមុកពេនះចេញ
- លាងក្រចកដើរទីកាំងមូលជាមួយ អើត្រសែនពី



សកាតក្រចកមុនពេលភាគត់

ឬកសីដ (Hydrogen Peroxyde)



ត្រូវពិនិត្យមើលដីជាប់នៅបាតដើម្បី

- ថាក់អាមីកសីលីន អិលអេ (Amoxillin LA)

៤. បណ្តុះខ្លួន

- ឱនធដោយសារទេសជង់

បណ្តុះខ្លួនមកពីការថាក់ច្បាប់ខ្លួនតាមពេលប្រើច្បាប់ដែលមានសកម្មភាពបានយុរ។

ការព្យាពាល

- ថាក់ដីចហ្មាមេតាប្បន (Dexamethasone)
រៀងរាល់ ២ថ្ងៃម្ខាង ដោយប្រើរយៈពេល ២
សប្តាហ៍។

៥. ផែកយុរ

- គោទន់/ស្តីក ស្រពន់ដើរឃើងមុខ ដោយសារគោ
ស្តី និងខ្សោយ មិនអាចក្រោកឈរយុរថ្ងៃ
- សាច់ដីមិនអាចការពារប្រព័ន្ធប្រសាធារណ ហើយ
ប្រព័ន្ធប្រសាធារណការខុចខាតនៅពេលគោដែក
តែម្ខាយចំហេងខ្លួន ដោយមិនអាចប្រើប្រាស់បាន
នៅ។

ការព្យាពាល

- ជូយគោដែលទន់ខ្សោយឱ្យក្រោកឈរ ២ដង
ក្នុងម្ខាយថ្ងៃ



កំពាក់ច្បាប់ដែលមានសកម្មភាពបានយុរ
នៅសាច់ដីត្រូវកែវក

- ថាក់ច្បាប់ផ្ទុយលើកកម្មោះដូចជាការសីល (Carasil)
អេមាតូប៉ង់បេ ១២ (Hematopen B12)
- យកចំបើងមកដុសជូតនៅស្តា និងភ្លោះ។