



ក្រសួងការសែនកម្ម នគរបាលរាជ សិទ្ធិសាស្ត្រ

សត្វប្រព័ន្ធឌ់លេកវារ ជាក់ប្បែករារពារជីវិធម្មនភាព

Foot and Mouth Disease



ស្រុំចំណោម : នាយកដ្ឋានជនិតកម្ម និង បសុព្ទាល

នាសយដ្ឋាន : ផ្លូវ សម្រាប់ ក្នុងក្រុង សង្កាត់ស្តីឱ្យមានជីយ
ខណ្ឌមានជីយ រាជធានីភ្នំពេញ

ចុះត្រួតចូលរំលែក : ០១២ ២១៤ ៩៨០

០១២ ៩៣៣ ៩៨៩

ខ្លះតុល្យជីយ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍនិស័យកសិកម្ម Loan 2022-CAM(SF)

តើខ្លួនឯសភាមជាស្តី ?

ជីវិធម្មនភាព ជាជីវិធម្មនដែលកែវិកមានលើចំពោះសត្វដែល
មានចំង្បកដើរដូចជា៖ តោ ក្របី ដ្ឋែក ពៅព និងចេរ៉ែម. ។
ជីវិធម្មនភាពឡើងនៅ ពាសពេញពិភពលោក ធ្វើឱ្យមាន
ដែលប៉ះពាល់យ៉ាងច្បែងច្បែងដែលកម្បាប់អូសទាត់ សេដ្ឋកិច្ច
ត្រូវរាយ និង សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។

ការបង្កើត និងការរាយជាមួយ:

ជីវិធម្មនភាព នឹងបង្កើតឡើងឡើង ការបង្កើត និងការរាយ:
ការប៉ះពាល់ជាមួយសត្វឈើ មនុស្ស បុ សម្បារ ប្រើប្រាស់
ដែលប្រឡាក់ប្រឡូសដោយមេរោគ ។ មេរោគនេះជីវិធម្មនភាព
អាចបើរកាមួល និង ប្រារពាមទីក ។ ជីវិធម្មនភាព
កែវិកម្មនៃការបង្កើត និងការរាយ:

- ការប្រើប្រាស់ខោអារ៉ីស្សកដើរ និង បុ សម្បារប្រើប្រាស់
ដែលប្រឡាក់ប្រឡូសមេរោគទៅប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសត្វ
- ការផ្តល់ចំណើនី និង ទីកដែលប្រឡាក់ប្រឡូសមេរោគ
- ការដើរកនាំសត្វ ដោយមធ្យាយដើរជានៅ ដែលប្រឡាក់
ប្រឡូសមេរោគ
- ការនាំសត្វដែលមានជុំកមេរោគចូលមកក្នុងបាន
- ការដាក់សត្វនៅក្នុងដែលមានជុំដី ។

កោតសត្វរោង:


រយៈពេលមេភាគសម្ប័មានពី ១៨ ម៉ោងទៅ ០៣ សប្តាហ៍ ។

ភាគសត្វរោងដែលយើពុមាននៅពេលជុះជីវិមាន៖

- សត្វមានអាការ៖ គ្រឿនកោះ ជាតិសេសចំពោះសត្វដែង សិតុណ្ឌភាពឱ្យចុះមកវិញនៅ ៤៨ ម៉ោងក្រោយ
- ពងដោរ និង ជីថានៅលើមាត់ អណ្តាត បបុរាណាត់ បណ្តាលឱ្យមានការហេរវិកមាត់សិតអន្តាយ មានបែកពុះមាត់ មានបុរិកមាត់យ៉ាងច្រើន និង ពិចាកសិធម៌ណី ។



- ពងដោរ និងជីថានៅថ្ងៃចុងដោរ៖ ចន្ទោះចង់កដើរ និង តល់ក្រចកដែលធ្វើឱ្យសត្វពិចាករួរ និងធ្វើចលនា
- ពងបែកបុរិករដៃថ្ងៃ បុខាប់ និង បន្ទូលចុះស្អាម របុសនៅកំនែងមានពងបែកនៅ៖
 - ការរួមឱ្យក្នុងកែតមានជាតិកញ្ចប់
 - ជីងិអុតកាមកម្របណ្តាលឱ្យសត្វស្សាប់ណាស់ បុន្តែការធំជាត់ឡើងវិញក្រោយពិសត្វយើមានការយើតយ៉ាវ
 - ការស្សាប់អាជកែតមានចំពោះកុនសត្វ ដែលទើបនឹងកែត និងជួនកាលកំអាជកែតមានដល់សត្វចាស់ជងជោរ ។



ពិចារណាសារពារៈ

- ត្រូវប្រព្រោះរាយការណ៍ដូនមន្ទីរសុទេស្ស ឬ ភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិដែលនៅជិតអ្នកបំផុត នៅពេលសត្វមានផ្លូវជីអុតកាម
- ត្រូវបែបសត្វឃើមិថ្នាំប្រឹង
- ត្រូវធ្វើអនាម៉យកនៅឯធមសត្វជាប្រចាំ
- ត្រូវផ្តល់ចំណើនាបារមន់ទៅ
- ត្រូវលាងសំអាតរបុសដោយទីក្រុង
- ត្រូវលាបមុខរបុសដោយចុះហើយទីក្រុង
- ហាយចែលនាសត្វថ្នាំ-ថ្នូល ឬ ផ្លូវជីអុតកាមកាត់តំបន់ផ្តុះជីជុំ
- ហាយទីក្រុង-លក់សត្វគ្រប់ប្រហេតុ ដែលមានជី បង្កើតមេរក

វិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការប្រួលប្រាញប្រឆាំង

និងជីអុតកាមទី ការចាក់ច្បាក់ការពារ (ចាក់វាក់សំង) ជាមុន ។ ការចាក់វាក់សំងការពារជាមុន មិនត្រូវមែនអាចការពារសត្វមិនឱ្យកើតជីអុតកាមប៉ុណ្ណោះទេ តែម៉ែនបានជីអត្ថប្រយោជន៍ជាប្រើប្រាស់ជាប្រើប្រាស់ដោយបានដែលទ្រូវបានដែឡើងទេ

- សត្វមិនឃើម និង មិនផ្លូវជីជុំដែលទ្រូវបានដែឡើងទេ នៅពេលនៅក្នុងផ្តុះជីក្នុង
- សត្វការណ៍ និង មានសុខភាពល្អ

- ច្បាក់ការពារ(វាក់សំង) មានតម្លៃថាក់
 - កាត់បន្ទូយការចំណាយថីកាត្រូងការពារបាល
 - បង្កើនប្រាក់ចំណូល
- ដូចនេះ ដើម្បីការពារសត្វកុំឱ្យកើតជីអុតកាម ត្រូវចាក់វាក់សំងការពារសត្វឱ្យបានទេរងទាត់តាមប្រពិទិនចាក់ច្បាក់ការពារ ។ វាក់សំងការពារជីអុតកាម ផ្តល់ភាពសុវត្ថិភាពល្អស្ថិតិភាព បានក្នុងរយៈពេល ១០-១២ ខែ ។



គ្រឿងស្រួលបានចាក់ការពារជីអុតកាម

គំនាល់ចំណាំ:

ចាក់វាក់សំងមួយមុខ គឺអាចការពារជីអុតកាមប៉ុណ្ណោះ បានពេលមួយមុខប៉ុណ្ណោះ ។

ការការពារសត្វទីរបោល ការពារសត្វខ្មែរ