

ការដាំត្រកូន

១. លក្ខណៈទូទៅរបស់ត្រកូន

ត្រកូនជារុក្ខជាតិត្រូវការពន្លឺថ្ងៃ និងទឹកគ្រប់គ្រាន់។ វាអាចដុះលូតលាស់លើដីគ្រប់ប្រភេទ ជាពិសេសដីល្អាយ ខ្សាច់ដែលមានជីជាតិ។ យើងអាចដាំវាបានគ្រប់រដូវទាំងនៅលើដី និងក្នុងទឹក។

តើមានហេតុផលឬអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យយើងដាំត្រកូន?

- ១- មានជីជាតិច្រើនសម្រាប់ចិញ្ចឹមរាងកាយ
- ២- ងាយស្រួលដាំថែទាំ និងងាយស្រួលលក់នៅទីផ្សារ
- ៣- ឆាប់បានប្រមូលផល និងប្រមូលផលបានច្រើនដង
- ៤- អាចដាំដុះបានលើផ្ទៃដីគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រប់រដូវឲ្យតែមានទឹកគ្រប់គ្រាន់
- ៥- ដើម ស្លឹកយកទៅធ្វើម្ហូបបានច្រើនមុខ និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់មនុស្ស និងអាចធ្វើជាចំណីសត្វ (ជ្រូកមាន់)។
- ៦- ងាយស្រួលក្នុងការថែរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ។

តើត្រកូនមានសារធាតុអ្វីខ្លះ?

- វីតាមីនសេ :** ជួយរក្សាឆ្មេញ និងអញ្ចាញឆ្មេញឲ្យមានសុខភាពល្អ ។ បង្កើនសមត្ថភាពទប់ទល់ ឬភាពស៊ាំនឹងជំងឺផ្សេងៗ
- វីតាមីនបេ :** ជួយឲ្យសរសៃប្រសាទដំណើរការ និងបង្កើនការរំលាយអាហារ។
- វីតាមីនអា :** ជួយឲ្យភ្នែកភ្លឺមើលឃើញបានច្បាស់ល្អ។
- ជាតិដែក :** ជួយក្នុងការបង្កើតគ្រាប់ឈាមក្រហម ជាពិសេសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវញ៉ាំត្រកូនឲ្យបានច្រើន។
- ប្រូតេអ៊ីន :** ជួយដល់ការលូតលាស់ខាងរាងកាយជាពិសេសសាច់ដុំ។
- កាល់ស្យូម :** ជាសារធាតុវីតាមីនសម្រាប់ជួយឲ្យឆ្អឹង និងឆ្មេញរឹងមាំ ។

២. ការរៀបចំដីត្រកូន

ចង់ឲ្យត្រកូនដុះលូតលាស់បានល្អ យើងត្រូវរើសទីកន្លែងដាំ និងធ្វើរងឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមរដូវនីមួយៗ។

៣. ការជ្រើសរើសទីកន្លែងដាំ

ការជ្រើសរើសទីកន្លែងដាំជាការសំខាន់បំផុតដើម្បីជៀសផុតពីការខូចខាតនិងដើម្បីទទួលបានផលបានច្រើន។

- រដូវប្រាំង :** ជ្រើសរើសទីកន្លែងដាំជិតប្រភពទឹក ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្រោចស្រព។
- រដូវវស្សា :** ជ្រើសរើសទីកន្លែងដាំនៅលើដីទទួលខ្ពស់មិនលិចទឹក ។

អ្នកជំនាញ : ក្រកួនគោកអាចដាំបានគ្រប់រដូវឲ្យកែងដីមានជីជាតិ និងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់។

៤. ការធ្វើទេជាំ

- ឧបករណ៍រៀបចំដី និងដីទ្រាប់បាតរង - ចបជីក ចបកាប់ - រនាស់ដៃ បង្គី
- ខ្សែម៉ែត្រ - បង្គោលចុងស្រួច - ជីកំប៉ុស្ត ជីលាមកសត្វ



៤.១. ការធ្វើទេជាំនៅរដូវវស្សា

- ១- កាប់ដីហាលរយៈពេល១០ថ្ងៃ ទុកឲ្យស្ងួត ទើបវាយបំបែកដីឲ្យម៉ដ្ឋ ។
- ២- លើករងក្រកួនដែលមានទទឹង១ម៉ែត្រកំពស់១តឹកកន្លះទៅ២តឹក ឯបណ្តោយអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពដី ផែង ឬខ្លី។

ហេតុអ្វីត្រូវលើករងឲ្យខ្ពស់នៅរដូវវស្សា?

ដើម្បីការពារទឹកដក់ ឬលិចរង ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំ ។

៤.២. ការធ្វើទេជាំនៅរដូវប្រាំង

- ១- កាប់ដីហាលតែរយៈពេល ១អាទិត្យ បន្ទាប់មកវាយបំបែកដីឲ្យម៉ដ្ឋ។
- ២- លើករងដាំដែលមានទទឹង ១ម៉ែត្រ កំពស់១តឹក និងបណ្តោយអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពដីផែង ឬខ្លី។

៥. ការដាក់ខ្សែទ្រាប់បាត

- ១- យកជីកំប៉ុស្ត ឬជីលាមកសត្វផ្សេងៗ ដែលពុកផុយមកពាយពីលើរង។
- ២- យកចបកាប់មកជ្រៀវដីត្រឡប់សារចុះសារឡើង ដើម្បីឲ្យជីចូលទៅក្នុងដី។
- ៣- យករនាស់ដៃមករាស់ដីឲ្យបានស្មើល្អ ។

អ្នកជំនាញ

- ត្រូវវាយជីកំប៉ុស្ត ឬជីអាចម៍គោដែលពុកផុយ ចំនួនពី ៣ ទៅ៥គីឡូ នៅលើដីមួយម៉ែត្របួនជ្រុង ។
- មិនត្រូវយកជីកំប៉ុស្តទៅចាក់គរទុកចោលនៅលើរង ដោយមិនជ្រកឡប់នោះទេ ព្រោះវាធ្វើឲ្យសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងដីហើរទៅតាមខ្យល់។

ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ពូជដុះបានល្អ យើងត្រូវយកគ្រាប់ពូជណាដែលគ្មានជម្ងឺ គ្មានការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត និងមិនទុកយូរឆ្នាំ។

៦. ការរៀបចំគ្រាប់ពូជ

សម្ភារៈសម្រាប់បណ្តុះ និងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ដាំ

កូនឈើសម្រាប់ឆ្លុះកងដាំ ចង្កេះ ចានដែក ក្រណាត់សម្រាប់ខ្ទប់គ្រាប់ពូជត្រកូន កំទេចចំបើង។



កូនឈើសម្រាប់ឆ្លុះកងដាំ ចង្កេះ ចានដែក



៧. របៀបបណ្តុះ

- ១- យកគ្រាប់ពូជមកអុំរោយ និងរើសកំទេចកំទីសំរាមចោល។
- ២- ដាក់គ្រាប់ពូជសំដីលហាលថ្ងៃស្រទន់រយៈពេល ១ទៅ២ម៉ោង ដើម្បីសម្លាប់មេរោគដែលនៅជាប់នឹងគ្រាប់។
- ៣- ត្រាំគ្រាប់ពូជក្នុងទឹករយៈពេល ១២ម៉ោង (១យប់)។
- ៤- ស្រង់គ្រាប់ពូជ រួចយកក្រណាត់មកខ្ទប់ និងផ្សើមទឹកឲ្យសើមៗជានិច្ច។ ផ្តាច់ទុកពី ១ទៅ២យប់ ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ដុះពន្លកទើបយកទៅដាំ ។



អ្នកដាំគួរដឹង

ត្រូវហាលគ្រាប់ពូជនៅពេលថ្ងៃស្រទន់ គឺចន្លោះពីម៉ោង៨ ដល់ម៉ោង១១ព្រឹក ។ ហាលគ្រាប់ពូជនៅក្រោមថ្ងៃក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យគ្រាប់ពូជស្ងួតពេក ជាហេតុនាំឲ្យគ្រាប់មិនដុះ។

៨. ការសាងគ្រាប់ ឬការដាំ

តូចកូនចង្កូរកាត់ទទឹងរងជំរៅ១សង់ទីម៉ែត្រនៅរដូវប្រាំង និង២សង់ទីម៉ែត្រនៅរដូវវស្សា ។

របៀបដាំ

- ១- តូកដាំដោយទុកចន្លោះពីចង្កូរមួយទៅចង្កូរមួយចម្ងាយកន្លះតឺក នៅដូរព្រាំង និង១តឺកនៅដូរវស្សា។
- ២- វាយគ្រាប់ដោយទុកចន្លោះពីគ្រាប់១ទៅ១ ប្រវែងមួយសង់ទីម៉ែត្រ នៅដូរព្រាំង និងប្រវែង ២សង់ទីម៉ែត្រ នៅដូរវស្សា។



អ្នកជំនាញ

វាយគ្រាប់តាមកូនចង្កូរឲ្យស្មើៗ។ នៅលើផ្ទៃដីមួយម៉ែត្របួនជ្រុងត្រូវប្រើគ្រាប់អស់ចំនួន ៥ក្រាម។ ក្រោយពីវាយគ្រាប់ត្រូវរួច ត្រូវយកកំទេចចំបង ឬកំទេចស្លឹកឈើគ្របពីលើដើម្បីការពារកុំឲ្យហ្មតសំណើម ។

៩. ការថែទាំមុនពេលប្រមូលផល

ដំណាំត្រកូនមិនពិបាកថែទាំទេ គឺយើងគ្រាន់តែដកស្មៅ ស្រោចដី និងស្រោចទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ប៉ុណ្ណោះ។

១០. ការស្រោចទឹក និងការធ្វើស្មៅ

ដំណាំត្រកូនត្រូវការទឹកច្រើន។ ប្រសិនបើខ្វះទឹក ដើមត្រកូនលូតលាស់មិនបានល្អទេ វាក្រិន ឬរឹង ។

- នៅដូរព្រាំងក្រោយពីដាំហើយ យើងត្រូវស្រោចទឹកឲ្យជោកមួយថ្ងៃ ២ដង (ព្រឹក និងល្ងាច)។
- ជ្រំដី និងដកស្មៅជុំវិញគល់ត្រកូនឲ្យបានញឹកញាប់ក្រោយពីត្រកូនដុះបានរយៈពេលពី ៤ ទៅ ៥ថ្ងៃ ព្រោះក្នុងរយៈពេលនេះស្មៅកំពុងដុះលូតលាស់ប្រវែងជាមួយត្រកូនដែរ ។

អ្នកជំនាញ

នៅដូរវស្សាយើងមិនបាច់ស្រោចទឹកទេ។ ប្រសិនបើមានភ្លៀងដក់ទឹកច្រើន ត្រូវបង្ហូរទឹកចេញពីដី។ ការជ្រំដី និងការធ្វើស្មៅធ្វើឲ្យដីធូរងាយជ្រាបទឹក ខ្យល់ចេញចូលបានស្រួល និងធ្វើឲ្យត្រកូនដុះបានល្អ ហើយមានដើមឆ្លី។

១១. ការធ្វើជីធីត និងការស្រោចជីធីត

ត្រកូនក៏ដូចជាដំណាំផ្សេងទៀតដែរ ដែលត្រូវការជីសម្រាប់បំប៉នបន្ថែម ដើម្បីឲ្យកាន់តែដុះលូតលាស់ល្អ។

ឧបករណ៍និងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ធ្វើជីធីត

- ពាងសម្រាប់ត្រាំដី - ឫស្សី ឬឈើសម្រាប់កូរដី - ក្បាលពោះវៀន និងអាចម៍កង្កែប ១គីឡូ
- ខ្យង១គីឡូ - ខ្លា១គីឡូ - សំបកក្តាម១គីឡូ - សំបកខ្នុរ - សំបកល្អុង - អាចម៍មាន់០,៥គីឡូ - អាចម៍ប្រចៀវ ០,៥គីឡូ
- ទឹក - ស្ករត្នោតឬទឹកស្កររង - ស្លឹកអង្កាញ



១២. របៀបធ្វើជីកម្រភេទទី១

- ១- យកក្បាលពោះវៀន និងអាចម៍កង្កែប ខ្យង ខ្នុរ សំបកក្រហម សំបកខ្មៅ សំបកល្អង អាចម៍មាន និង ប្របៀវទៅដាក់ក្នុងពាងរួចច្របលំលាយចូលគ្នាឲ្យសព្វ។
- ២- ចាក់ទឹកប្រមាណ ១០០លីត្រ ចូលទៅក្នុងពាងរួចកូរឲ្យសព្វ។ យកគំរបពាងគ្របពីលើឲ្យជិតដើម្បីឲ្យទឹកជីឆាប់កាច់។

អ្នកដាំគួរដឹង

ពាងទឹកជីតូច ឬធំ អាស្រ័យទៅតាមបរិមាណជីដែលយើងចង់បាន។ រក្សាទុករយៈពេលពី ២០ទៅ២៥ថ្ងៃ ដើម្បីឲ្យទឹកជីកាច់ល្អទើបអាចយកទៅប្រើបាន ។

១៣. របៀបធ្វើជីកម្រភេទទី២

- ១- យកស្ករត្នោត ឬទឹកស្កររង្វ ១ភាគ និងស្លឹកអង្កាញ់ ៣ភាគ ដាក់ត្រាំក្នុងពាង ឬធុងមួយដែលមានគំរបបិទជិត។
- ២- មួយថ្ងៃបង្ហើបគ្របកូរម្តង ធ្វើដូច្នេះរយៈពេល ១៥ថ្ងៃ។ នៅពេលសង្កេតឃើញផ្សិតសៗអណ្តែតលើទឹកហើយទឹកជី មានពណ៌ដូចទឹកតែ ទើបអាចយកទឹកជីនោះទៅប្រើបាន។

១៤. របៀបថែទាំទឹកជី និងរបៀបប្រើ

ពាងជីទាំងពីរប្រភេទ ត្រូវរក្សាទុកក្រោមម្លប់ឈើ ឬរោងប្រក់ដំបូល។ ត្រូវយកឈើ ឬ ឫស្សីទៅកូរក្នុងពាងជីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលដើម្បីឲ្យជីឆាប់កាច់។ មួយថ្ងៃបើកគំរបពាងកូរពីរដង (ព្រឹក និងល្ងាច)។ ពេលបើកគំរបពាងកូរត្រូវពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារក្លិនជះមកលើ ។

អ្នកដាំគួរដឹង

នៅពេលប្រើ ត្រូវដួសទឹកជីកុំឲ្យដោយកាកក្នុងបរិមាណទឹកជី ១លីត្រ លាយជាមួយទឹកធម្មតា១០លីត្រ។ ក្នុងរយៈពេលពី ២ទៅ៣ថ្ងៃត្រូវស្រោចម្តង។ កុំស្រោចជីទឹកនៅពេលថ្ងៃក្រអែង ព្រោះអាចធ្វើឲ្យស្លឹកត្រកួនស្លោក។

១៥. ការប្រមូលផលត្រកួន

ក្រោយពីដាំរយៈពេល១៥-២៥ថ្ងៃ យើងអាចដក ឬកាត់ត្រកួនបានហើយ ។

១៦. ការប្រមូលផលមានពីររបៀប

យើងអាចដកត្រកួនទាំងឫស ឬប្រើកូនកាំបិតដើម្បីកាត់វាក៏បាន។

ការដកទាំងឫស :

- ១- យើងប្រើដៃចាប់ដកត្រកួនទាំងឫសច្រើនៗរួចដាក់ក្នុងកញ្ចែង។
- ២- បន្ទាប់មកលាងសំអាតដីដែលជាប់នៅនឹងឫសឲ្យបានស្អាត។

អ្នកគួរដឹង

ការប្រមូលផលដោយដកទាំងឫសធ្វើឲ្យយើងខាតបង់លុយច្រើន ។

ការកាត់ដើម

យើងប្រើកូនកាំបិតដើម្បីកាត់ដើមត្រកួន ដោយទុកគល់ពីដីប្រវែងពី ២ទៅ៣សង់ទីម៉ែត្រ ដើម្បីឲ្យត្រកួនលាស់ ក្រយាច្នី។

អ្នកគួរដឹង :

យើងអាចកាត់ត្រកួនបានចាប់ពី ៤ទៅ១០ដង រហូតដល់ត្រកួនលែងដុះលូតលាស់ទៀត ។

ហេតុអ្វីការកាត់ត្រកួនត្រឹមគល់នាំឲ្យយើងចំណេញច្រើន?

- ត្រកួនអាចដុះលូតលាស់បន្តទៀតដោយមិនបាច់ចំណាយលុយទិញពូជច្រើនដង។
- ឆាប់ទទួលបានផលជាងការដាំគ្រាប់ឡើងវិញ។
- មិនចំណាយកម្លាំងកាប់ដីនិងលើករងម្តងទៀត គឺយើងគ្រាន់តែជ្រុំបំផុសដីក្នុងរងឡើងវិញប៉ុណ្ណោះ ។

១៧. ការថែទាំក្រោយពេលប្រមូលផល

ក្រោយពីកាត់ត្រកួនរួចយើងចាំបាច់ត្រូវជ្រុំដី ដាក់ជីកំប៉ុស្ត ឬជីលាមកគោបន្ថែម និងបន្តស្រោចទឹក។

១៧.១. របៀបថែទាំត្រកួនក្រោយពីការកាត់

ក្រោយពីការកាត់ដើមលើកទី១ យើងអាចកាត់សារជាថ្មីក្នុងរយៈពេល ពី ១០ទៅ១៥ថ្ងៃ ម្តងជាបន្តបន្ទាប់។

ការជ្រុំដីនិងការដាក់ជី

- ១- ក្រោយពីកាត់ត្រកួនរួច ត្រូវកាប់ ឬជ្រុំដីនៅចន្លោះជួរត្រកួនក្នុងរង។
- ២- ដាក់ជីកំប៉ុស្ត ឬជីលាមកគោបន្ថែមចំនួនពី ២ទៅ៣គីឡូក្រាម លើផ្ទៃដី ១ម៉ែត្របួនជ្រុង ។
- ៣- បន្តការស្រោចទឹកដ៏បំប៉នបន្ថែម ២ថ្ងៃម្តង។ រួចបន្តការស្រោចទឹក ធម្មតាមួយថ្ងៃ ២ដង ព្រឹក និងល្ងាច ។



អ្នកដាំគ្រូជើង :

ត្រូវដាក់ជីធម្មជាតិ (កំប៉ុស្ត ឬ ជីលាមកសត្វ) នៅក្រោយពេលគាត់ប្រមូលផលភ្លាម ឬមុនពេលកាត់ ១អាទិត្យ ដើម្បីឲ្យគល់ដំណាំឆាប់ចេញត្រូវយថ្នី។

១៨. ការទុកដាក់គ្រាប់ពូជត្រកូន

យើងអាចដាំត្រកូនដោយរក្សាទុកពូជខ្លួនឯងបានដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទិញគ្រាប់ពូជឡើយ។

ធ្វើដូចម្តេចទើបត្រកូនចេញផ្លែ?

រយៈពេលរក្សាដើមត្រកូនដើម្បីយកគ្រាប់ទុកពូជត្រូវបន្តស្រោចទឹក និងធ្វើស្មៅរហូតដល់វាចេញផ្កាទើបបន្ថយការស្រោចទឹកមួយថ្ងៃខាងមួយថ្ងៃ។

កុំកាត់ដើមត្រកូន

១- រក្សាទុកដើមត្រកូនរហូតដល់រយៈពេល១ខែកន្លះទៅ២ខែរហូតដល់គ្រាប់ត្រកូនទុំល្អ ហើយបេះផ្លែត្រកូនរួចយកមក ហាលរយៈពេល ២ថ្ងៃ ។

២- ប្រលេះយកគ្រាប់ចេញ រួចហាលថ្ងៃរយៈពេល ៣០នាទី។

៣- អុំរោយយកកំទិចកំទីសំរាមចេញ។

៤- ច្រកគ្រាប់ចូលទៅក្នុងដបកែវ ចុកឆ្នុកឲ្យជិត(ឆ្នុកធ្វើអំពីស្មៅ ឬស្រកីដូងទុំ)ដើម្បីការពារសត្វខូតស៊ី។



ជៀសវាង :

ទុកគ្រាប់ពូជត្រកូនយូរឆ្នាំទើបយកទៅដាំធ្វើឲ្យគ្រាប់ដុះមិនស្មើគ្នាល្អហើយដើមលូតលាស់យឺត។ គ្រាប់ត្រកូនដែលដុះល្អ គឺទុកពី ១ឆ្នាំកន្លះចុះក្រោម និងរក្សាទុកដាក់ឲ្យបានល្អ។

១៩. ម្ហូបម្ហូបត្រកូន

យើងអាចយកត្រកូនទៅធ្វើម្ហូបបានច្រើនមុខ និងមានឱជារសឆ្ងាញ់ដោយមិនបាច់ប្រើប៊ីចេងឡើយ ។

ឆាត្រកូនប្រេងខ្យង :

ត្រកូន ប្រេងខ្យង ប្រេងឆា ខ្ទឹមស ម្ទេស ស្ករត្នោត អំបិល

១- លាងត្រកូនឲ្យស្អាត រួចកាត់វាជាកង់ៗ។

២- ដាក់ប្រេងក្នុងខ្ទះឆា ដាំឲ្យក្តៅ។ ចាក់ខ្ទឹមសចូលបំពងឲ្យឈ្ងុយ រួចចាក់ត្រកូននិងម្ទេសឆាចូលគ្នា ។

៣- ដាក់ស្ករត្នោត អំបិល និងប្រេងខ្យងចូល រួចឆាពីរបីត្រឡប់ ហើយភ្ជក់មើលតាមចំណង់ចំណូលចិត្តជាការស្រេច។

ញ៉ាំត្រកូនសាច់គោ: សាច់គោផុយល្អ ក្រូចឆ្មារ ទឹកត្រី ស្ករស អំបិល ទឹក ត្រកូន ដីគ្រប់មុខ ខ្ទឹមស ខ្ទឹមក្រហម សណ្តែកដីលីង ម្ទេស ។

- ១- ហាន់សាច់គោស្មើងៗ ប្រឡាក់អំបិលបន្តិច និងទឹកក្រូចឆ្មារ ទុកឲ្យឆ្អិនសាច់ទើបពូតយកទឹកចេញ។
បេះដីគ្រប់មុខយកតែស្លឹករួចលាងទឹកឲ្យស្អាត ។
- ២- យកទឹកសាច់គោលាយជាមួយខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំ ទឹកត្រី ខ្ទឹមក្រហមហាន់ស្មើងៗ និងស្ករស រួចយកទៅដាំឲ្យពុះ
ហើយភ្ជក់មើលតាមការចូលចិត្តដើម្បីទុកធ្វើទឹកជ្រលក់ ។
- ៣- ពុះត្រកូនជាពីររួចម្សៅត្រលប់ទើបហាន់ជាសរសៃ។ យកត្រកូនច្របល់ជាមួយសាច់គោ ទឹកជ្រលក់ រោយជីវ
និង សណ្តែកដីជាការស្រេច ។

២០. ម្ហូបម្ហូបផ្សេងៗទៀតពីត្រកូន

គេអាចយកត្រកូនទៅ :

- ឆាជាមួយសៀង ឬសាច់ជ្រូក-ឆាជាមួយប្រេង ជ្រលក់ទឹកអំបិលម្រេចក្រូចឆ្មារ -ស្ករជាមួយត្រី បង់ម្ហូប។
- ស្ករគ្រឿងជាមួយឆ្អឹងជំនីជ្រូក ឬសាច់គោ -ធ្វើបន្លែស៊ុបឆ្មាំងដី -ធ្វើភ្លាជាមួយសាច់គោ
- ធ្វើជ្រក់សំរាប់ញ៉ាំជាមួយសាច់អាំង -ធ្វើអន្លក់(ទឹកគ្រឿង ប្រហុក.....)
- ធ្វើរបោយ(មី មីស្នូ គុយទាវ នំបញ្ចុក ពោះគោទឹកប្រហុក....)។