



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations



This programme is co-funded by  
the European Union

**កម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យជលផលកម្ពុជា  
ប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន៖ ផ្នែកនេសាទ**

**ការតាមដាន តាមតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ  
នៅកន្លែងឆ្នើងផលនេសាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា**

## **របាយការណ៍ស្តីពីផលនេសាទសមុទ្រ ប្រចាំឆ្នាំ២០២២**

**ចងក្រងដោយ៖ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ជលផលសមុទ្រ**

ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះទទួលបានការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុប។ ខ្លឹមសារនៃការបោះផ្សាយនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលជលផល  
ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឡើយ។

# សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

របាយការណ៍ស្ថិតិប្រចាំឆ្នាំនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុប ក្រោមកម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យផលិតផលប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសពីអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (FAO) ដែលបានការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ។ សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះ លោក ស៊ុយ សេរីវឌ្ឍន៍ ប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ និងមន្ត្រីនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ ដែលបានផ្តល់ការណែនាំទូទៅ និងមតិយោបល់លើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយ និងលោក លី គន្ធី ដែលបានរៀបចំនិងវិភាគទិន្នន័យស្ថិតិប្រចាំខែសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ។ ការវិភាគទិន្នន័យនេះមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពី លោក Theo Visser (មន្ត្រីគ្រប់គ្រងផលិតផលទឹកសាបនៃអង្គការ FAO) និង លោក សូ ជាណា (អ្នកឯកទេសមូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃអង្គការ FAO) និងលោក អ៊ិន បូរិន (អ្នកឯកទេសស្រាវជ្រាវផលិតផលនៃអង្គការ FAO)។

## ចងក្រងដោយ

លោក ស៊ុយ សេរីវឌ្ឍន៍ និងលោក លី គន្ធី

ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសពីគម្រោង FAO CAPFISH

## គុណកថាបង្អែក

រដ្ឋបាលផលិតផល (២០២២)។ របាយការណ៍ស្ថិតិផលិតផលសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រនៃរដ្ឋបាលផលិតផល រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ៤៥ទំព័រ។

## ទំនាក់ទំនង

រដ្ឋបាលផលិតផល

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ

អាគារលេខ ១៨៦ មហាវិថីនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

© រដ្ឋបាលផលិតផល

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ ការបោះពុម្ពឡើងវិញទាំងស្រុង ឬផ្នែកណាមួយសម្រាប់គោលបំណងអប់រំ ឬមិនរកប្រាក់ចំណេញ មិនតម្រូវឱ្យសុំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាឡើយ ដោយគ្រាន់តែថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រភពដើម។ រាល់ការបោះពុម្ព ការចម្លង ឬចែកចាយសម្រាប់លក់បន្ត ឬគោលបំណងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលផលិតផល។

រាល់មតិយោបល់ និងមតិដែលបានបង្ហាញនៅទីនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធ ហើយមិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំហរបស់រដ្ឋបាលផលិតផល ដៃគូ ឬអង្គការ ដែលផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់គម្រោងនិងការបោះពុម្ពផ្សាយនោះទេ។

# សេចក្តីសង្ខេប

ការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ត្រូវបានអនុវត្ត រយៈពេល៨ខែ ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដោយមន្ត្រីនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលផលសមុទ្រ រួមសហការពីមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលផលផលខេត្តតំបន់ឆ្នេរ។ ការអង្កេតផលនេសាទនេះ បានធ្វើឡើងតាមកន្លែងផលនេសាទគោលដៅចំនួន៨ ក្នុងខេត្តតំបន់ឆ្នេរទាំង៤ និងបានធ្វើអង្កេតទូកនេសាទខ្នាតតូចចំនួន៤០៨ និងទូកនេសាទខ្នាតមធ្យមចំនួន១៣៨៣ សរុបទូកចំនួន១៧៩១ ត្រូវបានអង្កេតក្នុងឆ្នាំ២០២២។

តាមកំណត់ត្រាទិន្នន័យផលនេសាទទទួលបាន មិនមានបង្ហាញអំពីការប្រែប្រួលតាមរដូវកាលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ បើទោះបីជាមានផលនេសាទកើនខ្ពស់ខ្លាំងនៅខែឧសភានិងខែកក្កដា ក៏ដោយ កត្តានេះបណ្តាលមកពីការឡើងផលនេសាទដោយឧបករណ៍អូសហ្នឹង និងអូសអូសថ្នាក់មធ្យម។ ការឡើងផលនេសាទដោយទូកអូសអូសបានរួមចំណែកជិត ៦០% នៃផលនេសាទសរុប ដែលបានកត់ត្រា បន្ទាប់មកគឺអូសហ្នឹង (៨,៧%) និងមងត្រី(៦,២%)។ ការនេសាទដោយឧបករណ៍អូសអូសមាន CPUE ខ្ពស់បំផុតគឺលើសពី ២១០ គ.ក្រ/ថ្ងៃ បន្ទាប់មកទៀតគឺមងត្រីផ្ទោង (១៥១ គ.ក្រ/ថ្ងៃ) និងមងត្រីកាម៉ុង (១០១ គ.ក្រ/ថ្ងៃ)។

សកម្មភាពធ្វើនេសាទស្ថិតក្នុងកម្រិតជាប់លាប់ចន្លោះពី១៧-២១ ថ្ងៃនេសាទ/ខែ។ ករណីដោយឡែក មាននៅខេត្តកែប ដែលទូកនេសាទផ្សេងពីអូសអូសមានសកម្មភាពធ្វើនេសាទទាបជាងគេ និងទូកនេសាទខ្នាតមធ្យម >១៨ ម៉ែត្រ ក្នុងខេត្តកំពត មានសកម្មភាពធ្វើនេសាទខ្ពស់ជាងនៅខេត្តផ្សេងទៀត។

ផលនេសាទតាមប្រភេទខ្ពស់បំផុត គឺត្រីកាកីមខ្លួនខ្លី ដែលតំណាងឱ្យជិត ៣១% នៃផលនេសាទសរុប ខណៈដែលត្រីផ្សេងទៀត (មិនបានបញ្ជាក់ប្រភេទជាក់លាក់ រួមចំណែក១២% និងត្រីជី រួមចំណែក ៨% ក្នុងនោះ បង្កានិងក្តាម រួមចំណែកប្រហែល៤% ក្នុង១ប្រភេទៗ។

ទិន្នន័យ ដែលប្រមូលបានពីការចំណាយប្រតិបត្តិការនេសាទបង្ហាញថា ប្រតិបត្តិការនេសាទស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តកំពត និងកែប ទទួលបានផលចំណេញ ដោយឡែកនៅខេត្តកោះកុង និងខេត្តព្រះសីហនុ ទិន្នន័យប្រមូលបានបង្ហាញថាមិនទទួលបានប្រាក់ចំណេញ ករណីនេះអាចមកពីការយកទិន្នន័យមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ គឺជាធាតុផ្សំដ៏ធំបំផុតនៃតម្លៃប្រតិបត្តិការនេសាទ គ្រប់ប្រភេទទូកនេសាទឧបករណ៍ទាំងអស់។

ការវាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រដែលជាលទ្ធផលបានការកត់ត្រា និងការប៉ាន់ស្មានចំនួនទូកនេសាទចេញទៅនេសាទចំនួន៨០%នោះ ផលនេសាទសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ មានចំនួន២៣២.៧៥៥ តោន។

របាយការណ៍នេះមានបញ្ចូលអនុសាសន៍មួយចំនួនសម្រាប់ការកែលម្អដល់វិធីសាស្ត្រកត់ត្រាទិន្នន័យ និងការចូលរួមមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលផលផល និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងការពិនិត្យ និងសុពលភាពទិន្នន័យ ព្រមទាំងចំណុចខ្វះខាតសម្រាប់កែលម្អក្នុងការអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ២០២៣។

# តារាងមាតិកា

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| សេចក្តីផ្តើមអំណរគុណ .....                                               | i  |
| សេចក្តីសង្ខេប.....                                                      | ii |
| តាមរាងពាក្យបំព្រួញ .....                                                | iv |
| ១ សេចក្តីផ្តើម និងវិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ .....                       | ១  |
| ២. លទ្ធផលអង្កេត និងតារាងស្ថិតិ .....                                    | ១  |
| ២.១ របាយការណ៍ផលនេសាទ .....                                              | ២  |
| ២.២ របាយការណ៍ផលនេសាទតាមឧបករណ៍.....                                      | ៣  |
| ២.៣ កម្លាំងធ្វើនេសាទ .....                                              | ៩  |
| ២.៤ ផលនេសាទនិងតម្លៃតាមប្រភេទ.....                                       | ១១ |
| ២.៥ ការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុប .....                                     | ១៤ |
| ២.៦. ស្តុកត្រីជាន់គ្នា ការធ្វើចំណាកស្រុក និងឆ្លងដែនស្តុកត្រីខ្ពស់ ..... | ១៨ |
| ២.៧ ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គម .....                                       | ១៩ |
| ៣. សេចក្តីសន្និដ្ឋាននិងអនុសាសន៍ .....                                   | ២០ |

## តារាងពាក្យបំព្រួញ

|                 |                                                                                 |                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| AP              | Aquatic Plants                                                                  | វារីរុក្ខជាតិ                                                              |
| CAPFISH         | Cambodia Programme for Sustainable and Inclusive Growth in the Fisheries Sector | កម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យផលិតផលប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន៖ សមាសភាគការនេសាទ |
| CPUE            | Catch per Unit of Effort                                                        | ផលចាប់ក្នុងមួយឯកតាកម្លាំងនេសាទ                                             |
| EU              | European Union                                                                  | សភាពអឺរ៉ុប                                                                 |
| FAC             | Fishing Activity Coefficient                                                    | ការប៉ាន់ប្រមាណអំពីមេគុណ                                                    |
| FAO             | Food and Agriculture Organisation                                               | អង្គការស្បៀងនិងកសិកម្ម                                                     |
| FCMAS           | Fish Catch Monitoring Assessment Survey                                         | ការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ                         |
| FiA             | Fisheries Administration                                                        | រដ្ឋបាលផលិតផល                                                              |
| FiAC            | Fisheries Administration Cantonment                                             | ខណ្ឌរដ្ឋបាលផលិតផល                                                          |
| GFC             | Gross Cash Flow                                                                 | លំហូរសាច់ប្រាក់សរុប                                                        |
| GP%             | Gross Profit margin                                                             | អត្រាប្រាក់ចំណេញដុល                                                        |
| KoBo            |                                                                                 | កម្មវិធីប្រមូលទិន្នន័យ កូបូ                                                |
| MaFReDI         | Marine Fisheries Research and Development Institute                             | វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ                              |
| RPOA            | Regional Plan of Action                                                         | ផែនការកម្មភាពថ្នាក់តំបន់                                                   |
| SD              | Standard Deviation                                                              | គម្លាតស្តង់ដារ                                                             |
| SEAFDEC         | South East Asian Fisheries Development Centre                                   | មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលអាស៊ីអាគ្នេយ៍                                      |
| SES             | Socio-Economic Survey                                                           | ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម                                                  |
| UNCLOS          | United Nations Conference on Law of the Sea                                     | សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ                               |
| UNFSA           | United Nations Fish Stock Agreement                                             | កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីស្តុកត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ                        |
| VMS             | Vessel Monitoring System                                                        | ប្រព័ន្ធតាមដានទូកនេសាទ                                                     |
| $\varepsilon\%$ | Relative Standard Error                                                         | កម្រិតលំអៀងស្តង់ដារ                                                        |

# ១ សេចក្តីផ្តើម និងវិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសនៃកម្មវិធីជំរុញកំណើន វិស័យផលិតផលប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្ន នៃអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្ម នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (FAO CAPFISH) ក្រោមការគាំទ្រថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) បាន និងកំពុងអនុវត្តសាកល្បងការតាមដានវាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ នៅតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទក្នុងខេត្តទាំងបួនតំបន់ឆ្នេរ។ គោលបំណងនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនេះ គឺដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យប្រព័ន្ធមានឱ្យកាន់តែប្រសើរ អំពីផលនេសាទនិងសមត្ថភាពនៃការធ្វើនេសាទផលិតផលសមុទ្រនៅប្រទេសកម្ពុជា និងបង្កើតឱ្យមានវិធីសាស្ត្រតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រសម្រាប់ខណ្ឌរដ្ឋបាលផលិតផលអនុវត្តបន្ត ក្រោមការគាំទ្របច្ចេកទេសដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ ដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃការប្រមូលទិន្នន័យផលនេសាទសមុទ្រ។

ការប្រមូលទិន្នន័យត្រូវបានអនុវត្តនៅតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទគោលដៅទាំងអស់ ក្នុងខេត្ត ទាំងបួនតាមតំបន់ឆ្នេរ ពីខែឧសភា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។ ការវិភាគក្នុងរបាយការណ៍នេះផ្អែកចម្បងលើរបាយការណ៍ស្ថិតិប្រចាំខែ ដោយមានបន្ថែមការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុប ផលនេសាទរាយការណ៍តាមប្រភេទស្ថិតក្រោមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនានា (RPOA និង UNFSA) ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច- សង្គម និងការផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់ធ្វើការកែតម្រូវវិធីសាស្ត្រតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ។ បើមិនមានការបញ្ជាក់អំពីចំណុចផ្សេងគ្នា តារាងទាំងអស់ក្នុងរបាយការណ៍បញ្ចូលទិន្នន័យសង្ខេបតាមត្រីមាស។

ខ្លឹមសារពិស្តារអំពីវិធីសាស្ត្រតាមដានវាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ អាចរកបានតាមរយៈឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយដោយរដ្ឋបាលផលិតផល (FIA) ឆ្នាំ២០២១។ ឯកសារណែនាំការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចងក្រងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រនៃរដ្ឋបាលផលិតផល រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ៣៨ទំព័រ។

## ២. លទ្ធផលអង្កេត និងការវាយតម្លៃ

ការប្រមូលទិន្នន័យក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០២២ បានបន្តចាប់ពីខែឧសភា ហើយការអង្កេតបានគ្របដណ្តប់លើការឡើងផលនេសាទខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យម នៅគ្រប់កន្លែងឡើងផលនេសាទគោលដៅ។ ចំនួនឡើងផលនេសាទខ្នាតតូចមានកម្រិតទាបនៅតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទមួយចំនួន គឺអាស្រ័យលើការចាត់ថ្នាក់ទូកអូសអូសជាប្រភេទទូកនេសាទខ្នាតមធ្យម ដោយមិនគិតពីប្រវែងទូក។ សមាមាត្របង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍នេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងរវាងទូកនេសាទខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យម នៅតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទគោលដៅ។ ទិន្នន័យ ដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់របាយការណ៍នេះ ល្អបំផុតតាមរយៈការដាក់រួមបញ្ចូលគ្នានៃទិន្នន័យតាមថ្នាក់ទូកនេសាទសម្រាប់ផលិតផលសមុទ្រទាំងមូល។ ភាពត្រឹមត្រូវតាមបែបស្ថិតិសម្រាប់ការប៉ាន់ប្រមាណលើ CPUE ធ្វើការគណនាដោយដាក់រួមបញ្ចូលគ្នានៃថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍តាមខេត្តនីមួយៗ មានបង្ហាញលម្អិតបន្ថែមទៀតក្នុងតារាងទី២។


**តារាងទី១. ចំនួនកន្លែងឡើងផលនេសាទ ដែលបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ កត់ត្រាតាមលំដាប់ទូកនេសាទ និង កន្លែងឡើងផលនេសាទ**

| ខេត្ត          | កន្លែងឡើងផលនេសាទ | ឧសភា-មិថុនា |            | កក្កដា-កញ្ញា |            | តុលា-ធ្នូ  |            | ប្រចាំឆ្នាំ |             |              |
|----------------|------------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                |                  | ខ្នាតតូច    | ខ្នាតមធ្យម | ខ្នាតតូច     | ខ្នាតមធ្យម | ខ្នាតតូច   | ខ្នាតមធ្យម | ខ្នាតតូច    | ខ្នាតមធ្យម  | %ខ្នាតតូច    |
| កោះកុង         | លើយ៉ុងផាត់       | ៨           | ៤៨         | ៩            | ៧៥         | ២១         | ៦២         | ៣៨          | ១៨៥         | ១៧,០%        |
|                | ថ្មស             | ៣១          | ២៥         | ៤០           | ៤៤         | ៤៥         | ៣៩         | ១១៦         | ១០៨         | ៥១,៨%        |
| ព្រះសីហនុ      | ស្ទឹងហាវ         |             | ៥៦         |              | ៨៣         | ១          | ៨៣         | ១           | ២២២         | ០,៤%         |
|                | ទំនប់រលក         | ១           | ៥៥         | ៥            | ៧៩         | ១៦         | ៦៨         | ២២          | ២០២         | ៩,៨%         |
| កំពត           | កំពង់កណ្តាល      | ២           | ៥៤         | ២            | ៨២         | ៦          | ៧៨         | ១០          | ២១៤         | ៤,៥%         |
|                | ត្រពាំងរពៅ       | ៣៥          | ២១         | ៤៩           | ៣៥         | ៤០         | ៤៤         | ១២៤         | ១០០         | ៥៥,៤%        |
| កែប            | អំពែង            | ៤           | ៥២         | ១៣           | ៧០         | ១៣         | ៧២         | ៣០          | ១៩៤         | ១៣,៤%        |
|                | អូរក្រសា         | ១៧          | ៤០         | ២៥           | ៥៩         | ២៥         | ៥៩         | ៦៧          | ១៥៨         | ២៩,៨%        |
| <b>សរុបរួម</b> |                  | <b>៩៨</b>   | <b>៣៥១</b> | <b>១៤៣</b>   | <b>៥២៧</b> | <b>១៦៧</b> | <b>៥០៥</b> | <b>៤០៨</b>  | <b>១៣៨៣</b> | <b>២២,៨%</b> |

ទូកនេសាទខ្នាតមធ្យម រួមមានទូកប្រវែង ១២-២៤ ម៉ែត្រ ទូកអូសទាំងអស់ និងទូកនេសាទ ដែលប្រើឧបករណ៍ អូសអូសត្រែងឈាម ដោយមិនគិតពីប្រវែងទូក។

## ២.១ របាយការណ៍ផលនេសាទ

របាយការណ៍ផលនេសាទដោយធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងខែនិងខេត្ត ដូចបង្ហាញ ក្នុងរូបភាពទី១ បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាផលនេសាទខ្ពស់ជាងគេមាន ២ខែ គឺនៅខែឧសភា និងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ដែលខែទាំងពីរ ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុង។ លទ្ធផលនេះមិនមានទំនាក់ទំនងនឹងរដូវកាលនោះទេ ផលនេសាទខ្ពស់សម្រាប់ខែឧសភា គឺបណ្តាលមកពីការដាក់ការឡើងផលនេសាទចំនួន៤ ដោយប្រើឧបករណ៍មងហ៊ុំ ចូលគ្នា ដែលមានកត់ត្រាសម្រាប់តែខែឧសភា រីឯផលនេសាទខ្ពស់នៅខែកក្កដា គឺដោយ សារការឡើងផលនេសាទពីទូកអូសអូស មានមធ្យមខ្ពស់ជាងខែផ្សេងៗ។



រូបភាពទី១. ផលនេសាទសរុបកត់ត្រាតាមទម្ងន់ (គ.ក្រ) តាមខេត្តនិងខែ

មិនឃើញមានភាពផ្សេងគ្នាតាមរដូវកាលសម្រាប់ខេត្តផ្សេងទៀត ហើយភាពខុសគ្នារវាងខែក្នុងខេត្តដូចគ្នា ភាគច្រើនបណ្តាលមកពីការយកគំរូចែងនៃឧបករណ៍ជាក់លាក់ឬការអង្កេតលើទូកនេសាទមានទំំជានៅគ្រាខ្លះ។

## ២.២ របាយការណ៍ផលនេសាទតាមឧបករណ៍

ផលនេសាទជាមធ្យម ដែលបានរាយការណ៍ តាមការឡើងផលនេសាទ មានបង្ហាញជូននៅក្នុងតារាងទី២ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ដោយយកទិន្នន័យទាំង ៨ខែ ដាក់បញ្ចូលគ្នា។ ឧបករណ៍នេសាទណា ដែលត្រូវបានគេសង្កេត ឃើញមាននៅក្នុងការឡើងផលនេសាទតែ១ ត្រូវបានលុបចេញ។ លទ្ធផលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃផលនេសាទ ដោយឧបករណ៍នេសាទដូចគ្នារវាងថ្នាក់ទូកនេសាទ។

ភាពជាក់លាក់តាមបែបស្ថិតិ ដូចបង្ហាញជូនអាចទទួលយកបានសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងទូកនេសាទ- ឧបករណ៍ភាគច្រើន ដោយមានតែឧបករណ៍មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ៖ ឧ.មងត្រី សន្ទូចមីក និងមងហ៊ាំ ដែលបង្ហាញបម្រែប បម្រួលខ្ពស់ ភាគច្រើនដោយសារភាពខុសគ្នានៃចំនួនឧបករណ៍ ដែលបានប្រើធ្វើនេសាទ ឬដោយសារតែកំណត់ត្រា មិនគ្រប់គ្រាន់ ដូចជា មងបង្កងប៉ាក់ សន្ទូចបែល មងត្រីកន្ត្រាំង និងលបមីក ជាដើម។



**តារាងទី២. របាយការណ៍ផលនេសាទមធ្យមរាល់ការឡើងផលនេសាទដោយឧបករណ៍តែ១ ក្នុងឆ្នាំ២០២២**

| ឧបករណ៍នេសាទ          | កំណត់ត្រា<br>ការឡើងផល<br>នេសាទ | ខ្នាតតូច |       | ខ្នាតមធ្យម |       |
|----------------------|--------------------------------|----------|-------|------------|-------|
|                      |                                | មធ្យម    | ε%    | មធ្យម      | ε%    |
| អូនអូស               | ៧៦៤                            |          |       | ៤៩០,៩      | ១១,៧% |
| មងក្តាម              | ២៣៦                            | ៤៤,៩     | ១៩,៧% | ៤៩,៨       | ១១,៦% |
| មងត្រី               | ១៧៩                            | ៤៩,៨     | ១១,៩% | ៥៣១,៥      | ១២,៨% |
| លបក្តាម              | ១០២                            | ១៤,៦     | ៩,៨%  | ១២៣,៦      | ២៩,៨% |
| លបត្រីម្រឹមព្រះ      | ៩៩                             | ១៤,៣     | ១២,៨% | ២៤,៧       | ៧,៣%  |
| មងត្រីកាម៉ុង         | ៩៣                             | ៥០,៣     | ២៦,៣% | ៤៣៤,២      | ១៦,៣% |
| សន្ទូចសម្រាប់ចាប់មីក | ៤១                             | ២៦២,៩    | ១៣,២% | ២៥៩,០      | ១១,១% |
| ឈើប ខុន              | ៤១                             | ៤០,៧     | ១២,៣% | ៣៤,២       | ២០,៥% |
| មងបង្ការ             | ៤០                             | ៣៥២,៨    | ៥២,៣% | ៩១៧,០      | ៥៨,៣% |
| លបត្រី               | ១១                             | ៨០០,៥    | ៧៤,៩% | ១០៤២,៨     | ៨,៤%  |
| មងត្រីផ្ទោង          | ១១                             |          |       | ១៦៦៦,៧     | ៦,៣%  |
| សន្ទូចនោងចាប់បង្ការ  | ១០                             | ៣,២      | ៦២,១% | ២៤៩,០      | ៤១,៩% |
| ខ្វាវគ្រែងឈាម        | ៧                              |          |       | ៤,៩        | ១៩,៤% |
| មងត្រីកាកាវ          | ៦                              | ១១,៥     | ១៥,៦% |            |       |
| សន្ទូចនោងចាប់បង្ការ  | ៥                              | ៣៥,០     | ៧១,៤% | ២៥៦,៧      | ១៦,៩% |
| លបខ្យង               | ៥                              |          |       | ៧៧,២       | ២៨,៧% |
| មងបំប៉ិ              | ៤                              |          |       | ១៣៦៨៥,០    | ៤៥,៥% |
| មងត្រីក្បក           | ៤                              | ២២,៥     | ១៣,៩% |            |       |
| រនាស់អូសត្រីក្រឡាហូល | ៣                              | ៥៨៥,០    | ៣,០%  |            |       |
| សន្ទូចនោងចាប់ត្រី    | ៣                              | ១០,៥     | ១៤,៣% |            |       |
| មងបង្កងប៉ាក          | ៣                              |          |       | ៧,៩        | ៣៤,២% |
| សន្ទូចមីក            | ៣                              | ១២,២     | ៥២,៨% |            |       |
| មងត្រីកន្តាំង        | ៣                              | ៧១,៧     | ៤១,៩% |            |       |
| លបបង្ការ             | ៣                              | ៩៧,០     | ៣៦,០% |            |       |
| សន្ទូចត្រី           | ២                              | ១៧,៥     | ១៤,៣% |            |       |
| ឈើបុញ្ចោងដៃ          | ២                              | ១១,៥     | ១៣,០% |            |       |
| មងបង្កាបីជាន់        | ២                              | ៦,៧      | ២០,៣% |            |       |

កម្រិតលំអៀងស្តង់ដារសមស្របបង្ហាញដោយតម្លៃ ε% ប្រសិនបើ ε% ខ្ពស់ជាង ៣០% បញ្ជាក់ថាតម្លៃមិនមានភាពត្រឹមត្រូវតាមន័យស្ថិតិនិងមិនអាចប្រើបាន។ ផលនេសាទជាមធ្យមដោយផ្អែកលើការសង្កេតតែមួយ មិនអាចតំណាងអោយឧបករណ៍នោះ ហើយមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងតារាងគណនានោះទេ។

ផលនេសាទប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានគណនា ដោយយកឧបករណ៍ចាប់បានកំពូលគេទាំង ១៥ នៅក្នុងតារាងទី៣ ដោយផ្អែកលើទម្ងន់ ដែលបានរាយការណ៍ និងរយៈពេលធ្វើដំណើរនេសាទ។ ទោះបីជាចំនួនថ្ងៃធ្វើនេសាទ ដែលរួម ចំណែកដល់ផលនេសាទ មិនត្រូវបានកត់ត្រាជាប្រចាំ គ្រប់ការឡើងផលនេសាទក៏ដោយ ការគណនាតាមវិធីនេះផ្តល់នូវការប៉ាន់ប្រមាណកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ទិន្នផលនេសាទសមស្របនៃឧបករណ៍ផ្សេងៗគ្នា និងធ្វើការប៉ាន់ ប្រមាណពីផលនេសាទតាមការឡើងផលនេសាទ។

**តារាងទី៣** មធ្យមផលនេសាទប្រចាំថ្ងៃ (គីឡូក្រាម/ថ្ងៃ) ដែលមានសារៈសំខាន់តាមន័យស្ថិតិសម្រាប់ភាពខុសគ្នា រវាងការនេសាទខ្នាតតូច និងមធ្យម

| ឧបករណ៍នេសាទ      | ខ្នាតតូច |       |       | ខ្នាតមធ្យម |       |        | P       |
|------------------|----------|-------|-------|------------|-------|--------|---------|
|                  | មធ្យម    | ε%    | SD    | មធ្យម      | ε%    | SD     |         |
| អ្ននអ្នស         |          |       |       | ២១១,៣      | ៦,២%  | ១៥៩២,០ | -       |
| មងក្តាម          | ១៦,២     | ១២,១% | ៧៣,៩  | ២១,០       | ៧,៤%  | ៧៤,៧   | ០,០៤៩២  |
| មងត្រី           | ៣៥,៩     | ៦,៥%  | ៦៤,០  | ៨៩,៣       | ៩,០%  | ៥៣៤,៤  | <0,០០០១ |
| លបក្តាម          | ១៣,៨     | ១០,១% | ៧,៩   | ២៦,១       | ៦,៩%  | ៣១២,១  | <0,០០០១ |
| លបត្រីម្រឹមព្រះ  | ១៤,៣     | ១២,៨% | ១១,១  | ២១,៣       | ៧,៩%  | ១៤,១   | ០,០០៥៦  |
| មងត្រីកាម៉ុង     | ៤៨,៤     | ២៧,៦% | ៥៩,២  | ១០១,២      | ១២,១% | ៦០៥,០  | ០,០០៣៥  |
| សន្ទូចមីក        | ៤០,៣     | ១០,៤% | ៩២,១  | ៥០,៤       | ៦,៨%  | ១៦៨,២  | ០,០៨១៣  |
| ឈើប ខុន          | ៤០,៧     | ១២,៣% | ២៧,១  | ៣៤,២       | ២០,៥% | ២៤,៣   | ០,៤៥៩៥  |
| មងបង្ការ         | ១០០,២    | ៥៧,៤% | ៤៥១,៩ | ៩០,១       | ៣៨,៥% | ៣១១៦,៦ | ០,៨៨៣២  |
| លបត្រី           | ១៥៨,៨    | ២៦,៥% | ៨៤៧,៨ | ៨៦,៩       | ១១,១% | ២៦៣,៦  | ០,៣២៦៤  |
| មងត្រីផ្ទោង      |          |       |       | ១៥១,៦      | ១៧,២% | ៣៣២,៦  | -       |
| សន្ទូចចាប់បង្ការ | ៣,២      | ៦២,១% | ៣,៤   | ២៧,១       | ១៧,៥% | ២៧៦,២  | ០,០០១៩  |
| ខ្វាវត្រែងឈាម    |          |       | -     | ៤,៩        | ១៩,៤% | ២,៥    | -       |
| មងត្រីកាវ៉ាវ     | ១១,៥     | ១៥,៦% | ៤,៤   |            |       | -      | -       |
| សន្ទូចចាប់មីក    | ៦,០      | ៤៤,០% | ៣៥,៤  | ២៨,០       | ១៤,៩% | ៧៥,១   | ០,០២១២  |

ផលនេសាទប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើទម្ងន់ផលនេសាទសរុប ដែលបានរាយការណ៍ និងចំនួន ថ្ងៃធ្វើនេសាទ។ តម្លៃ  $p < 0,05$  បង្ហាញពីភាពខុសគ្នាខ្លាំងតាមន័យស្ថិតិរវាងផលនេសាទមធ្យម រវាងការនេសាទ ខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម។ ចំពោះតម្លៃ  $\epsilon \% > ៣០\%$  មានន័យថាតម្លៃមធ្យមគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមបែបស្ថិតិ ហើយមិនគួរ ប្រើប្រាស់ទេ។

ទូកអ្ននអ្នសមានផលនេសាទប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតគឺ ២១១ គីឡូក្រាម/ថ្ងៃ បន្ទាប់មក ឧបករណ៍នេសាទ ដែល មានបម្រែបម្រួលផលនេសាទខ្ពស់ គឺឧបករណ៍លបនិងមងត្រីផ្ទោង។ សម្រាប់ឧបករណ៍ផ្សេងទៀត មានភាពខុស ប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងផលនេសាទប្រចាំថ្ងៃ តាមទូកនេសាទខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម ដោយផលនេសាទពីឧបករណ៍

មងនិងលប មានការប្រែប្រួលទៅតាមទំហំទូកនេសាទ (និងកម្លាំងម៉ាស៊ីន) ទាក់ទងនឹងចំនួនឧបករណ៍ ដែលអាចប្រើ នេសាទនិងចម្ងាយ ដែលទូកនេសាទអាចធ្វើដំណើរទៅនេសាទលើដែនសមុទ្រ។

ផលនេសាទប្រចាំថ្ងៃតាមឧបករណ៍ តាមខេត្តនីមួយៗ មានបង្ហាញជូនក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ៣។

**តារាងទី៤** សមាមាត្រនៃការឡើងផលនេសាទ ដែលបានកត់ត្រាតាមឧបករណ៍ទាំងអស់ តាមខេត្ត ជាមួយនឹងការរួម ចំណែកទៅនឹងផលនេសាទ ដែលបានកត់ត្រា (គីឡូក្រាម)


| ឧបករណ៍<br>នេសាទ            | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | កំពត   | កែប    | សរុបរួម   | %សរុប  |
|----------------------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| អ្ននអ្នស                   | ៣៣,៩%  | ៦១,១%     | ២,៦%   | ២,៤%   | ៣៧៥ ០៧៤,៣ | ៥៩,៤៩% |
| មងហ៊ុំ                     | ១០០,០% | -         | -      | -      | ៥៤ ៧៤០,០  | ៨,៦៨%  |
| មងត្រី                     | ៩,៥%   | ៥១,៤%     | ៣៧,៦%  | ១,៦%   | ៣៨ ៧៨០,៥  | ៦,១៥%  |
| មងបង្ការ                   | ៩៧,៥%  | ២,៤%      | -      | -      | ៣៣ ២៩៤,១  | ៥,២៨%  |
| មងត្រីកាម៉ុង               | ១៨,៥%  | ៤៦,០%     | ៣៥,៤%  | ០,១%   | ៣២ ៧០៣,០  | ៥,១៩%  |
| ផ្សែងទៀត                   | ៩៥,១%  | -         | ៣,៥%   | ១,៤%   | ២៥ ១៣៣,៧  | ៣,៩៩%  |
| មងត្រីផ្ទោង                | ០,៣%   | -         | ៩៩,៧%  | -      | ១៦ ៧២៤,០  | ២,៦៥%  |
| មងក្តាម                    | ៤,០%   | ៧៤,៨%     | ០,៣%   | ២០,៩%  | ១១ ៤១៥,៣  | ១,៨១%  |
| លបត្រី                     | ៩៨,២%  | -         | ១,៨%   | -      | ១០ ៩៨៦,០  | ១,៧៤%  |
| សន្ទូចមីក                  | ៩១,៩%  | ៤,៩%      | -      | ៣,២%   | ១០ ៦៤៥,០  | ១,៦៩%  |
| លបក្តាម                    | ៧៧,២%  | ០,៤%      | ១៤,២%  | ៨,២%   | ៩ ៣៣៨,១   | ១,៤៨%  |
| លបត្រី<br>មើមព្រះ          | ១៥,៤%  | -         | ០,៥%   | ៨៤,២%  | ២០៦០,០    | ០,៣៣%  |
| រនាស់អ្នសត្រុំ<br>ក្រឡាហូល | ១០០,០% | -         | -      | -      | ១៧៥៥,០    | ០,២៨%  |
| សន្ទូចអ្នសមីក              | ៩៧,៦%  | -         | -      | ២,៤%   | ១៧៥២,៥    | ០,២៨%  |
| ឈើម ខុន                    | ១០០,០% | -         | -      | -      | ១៥៩០,៧    | ០,២៥%  |
| មងត្រីបេកា                 | ៤០,០%  | ៦០,០%     | -      | -      | ១៥០០,០    | ០,២៤%  |
| សន្ទូចរនងមីក               | ៩៨,៨%  | -         | -      | ១,២%   | ៨៤០,០     | ០,១៣%  |
| អ្ននកាតីម                  | ១០០,០% | -         | -      | -      | ៧០០,០     | ០,១១%  |
| លបខ្យង                     | ៦៣,៧%  | ៣៦,៣%     | -      | -      | ៣៨៦,០     | ០,០៦%  |
| លបមីក                      | ៨៩,៣%  | -         | ១០,៧%  | -      | ២៩១,០     | ០,០៥%  |
| មងត្រីកន្តាំង              | -      | -         | ១០០,០% | -      | ២១៥,០     | ០,០៣%  |
| ការរកអយស្ទ័រ               | -      | -         | ១០០,០% | -      | ៩២,០      | ០,០១%  |
| មងត្រីក្បក                 | ៨២,២%  | -         | ១៧,៨%  | -      | ៩០,០      | ០,០១%  |
| មងត្រីកាវ៉ាវ               | ២៩,១%  | -         | ៧០,៩%  | -      | ៦៨,៨      | ០,០១%  |
| សន្ទូចបបែល                 | -      | -         | -      | ១០០,០% | ៣៦,៥      | ០,០១%  |

| ឧបករណ៍<br>នេសាទ     | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | កំពត   | កែប    | សរុបរួម   | %សរុប  |
|---------------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| សន្ទូចត្រី          | ៥៧,១%  | -         | -      | ៤២,៩%  | ៣៥,០      | ០,០១%  |
| ខ្នាវត្រែងឈាម       | ១០០,០% | -         | -      | -      | ៣៤,៥      | ០,០១%  |
| សន្ទូចរនង           | ៧១,៤%  | -         | ២៨,៦%  | -      | ៣១,៥      | <០,០១% |
| ចាប់ដោយដៃ           | -      | -         | -      | ១០០,០% | ៣០,០      | <០,០១% |
| មងបង្កងប៉ាក         | ១០០,០% | -         | -      | -      | ២៣,៨      | <០,០១% |
| ឈើបុញដោយដៃ          | -      | -         | ១០០,០% | -      | ២៣,០      | <០,០១% |
| មងបង្កាបីជាន់       | -      | -         | ១០០,០% | -      | ១៣,៣      | <០,០១% |
| សន្ទូចរនងស្រទាប់បាត | -      | -         | -      | ១០០,០% | ១២,០      | <០,០១% |
| លប                  | -      | -         | ១០០,០% | -      | ១២,០      | <០,០១% |
| ស្មៅ                | ១០០,០% | -         | -      | -      | ៥,៥       | <០,០១% |
| សរុបរួម             | ៤៥,១%  | ៤៣,៦%     | ៨,៨%   | ២,៤%   | ៦៣០.៤៣២,១ |        |


ទិន្នន័យក្នុងតារាងទី៤មិនរាប់បញ្ចូលការឡើងផលនេសាទ ដោយប្រើពហុឧបករណ៍ ដែលបានរួមចំណែកដល់ផលនេសាទ ៦.០០៤ គីឡូក្រាម ឬតិចជាង ១% នៃផលនេសាទសរុប ដែលបានរាយការណ៍ ក្នុងចំណោមការឡើងផលនេសាទទាំង ៤៤ លើក ដែលភាគច្រើនជាការឡើងផលនេសាទនៅខេត្តព្រះសីហនុ។ ភាគច្រើននៃការឡើងផលនេសាទដោយប្រើពហុឧបករណ៍ ជាការនេសាទប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទផ្សំគ្នារវាងមងសម្រាប់ចាប់ត្រីក្តាម និងបង្កា។ ការឡើងផលនេសាទដោយពហុឧបករណ៍បានរួមចំណែក ៨៤% នៃការឡើងផលនេសាទ និង ៧៦% នៃផលនេសាទ ដែលបានរាយការណ៍សម្រាប់ការឡើងផលនេសាទដោយពហុឧបករណ៍នេះ។

ដូចបង្ហាញក្នុងតារាងទី៤ និងរូបភាពទី២ ប្រមាណជា ៦០% នៃផលនេសាទ ដែលបានរាយការណ៍ បានមកពីការនេសាទដោយទូកអូនអូស ភាគច្រើនជាទូកអូនអូស មកពីខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តកោះកុង មងហ៊ុំរួមចំណែក ៨,៧% និង មងត្រី មងបង្កា និងមងត្រីកាម៉ុង ដែលឧបករណ៍នីមួយៗ រួមមាន រួមចំណែក ៥-៦%។ ប្រហែល ៤% នៃផលនេសាទត្រូវបានគេសន្មតថាជាឧបករណ៍មិនកំណត់ជាក់លាក់ ដែលភាគច្រើននៅខេត្តកោះកុង។

តារាងទី៤ គូសបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការឡើងផលនេសាទដោយឧបករណ៍មួយចំនួន ដែលបានសង្កេតឃើញមានតែនៅក្នុងខេត្តមួយប៉ុណ្ណោះ។ របាយការណ៍នេះមិនសមស្របនឹងព័ត៌មាន ដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យជំរឿនទូកនេសាទ (ឆ្នាំ២០១៨) និងបង្ហាញពីភាពស្មុគស្មាញដល់ការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុបតាមខេត្ត ដោយការប៉ាន់ប្រមាណអំពីផលនេសាទមធ្យមនិងកម្លាំងធ្វើនេសាទតាមខេត្ត ផ្អែកលើមូលដ្ឋាន ឧបករណ៍-ទូកនេសាទ។ ដោយការការនេសាទដោយទូកអូនអូស ភាគច្រើនត្រូវបានគេកត់ត្រានៅខេត្តព្រះសីហនុ ការប៉ាន់ប្រមាណនេះមិនអាចតំណាងអោយផលនេសាទក្នុងខេត្តផ្សេងទៀត ដែលអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃការប៉ាន់ស្មាន។



**រូបភាពទី២.** ការរួមចំណែកនៃប្រភេទឧបករណ៍ចម្បងៗ ដល់ផលនេសាទសរុប ដែលបានរាយការណ៍ តាមការឡើងផលនេសាទ ដែលបានកត់ត្រា (ផលនេសាទសរុប ដែលបានរាយការណ៍: ៦៣៦.៤៣៦ គីឡូក្រាម)



**រូបភាពទី៣.** ទីតាំងធ្វើនេសាទរាយការណ៍តាមឧបករណ៍ទាំងអស់រួមបញ្ចូលគ្នា និងរាយការណ៍ដោយឡែកសម្រាប់ទូកអូសអូស

ទីតាំងទូទៅ ដែលទូកនេសាទធ្វើប្រតិបត្តិការ ជាពិសេសកំណត់ថាតើផលនេសាទ ដែលបានរាយការណ៍ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសមុទ្រក្នុង ឬសមុទ្រក្រៅ មានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពទី៣។ របាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីសមាមាត្រ នៃផលនេសាទដ៏សន្លឹកសន្លាប់ ត្រូវបានគេរាយការណ៍បានមកពីតំបន់សមុទ្រក្នុង (ក្នុងខ្សែបន្ទាត់ជម្រៅ ២០ ម៉ែត្រ) ក្នុងនោះក៏មានរួមទាំងការនេសាទដោយទូកអូសអូសផងដែរ។ តាមការរំពឹងទុក ផលនេសាទភាគច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានេសាទនៅសមុទ្រក្រៅ ហើយអ្នកនេសាទជាច្រើនមិនដឹងទីតាំងធ្វើនេសាទពិតប្រាកដ ឬស្គាល់ពីបន្ទាត់ព្រំដែន កំណត់សមុទ្រក្នុង និងសមុទ្រក្រៅ។

## ២.៣ កម្លាំងធ្វើនេសាទ

ការតាមដានវាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (FCMAS) ឆ្នាំ២០២២ ប្រមូលទិន្នន័យអំពីចំនួនថ្ងៃធ្វើនេសាទ ដើម្បីធ្វើការគណនាអំពីកម្លាំងធ្វើនេសាទ តាមថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រើ ដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណថ្ងៃធ្វើនេសាទប្រចាំខែតាមថ្នាក់ទូកនេសាទ តាមខេត្ត ក្នុងតារាងទី៥។ ការគណនានេះបង្ហាញថាមានភាពខុសប្លែកគ្នាតិចតួចរវាងថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍ និងខេត្ត ដោយមានកម្លាំងធ្វើនេសាទជាមធ្យមចន្លោះពី ១៦-២២ ថ្ងៃ/ខែ (ការប៉ាន់ប្រមាណទាំងអស់ត្រឹមត្រូវតាមន័យស្ថិតិ)។ ការធ្វើនេសាទផ្សេងពីឧបករណ៍ទូកអូនអូសនៅខេត្តកែប មានកម្លាំងធ្វើនេសាទទាប និងទូកនេសាទខ្នាតមធ្យម > ១៨ ម៉ែត្រ ក្នុងខេត្តកំពត ដែលបង្ហាញពីកម្លាំងធ្វើនេសាទខ្ពស់ជាងនៅខេត្តផ្សេងទៀត។

តារាងទី៥. ថ្ងៃធ្វើនេសាទប៉ាន់ប្រមាណជាមធ្យមប្រចាំខែ តាមថ្នាក់ឧបករណ៍ និងតាមខេត្ត

| ថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍ | កោះកុង |       | ព្រះសីហនុ |      | កំពត |      | កែប  |       | សរុបរួម |      |
|-----------------------|--------|-------|-----------|------|------|------|------|-------|---------|------|
|                       | ថ្ងៃ   | ε%    | ថ្ងៃ      | ε%   | ថ្ងៃ | ε%   | ថ្ងៃ | ε%    | ថ្ងៃ    | ε%   |
| ខ្នាតតូច              | ១៧,៩   | ៣,២%  | ១៩,២      | ៦,៤% | ២០,៧ | ២,៥% | ១៥,០ | ៥,១%  | ១៨,២    | ១,៩% |
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ម     | ១៦,៤   | ៣,៣%  | ២១,៧      | ២,១% | ១៩,៥ | ៣,២% | ១២,៣ | ៥,០%  | ១៦,៦    | ២,០% |
| ខ្នាតធំមធ្យម >១៨ម     | ២០,៥   | ៧,១%  | ២០,៩      | ៣,៧% | ២៥,៩ | ៣,៧% | ១៣,៧ | ១៥,២% | ២០,៣    | ៣,៧% |
| អូនអូស <១២ម           | ១៨,៤   | ៥,៤%  | ២១,៩      | ៣,៣% | ១៧,៩ | ២,០% | ២១,៥ | ១,៨%  | ១៩,៦    | ១,៣% |
| អូនអូស ១២-១៨ម         | ១៧,៧   | ៦,០%  | ២២,១      | ១,២% | ១៩,៦ | ៤,១% | ២២,៣ | ៥,០%  | ២១,២    | ១,៣% |
| អូនអូស >១៨ម           | ១៦,០   | ២៤,៧% | ២១,៥      | ៤,៤% |      |      |      |       | ២០,៦    | ៥,១% |

**ចំណាំ៖** ទូកនេសាទខ្នាតមធ្យម តំណាងឱ្យទូកនេសាទខ្នាតមធ្យមទាំងអស់ លើកលែងតែទូកនេសាទ កំពុងប្រើឧបករណ៍អូនអូស


សម្រាប់កម្លាំងធ្វើនេសាទតាមប្រភេទឧបករណ៍ (តារាងទី៦) កម្លាំងធ្វើនេសាទគឺស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់ តាមឧបករណ៍ និងតាមថ្នាក់ទូកនេសាទផ្សេងៗគ្នា ដោយមានភាពផ្សេងគ្នាតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។ នេះបង្ហាញថា កម្លាំងធ្វើនេសាទភាគច្រើនមានលក្ខណៈឯករាជ្យពីប្រភេទ ឧបករណ៍-ទូកនេសាទ ដោយអ្នកនេសាទភាគច្រើន កំណត់គោលដៅនេសាទពេញម៉ោង។

**តារាងទី៦. ថ្ងៃធ្វើនេសាទប៉ាន់ប្រមាណជាមធ្យមប្រចាំខែ តាមឧបករណ៍**

| ឧបករណ៍នេសាទ          | ខ្នាតតូច |       | ខ្នាតមធ្យម |       |
|----------------------|----------|-------|------------|-------|
|                      | ថ្ងៃ     | ε%    | ថ្ងៃ       | ε%    |
| អូនអូស               |          |       | ២០,៣       | ០,៩%  |
| មងក្តាម              | ១៦,៦     | ៥,២%  | ១៣,០       | ៥,០%  |
| មងត្រី               | ១៩,៨     | ៣,០%  | ២១,០       | ៣,៦%  |
| លបក្តាម              | ១៧,៦     | ៦,៨%  | ១៧,៧       | ៤,០%  |
| លបត្រីម្រើមព្រះ      | ១៨,១     | ៦,៩%  | ១៥,៨       | ៥,៧%  |
| មងត្រីកម្លាំង        | ២០,៧     | ៨,៥%  | ២២,៦       | ៣,១%  |
| សន្ទូចមីក            | ១៧,៣     | ១៨,១% | ១៤,០       | ៧,៨%  |
| ឈើមឌុន               | ១៩,១     | ៥,៣%  | ១៧,៣       | ៨,៧%  |
| មងបង្កា              | ១៧,៨     | ៧,០%  | ១៩,០       | ៥,៦%  |
| លបត្រី               | ១៦,០     | ២៥,០% | ១៦,០       | ១០,៣% |
| មងត្រីផ្ទោង          |          |       | ២៥,៣       | ៥,០%  |
| សន្ទូចអូសមីក         | ១១,៧     | ៤៦,០% | ១៦,៩       | ១២,១% |
| ឈ្មាងអូសក្រែងឈាម     |          |       | ១៦,១       | ១៩,៦% |
| មងត្រីកាវ៉ាវ         | ២២,០     | ៥,៩%  |            |       |
| សន្ទូចរនងមីក         | ២១,៥     | ៣០,២% | ១០,០       | ២៨,៩% |
| លបខ្យង               |          |       | ១៥,៤       | ១៩,៤% |
| មងហ៊ុំ               |          |       | ២៥,០       | ១០,៦% |
| រនាស់អូសគ្រំក្រឡាហូល | ១៦,០     | ១៣,០% |            |       |
| សន្ទូចរនង            | ១៦,០     | ៦,៣%  |            |       |
| មងបង្កងប៉ាក          |          |       | ១៧,៣       | ៣៩,០% |
| សន្ទូចបែល            | ៦,៧      | ២១,៨% |            |       |
| មងត្រីកន្តាំង        | ២៤,០     | ១២,៥% |            |       |
| លបមីក                | ១៩,០     | ៥,៣%  |            |       |
| សន្ទូចត្រី           | ១៣,០     | ៦៩,២% |            |       |
| ឈើបុញដោយដៃ           | ២១,៥     | ៣០,២% |            |       |
| មងត្រីក្បក           | ១៨,៥     | ៣៥,១% |            |       |
| មងបង្កាបីជាន់        | ២៦,៥     | ៥,៧%  |            |       |

## ២.៤ ផលនេសាទនិងតម្លៃតាមប្រភេទ

ត្រីចូលរួមចំណែកភាគច្រើននៃផលនេសាទតាមទម្ងន់ ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី៤ បន្ទាប់មកគឺក្រុមបង្ការពពួកមីក និងក្តាម។



រូបភាពទី៤. ការចូលរួមចំណែកនៃក្រុមវាសត្វសំខាន់ៗ ទៅនឹងរបាយការណ៍ផលនេសាទ (ផលនេសាទសរុប៖ ៦៣៦.៤៣៦ គីឡូក្រាម)

ត្រីកាកីម ដែលជាប្រភេទត្រីចម្រុះមិនបានបញ្ជាក់និងជាត្រីជី (ត្រីមានតម្លៃទាប ដែលប្រើជាចម្បងសម្រាប់ផលិតចំណីត្រី) រួមចំណែកប្រមាណ ៥០% នៃផលនេសាទ ដែលបានរាយការណ៍ (តារាងទី៧)។ ប្រភេទនិងក្រុមប្រភេទផ្សេងទៀតរួមចំណែកតិចជាងខ្លាំងណាស់ទៅនឹងផលនេសាទ។ ប្រភេទ នេសាទបានច្រើនជាងគេ ទាំង ២០ប្រភេទផ្អែកលើទម្ងន់ រួមចំណែកច្រើនជាង ៨៦% នៃផលនេសាទ ដែលបានរាយការណ៍។

ដោយសារតែសមាមាត្រដ៏ធំធេងនៃត្រីផ្សេងទៀតនិងត្រីជីទៅនឹងផលនេសាទ ដែលបានរាយការណ៍ មានផលនេសាទប្រមាណ ៣៧% មិនត្រូវបានគេរាយការណ៍តាមប្រភេទ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលត្រីផ្សេងៗ ដែលចាត់ទុកជាត្រីជី មានផលនេសាទ ច្រើនជាង ២៩% ត្រូវបានគេរាយការណ៍តាមក្រុមប្រភេទ។




**តារាងទី៧. របាយការណ៍ប្រភេទនិងក្រុមប្រភេទ នេសាទបានខ្ពស់បំផុតទាំង ២០ប្រភេទ តាមទម្ងន់ (គីឡូក្រាម)**

|                            | ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ                 | ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស   | ផលនេសាទ (គ.ក្រ)  | ផលនេសាទ % |         |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------|
|                            |                                    |                       |                  | %សរុប     | %បង្ការ |
| 1                          | <i>Encrasicholina heteroloba</i>   | Shorthead anchovy     | ១៩៤ ៨៨០,០        | ៣០,៦%     | ៣០,៦%   |
| 2                          |                                    | Other fish nei        | ៧៥ ៤៤៧,៥         | ១១,៩%     | ៤២,៥%   |
| 3                          |                                    | trash fish            | ៥០ ៦៤៣,៨         | ៨,០%      | ៥០,៤%   |
| 4                          | <i>Penaeus sp.</i>                 | Prawns nei            | ២៦ ០៤១,២         | ៤,១%      | ៥៤,៥%   |
| 5                          | <i>Portunus pelagicus</i>          | Swimming crab         | ២៣ ៧២២,៧         | ៣,៧%      | ៥៨,៣%   |
| 6                          |                                    | Needlefish nei        | ២២ ៧៤០,០         | ៣,៦%      | ៦១,៨%   |
| 7                          | <i>Metapenaeus spp.</i>            |                       | ២១ ២៦៩,០         | ៣,៣%      | ៦៥,២%   |
| 8                          |                                    | Mollusks nei          | ១៨ ៧១០,៣         | ២,៩%      | ៦៨,១%   |
| 9                          |                                    | Squids nei            | ១៦ ៥៨៨,៨         | ២,៦%      | ៧០,៧%   |
| 10                         | <i>Decapterus macrosoma</i>        | Shortfin scad         | ១៥ ៤១៨,០         | ២,៤%      | ៧៣,១%   |
| 11                         | <i>Atule mate</i>                  | Yellowtail scad       | ១៥ ០០១,០         | ២,៤%      | ៧៥,៥%   |
| 12                         |                                    | Octopus               | ១០ ៦៤៦,១         | ១,៧%      | ៧៧,២%   |
| 13                         | <i>Rastrelliger brachysoma</i>     | Short mackerel        | ១០ ០៧៦,០         | ១,៦%      | ៧៨,៧%   |
| 14                         | <i>Stolephorus indicus</i>         | Indian anchovy        | ១០ ០៤១,០         | ១,៦%      | ៨០,៣%   |
| 15                         |                                    | Pony fishes           | ៧ ៦០៧,៥          | ១,២%      | ៨១,៥%   |
| 16                         | <i>Scomberoides commersonianus</i> | Talang queenfish      | ៧ ២០១,០          | ១,១%      | ៨២,៧%   |
| 17                         |                                    | Other catch nei       | ៧ ១៨៦,៦          | ១,១%      | ៨៣,៨%   |
| 18                         |                                    | Shellfish nei         | ៦ ៧៩១,០          | ១,១%      | ៨៤,៨%   |
| 19                         | <i>Chirocentrus dorab</i>          | Dorab wolf-herring    | ៥ ៥២០,០          | ០,៩%      | ៨៥,៧%   |
| 20                         | <i>Anodontostoma chacunda</i>      | Chacunda gizzard shad | ៥ ៤៤០,០          | ០,៩%      | ៨៦,៦%   |
| ប្រភេទដ៏ទៃទៀត              |                                    |                       | ៨៥ ៤៦៤,៩         | ១៣,៤%     | ១០០,០%  |
| <b>ផលនេសាទរាយការណ៍សរុប</b> |                                    |                       | <b>៦៣៦.៤៣៦,៤</b> |           |         |

របាយការណ៍ប្រភេទសរុបតាមទម្ងន់ តាមខេត្ត មាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១។

ការរួមចំណែកនៃប្រភេទមិនមែនជាត្រី ដល់តម្លៃផលនេសាទសរុប (តារាងទី៨) ខ្ពស់ជាងការរួមចំណែករបស់ វាទៅនឹងបរិមាណផលនេសាទ ដោយសារតែតម្លៃនៃពពួកមិនមែនត្រី ខ្ពស់ជាងខ្លាំង ហើយ ៥១% នៃផលនេសាទ ជា ប្រភេទត្រី ជាការរួមគ្នានៃត្រីមានតម្លៃទាប ត្រីកាក្រឹមនិងត្រីដី ដែលមានតម្លៃជាមធ្យម ៥០០-១០០០ រៀល/គីឡូក្រាម ជាតម្លៃលក់នៅដើមគ្រា។ ត្រីតំណាងឱ្យតិចជាង ៣៨% នៃតម្លៃផលនេសាទសរុប ក្រៅពីនេះ ជាប្រភេទមិនមែនជា

ត្រី (រូបភាពទី៥)។ តម្លៃតាមប្រភេទ ឬក្រុមប្រភេទមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ពេញលេញ ឬ ក្រុមប្រភេទសម្រាប់ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម (លក់ដូរ) មួយចំនួនត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលជាប្រភេទដាច់ដោយឡែក។



**រូបភាពទី៥.** របាយការណ៍សមាមាត្រនៃតម្លៃសរុប តាមក្រុមប្រភេទវិសត្វសម្បងៗ (តម្លៃសរុប: ៣.៣៩៧.៩៤៨.៥០០រៀល)

**តារាងទី៨.** របាយការណ៍ប្រភេទតាមតម្លៃ (១០០០រៀល) ខ្ពស់បំផុតទាំង២០ និងតម្លៃមធ្យម/មួយគីឡូក្រាម

|    | ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ               | ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស             | តម្លៃ (១០០០រៀល) | %តម្លៃ | %កំណើន | ថ្លៃ (រៀល) |
|----|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|--------|------------|
| 1  | <i>Portunus pelagicus</i>        | Swimming crab                   | ៦៦៦ ៦៦៦,៨       | ១៩,៦%  | ១៩,៦%  | ២៥ ៥០០,០   |
| 2  |                                  | Squids nei                      | ៣៥៣ ២១៤,៧       | ១០,៤%  | ៣០,០%  | ១៩ ០០០,០   |
| 3  | <i>Penaeus sp.</i>               | Prawns nei                      | ៣១៩ ៨៣៩,៦       | ៩,៤%   | ៣៩,៤%  | ១៨ ៥០០,០   |
| 4  | <i>Metapenaeus spp.</i>          |                                 | ២៨៥ ០៥៧,០       | ៨,៤%   | ៤៧,៨%  | ១៨ ៥០០,០   |
| 5  | <i>Encrasicholina heteroloba</i> | Shorthead anchovy               | ២០៨ ៧៧៥,៦       | ៦,១%   | ៥៤,០%  | ១ ០០០,០    |
| 6  |                                  | Other fish nei                  | ២០៤ ៦២៦,២       | ៦,០%   | ៦០,០%  | ៤ ០០០,០    |
| 7  | <i>Atule mate</i>                | Yellowtail scad                 | ១២០ ០០៧,០       | ៣,៥%   | ៦៣,៥%  | ៧ ៥០០,០    |
| 8  |                                  | Octopus                         | ១១៩ ១៧០,០       | ៣,៥%   | ៦៧,០%  | ១២ ៥០០,០   |
| 9  |                                  | Needlefish nei                  | ១០៧ ៦០០,០       | ៣,២%   | ៧០,២%  | ៧ ០០០,០    |
| 10 | <i>Decapterus macrosoma</i>      | Shortfin scad                   | ៩៩ ៧៩៩,៥        | ២,៩%   | ៧៣,១%  | ៦ ៥០០,០    |
| 11 | Suborder Sepiina                 | Cuttlefish                      | ៦៤ ២២៦,៥        | ១,៩%   | ៧៥,០%  | ១៤ ០០០,០   |
| 12 |                                  | Cephalopods (squids/cuttlefish) | ៦២ ៦៧៣,១        | ១,៨%   | ៧៦,៩%  | ១៤ ០០០,០   |
| 13 | <i>Rastrelliger brachysoma</i>   | Short mackerel                  | ៦២ ០៦៩,៥        | ១,៨%   | ៧៨,៧%  | ៦ ០០០,០    |

|    | ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ                 | ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស            | តម្លៃ (១០០០រៀល)    | %តម្លៃ | %កំណើន | ថ្លៃ (រៀល) |
|----|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|--------|------------|
| 14 | <i>Scomberoides commersonianus</i> | Talang queenfish               | ៦០ ២២៩,៥           | ១,៨%   | ៨០,៥%  | ៩ ០០០,០    |
| 15 | <i>Penaeus monodon</i>             | Giant tiger prawn              | ៥៨ ០៣៥,៦           | ១,៧%   | ៨២,២%  | ២៤ ៥០០,០   |
| 16 | <i>Euthynnus affinis</i>           | Mackerel tuna                  | ៤៦ ២៥០,០           | ១,៤%   | ៨៣,៥%  | ៩ ០០០,០    |
| 17 | <i>Scomberomorus commerson</i>     | Narrow-barred Spanish mackerel | ៤៣ ៧០០,០           | ១,៣%   | ៨៤,៨%  | ១០ ០០០,០   |
| 18 |                                    | Other catch nei                | ៤១ ៦៩២,០           | ១,២%   | ៨៦,០%  |            |
| 19 |                                    | trash fish                     | ៣៤ ៦៧២,៥           | ១,០%   | ៨៧,១%  | ៥០០,០      |
| 20 |                                    | Mantis shrimp                  | ៣១ ០៦៤,៨           | ០,៩%   | ៨៨,០%  | ៥៧ ០០០,០   |
|    | ប្រភេទដទៃទៀត                       |                                | ៤០៨ ៥៧៨,៥          | ១២,០%  | ១០០,០% |            |
|    | <b>តម្លៃរាយការណ៍សរុបតាមប្រភេទ</b>  |                                | <b>៣ ៣៩៧ ៩៤៨,៥</b> |        |        |            |

ប្រភេទ ដែលមានតម្លៃខ្ពស់រួមមាន បង្កា បង្កង មីក និងក្តាម (ជាពិសេសក្តាមថ្ម)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រភេទ ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ភាគច្រើន នេសាទបានតិចបំផុត ប្រភេទ ដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុត ទាំង ៣ ប្រភេទ រួមមាន ៖ អន្ទង់សមុទ្រ (១៥០.០០០រៀល) បង្កង (៦០.០០០រៀល) និងបង្កងប៉ាក (៥៧.០០០រៀល) ដែលនេសាទបានតិច តូចណាស់ ដោយបង្កងប៉ាករួមចំណែកទៅនឹងផលនេសាទ ៨០៧ គ.ក្រ (០,១៣%) នៃផលនេសាទរាយការណ៍សរុប។ តម្លៃប្រភេទ ដែលបានរាយការណ៍សរុបតាមខេត្តនីមួយៗ មាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ២។

## ២.៥ ការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុប

ទោះបីជាទិន្នន័យ ដែលប្រមូលបានក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០២២ មានរួមបញ្ចូលទិន្នន័យអំពីកម្លាំងធ្វើនេសាទជាថ្ងៃធ្វើ នេសាទក៏ដោយ ការប្រមូលទិន្នន័យមិនរាប់បញ្ចូលការប៉ាន់ប្រមាណអំពីមេគុណសកម្មភាពនេសាទ (FAC) ដែលជា ធម្មតាត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុប។ លើសពីនេះទៀត ចំនួនថ្ងៃធ្វើនេសាទតាមការឡើង ផលនេសាទនីមួយៗមានភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នា ដែលធ្វើឱ្យពិបាកក្នុងការគណនាការប៉ាន់ប្រមាណ ដែលអាចទុកចិត្ត បានសម្រាប់ផលនេសាទប្រចាំថ្ងៃនិងកម្លាំងធ្វើនេសាទសរុប។ គេរំពឹងថានឹងមានការធ្វើអោយចំនុចនេះ ល្អប្រសើរ ឡើងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ ការអនុវត្តនៅឆ្នាំ២០២៣។

ដូច្នេះ វិធីសាស្ត្រគណនាអនុវត្តដូចគ្នានឹងការគណនានៅឆ្នាំ២០២១ ដោយសារទិន្នន័យ អាចអោយធ្វើការ ប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុបប្រចាំខែ ដោយផ្អែកលើទម្ងន់ ដែលបានរាយការណ៍ជាមធ្យម និងតាមចំនួនដំណើរ នេសាទ ដែលបានរាយការណ៍ (តារាងទី៩)។ ដើម្បីធ្វើអោយមានភាពតំណាងដល់ធាតុផ្សំសំខាន់ៗនៃអ្ននអ្នសដល់ ផលផល ការប៉ាន់ប្រមាណបានបែងចែកតាមចំណាត់ថ្នាក់ទំហំទូកនេសាទ ដែលប្រើឧបករណ៍អ្ននអ្នស ដោយសារវា ប៉ះពាល់ដល់ទាំងទម្ងន់ផលនេសាទ និងចំនួននៃដំណើរនេសាទ។

**តារាងទី៩. ការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទជាមធ្យមប្រចាំខែតាមថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍ (គ.ក្រ) រួមជាមួយនឹង សូចនាករបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវតាមបែបស្ថិតិ**

| ថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍ | ទម្ងន់ផលនេសាទមធ្យម (គ.ក្រ) | SD     | ចំនួនការឡើងផលនេសាទ | ε%    | ដំណើរនេសាទប្រចាំសប្តាហ៍ | ដំណើរនេសាទប្រចាំខែ | ទិន្នផលតាមទូកនេសាទ ប្រចាំខែ (គ.ក្រ) |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------------------|-------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ម     | ២១៣,០                      | ៦៨៧,៤  | ៥៤២                | ១៣,៩% | ៣,៣                     | ១៤,៤៩              | ៣០៨៦,៤                              |
| ខ្នាតមធ្យម ១៨-២៤ម     | ១៧៤៣,៣                     | ៤១៤៤,៩ | ៧៨                 | ២៦,៩% |                         | ៥,២១               | ៩០៨២,៣                              |
| ខ្នាតតូច < ៦ម         | ១៩,២                       | ៤,៦    | ៥                  | ១០,៧% | ៥                       | ២១,៦៥              | ៤១៥,៧                               |
| ខ្នាតតូច ៦-១២ម        | ៧៨,៤                       | ២២១,៤  | ៣៩៥                | ១៤,២% | ៣,៩                     | ១៦,៩               | ១៣២៤,៩                              |
| អូនអូស ៦-១២ម          | ១០៥,៥                      | ២៣០,៧  | ៤១១                | ១០,៨% | ៣,៩                     | ១៦,៩៥              | ១៧៨៧,៤                              |
| អូនអូស ១២-១៨ម         | ១០២០,៣                     | ២៥៤៧,០ | ៣១៧                | ១៤,០% | ៤,៩                     | ២១,១៨              | ២១.៦០៩,៤                            |
| អូនអូស ១៨-២៤ម         | ១៧៣២,៩                     | ៣២៩៤,៣ | ៣៦                 | ៣១,៧% |                         | ១១,៧១              | ២០.២៩២,៦                            |

ចំណាំថាការប៉ាន់ប្រមាណអំពីទិន្នផលនេសាទប្រចាំខែសម្រាប់ទូកនេសាទតូចជាង ៦ម៉ែត្រ គឺផ្អែកលើការសង្កេតចំនួនតែ ៥ ប៉ុណ្ណោះ នៅតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទ ។ ដោយសារ ការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ មិនបានអង្កេតទូកនេសាទខ្នាតធំ ការប៉ាន់ប្រមាណនេះ មិនបានបញ្ចូលការរួមចំណែកនៃទូកនេសាទខ្នាតធំឡើយ។ ផលនេសាទប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ ផ្អែកលើសកម្មភាពនេសាទ ដែលបានប៉ាន់ប្រមាណ (សមាមាត្រនៃទូកនេសាទសកម្មរៀងរាល់ខែ) ដែលគេធ្វើការកំណត់យកកម្រិតសកម្ម ៨៥%។ ការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុបប្រើប្រាស់ចំនួនទូកនេសាទដូច ដែលបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យទូកនេសាទឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីបូកសរុបផលនេសាទតាមទូកនេសាទជាមធ្យមប្រចាំខែ មានគណនាក្នុងតារាងទី១០។

**តារាងទី១០. ប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុបប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ (តោន) តាមថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍**

| ថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍   | លេខទូកនេសាទ | ទូកនេសាទសកម្ម (៨៥%) | ទិន្នផលប្រចាំខែ (តោន) | ទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំ (តោន) | %សរុប |
|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ម       | ១៨១៩        | ១៥៤៦                | ៤៧៧១,៦                | ៥៧ ២៥៩                   | ២៤,៦% |
| ខ្នាតមធ្យម ១៨-២៤ម       | ១១៥         | ៩៨                  | ៨៩០,១                 | ១០ ៦៨១                   | ៤,៦%  |
| ខ្នាតតូច < ៦ម           | ៩២៤         | ៧៨៥                 | ៣២៦,៣                 | ៣ ៩១៦                    | ១,៧%  |
| ខ្នាតតូច ៦-១២ម          | ៣១១៥        | ២៦៤៨                | ៣៥០៨,៤                | ៤២ ១០១                   | ១៨,១% |
| អូនអូស ៦-១២ម            | ១១២០        | ៩៥២                 | ១៧០១,៦                | ២០ ៤២០                   | ៨,៨%  |
| អូនអូស ១២-១៨ម           | ៣៩៩         | ៣៣៩                 | ៧៣២៥,៦                | ៨៧ ៩០៧                   | ៣៧,៨% |
| អូនអូស ១៨-២៤ម           | ៥០          | ៤៣                  | ៨៧២,៦                 | ១០ ៤៧១                   | ៤,៥%  |
| <b>សរុបរួមឆ្នាំ២០២២</b> |             |                     |                       | <b>២៣២.៧៥៥</b>           |       |

ថ្នាក់ទូកនេសាទ ត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់គណនាការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុប ដើម្បីបង្កើនភាពជាក់លាក់នៃស្ថិតិ ដោយមានបង្ហាញតាមរយៈកំហុសស្តង់ដារសមស្រប ( ៩% )។ វិធីគណនានេះត្រូវបានធ្វើក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុប មិនមែនដើម្បីចាត់ថ្នាក់ផលផលសមុទ្រឡើងវិញទេ។ ការប៉ាន់ប្រមាណទាំងអស់មាន ៩% តូចជាង ៣០% លើកលែងតែទូកនេសាទខ្នាតមធ្យមប្រវែង ១៨-២៤ ម៉ែត្រ ដែលមាន ៩% តូចជាង ៣១,៧%។ តម្លៃនេះមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែគេអាចអាចទទួលយកបាន ដោយយោងទៅនឹងទិដ្ឋភាពនៃបម្រែបម្រួលខ្ពស់នៃទម្ងន់ផលនេសាទ ដែលបានរាយការណ៍។

ដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាងទី១០ ទូកអូនអូសបានរួមចំណែក ៥១,១% នៃផលនេសាទសរុប ដែលជាការរួមចំណែកខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រភេទឧបករណ៍នេសាទតែមួយ ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការនេសាទនេះ។ ការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុបនៅឆ្នាំ២០២២ គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ (២២០ ៦៨៥តោន) ប្រសិនបើប្រើសមាមាត្រដូចគ្នានៃចំនួនទូកនេសាទសកម្ម (៨៥%)។ ទោះជាយ៉ាងក្តី ដោយសារការគ្របដណ្តប់នៃការអង្កេតអនុវត្តបានកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងពេលវេលា និងទំហំ ការប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ចាត់ទុកថាអាចទុកចិត្តបានច្រើនជាង។

ការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុបដោយឡែកពីគ្នា តាមខេត្ត ដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវទិន្នន័យឆ្នាំ២០២២ ទាំងអស់មានបង្ហាញជូននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ៤។ ដោយសារតែទូកនេសាទឡើងផលនេសាទនៅក្រៅខេត្ត ដែលពួកគេបានកត់ត្រានៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ទូកនេសាទ នាំអោយមានបញ្ហាមួយចំនួនជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រគណនានេះ។ មានករណីខ្លះ ដែលមិនមានការកត់ត្រាថ្នាក់ទូកនេសាទនិងខេត្ត ប៉ុន្តែមានរបាយការណ៍ការឡើងផលនេសាទ ឬផ្ទុយពីនេះ មិនមានទិន្នន័យឡើងផលនេសាទ ប៉ុន្តែមានការកត់ត្រាអំពីទូកនេសាទ (ហើយសន្មតថាទូកនេសាទសកម្ម) នៅក្នុងជំរឿនទូកនេសាទឆ្នាំ២០១៨។ កត្តានេះនាំឱ្យមានប៉ះពាល់ដល់ការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុប។ ជាលទ្ធផល ដោយសារការប្រែប្រួលខ្ពស់នៃចំនួនផលនេសាទដែលបានរាយការណ៍ ប្រសិនបើធ្វើការគណនាតាមខេត្ត និងយោងចំនួនសរុបតាមខេត្ត តម្លៃមួយចំនួនមិនត្រឹមត្រូវតាមបែបស្ថិតិ បើគណនាដោយដាក់ផលនេសាទបញ្ចូលគ្នា ប្រសិនបើគណនាតាមខេត្ត បរិមាណផលនេសាទ គឺជិត ២៦០.០០០តោន ដែលខ្ពស់ជាងការប៉ាន់ប្រមាណថ្នាក់ជាតិ។

ការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុបដោយផ្អែកលើទិន្នន័យទទួលបានពី ការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ នៅឆ្នាំ២០២២ គឺមាន ៨៥,៩% ខ្ពស់ជាងការប៉ាន់ប្រមាណដោយ រដ្ឋបាលផលផលបច្ចុប្បន្ន ដែលមានចំនួន ១២៥.២០០តោន។ ទោះបីជាការប៉ាន់ប្រមាណផ្អែកលើលទ្ធផលពីការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ មានសុពលភាពតាមបែបស្ថិតិក៏ដោយ មានកត្តាមួយចំនួននាំអោយមានភាពខុសគ្នាជាមួយនឹងទិន្នផលសមុទ្រផ្លូវការរបស់រដ្ឋបាលផលផល៖

- **ការគ្របដណ្តប់តាមរយៈពេល៖** របាយការណ៍ឆ្នាំ២០២២ គឺផ្អែកលើទិន្នន័យអង្កេត ៨ខែ ដោយហេតុថាទិន្នន័យផលនេសាទប្រចាំខែមិនមានបម្រែបម្រួលតាមរដូវកាល ការប៉ាន់ប្រមាណ ដែលបង្ហាញនៅទីនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាមានភាពតំណាងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២។ ដោយឡែក បើសិនការអង្កេតអាចប្រមូលទិន្នន័យ បាន១២ខែ ក្នុង១ឆ្នាំ ការប៉ាន់ប្រមាណនៃផលនេសាទសរុបអាចខុសគ្នា។ ការប្រមូលផលពេញមួយឆ្នាំគឺចាំបាច់ដើម្បីវាយតម្លៃផលផល។

- **លេខសំគាល់ទូកនេសាទ៖** ការបូកសរុបនៃផលនេសាទរាយការណ៍ប្រចាំខែតាមថ្នាក់ទូកនេសាទត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើចំនួនទូកនេសាទសរុបពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យជំរឿនទូកនេសាទ (២០១៨) តាមថ្នាក់ទូកនេសាទនីមួយៗ។ មូលដ្ឋានទិន្នន័យជំរឿនទូកនេសាទកន្លែងផុតទៅជិត ៤ឆ្នាំ កក្កានេះអាចធ្វើអោយចំនួនទូកអូនអូស (និងទូកនេសាទផ្សេងទៀត) ប្រហែលជាមិនត្រឹមត្រូវទៀតទេ។ ការចុះបញ្ជី ការផ្តល់អត្តសញ្ញាណ និងការធ្វើអធិការកិច្ចទូកនេសាទ អាចជួយរួមចំណែកដល់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមូលដ្ឋានទិន្នន័យជំរឿនទូកនេសាទ។
- **ការផ្ទេរផលនេសាទ៖** ទូកនេសាទមួយចំនួនអាចយកផលនេសាទពីទូកនេសាទជាច្រើនដាក់រួមបញ្ចូលគ្នា (ការផ្ទេរផលនេសាទ) ទោះបីទូកនេសាទទាំងអស់ ដែលធ្វើការអង្កេត បញ្ជាក់ថាផលនេសាទរបស់ពួកគេ ជាផលនេសាទបានពីទូកនេសាទតែមួយក៏ដោយ នេះចាំបាច់ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យនៅសមុទ្រ និងប្រព័ន្ធតាមដានទូកនេសាទ (VMS) ពេលអនាគត។
- **ភាពសកម្មនៃទូកនេសាទ៖** សមាមាត្រនៃទូកនេសាទ ដែលនឹងនេសាទសកម្មជារៀងរាល់ខែគឺមានភាពខុសប្លែកគ្នាតាមថ្នាក់ទូកនេសាទផ្សេងៗគ្នា (និងឧបករណ៍) ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមិនមានការប្រមូលទិន្នន័យទាំងនេះឡើយ ហើយការប៉ាន់ប្រមាណផ្អែកលើការកំណត់យកភាពសកម្មនៃទូកនេសាទជាមធ្យម ៨៥% ដោយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល។ នៅពេលមានទិន្នន័យ នឹងអាចធ្វើអោយគេធ្វើការគណនាភាពសកម្មនៃទូកនេសាទ សម្រាប់ប្រភេទទូកនេសាទ-ឧបករណ៍សំខាន់ៗ។
- **ការគ្របដណ្តប់ ៖** ទិន្នន័យ ដែលមានមិនទាន់តំណាងអោយជលផលទាំងមូលនៅឡើយ។
  - ការប៉ាន់ប្រមាណមិនគ្រប់ដណ្តប់ជលផលខ្នាតធំឡើយ ទោះបីជាមានការអង្កេតទូកនេសាទខ្នាតធំចំនួន ៥ ក៏ដោយ ការរួមបញ្ចូលទិន្នន័យទាំងនេះក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណអាចនឹងធ្វើអោយមានកំណើនខ្ពស់ខ្លាំងដល់ជលផលនេសាទសរុប។
  - ទូកកន្ទុយវែងខ្នាតតូចមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យនៅឡើយ ហើយការប្រមូលទិន្នន័យអំពីទូកនេសាទប្រភេទនេះ ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តដាច់ដោយឡែក ដើម្បីកែលម្អការប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់ទូកនេសាទខ្នាតតូច ដែលមានប្រវែង < ៦ម៉ែត្រ។
- **ការប្រមូលទិន្នន័យ ៖** កន្លងមក ការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រពីផ្នែកលើការសម្ភាសជាមួយអ្នកនេសាទ និងម្ចាស់ទូកនេសាទ តាមរយៈនេះគេអាចដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យបែបរំលឹកឡើងវិញសម្រាប់ទូកនេសាទខ្នាតតូច និងកំណត់ត្រាផលនេសាទផ្អែកលើពាណិជ្ជករ/ម្ចាស់ទូកនេសាទ សម្រាប់ទូកនេសាទខ្នាតមធ្យមមួយចំនួន (មិនមែនទាំងអស់)។ ភាពជឿជាក់នៃទិន្នន័យ ដែលទទួលបាន តាមប្រភពនេះ គឺមិនអាចកំណត់បាន។
  - ប្រភពនៃទិន្នន័យ (រំលឹកឡើងវិញ ឬកំណត់ត្រាដោយពាណិជ្ជករ/ម្ចាស់ទូកនេសាទ) កន្លងមកទាន់បានប្រមូលនៅឡើយ ជាអនុសាសន៍ ទិន្នន័យទាំងនេះត្រូវបានណែនាំដល់ការប្រមូលទិន្នន័យឆ្នាំ២០២៣។
  - កន្លងមកមិនមានការស្ទង់មតិសម្រាប់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃអង្កេតកន្លងទៅ ការស្ទង់មតិផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបានគេគ្រោងអនុវត្ត ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ អាចជាការស្ទង់មតិដាច់ដោយឡើយ ឬជាគម្រោងស្រាវជ្រាវ។

ការកែលម្អ ដែលបានចង្អុលបង្ហាញខាងលើនឹងត្រូវបានពិភាក្សា ហើយនៅពេលអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំងនេះនឹងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណអំពីផលនេសាទសរុបកាន់តែត្រឹមត្រូវ។

## ២.៦. ស្តុកត្រីជាន់គ្នា ការធ្វើចំណាកស្រុក និងឆ្លងដែនស្តុកត្រីខ្ពស់

ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តុកត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNFSA) នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ហើយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ កំពុងដំណើរការការតម្កល់ឯកសារនេះទៅអង្គការសហប្រជាជាតិ។ អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ (UNCLOS) កំណត់ការស្តុកទុកជាន់គ្នាថាជា “ស្តុកដូចគ្នា ឬស្តុកនៃប្រភេទ ដែលពាក់ព័ន្ធគ្នា កើតមានឡើងទាំងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ និងក្នុងតំបន់ខាងក្រៅនិងនៅជាប់នឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនោះ” ខណៈ ដែលស្តុកមានការធ្វើចំណាកស្រុកខ្ពស់ បង្ហាញជូនក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១ នៃ UNCLOS ដែលតម្រូវអោយប្រទេសហត្ថលេខីចាត់វិធានការដើម្បីធានាបាននូវការអភិរក្សនិងការគ្រប់គ្រង។ លើសពីនេះ កម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពថ្នាក់តំបន់ចំនួនពីរ (RPOA) សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងស្តុកត្រីឆ្លងដែន៖ ១) RPOA- សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងត្រីឆ្មារ និង ២) RPOA លើត្រីឆ្មារ។ កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្នុងនាមប្រទេសជាសមាជិក រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជា (SEAFDEC ២០១៥) និងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការរាយការណ៍អំពីបរិមាណនៃផលនេសាទ ទាក់ទងនឹងស្តុកត្រីជាន់គ្នា និងស្តុកធ្វើចំណាកស្រុកខ្ពស់។

**តារាងទី១១. របាយការណ៍ផលនេសាទ និងការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុប (គីឡូក្រាម) សម្រាប់ប្រភេទដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុង UNFSA និង RPOA**

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ             | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស              | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ                    | កំពត        | កោះកុង       | ព្រះសីហនុ   | សរុប         | %សរុប        | សរុប (តោន)  |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| <i>Rastrelliger brachysoma</i> | Short mackerel                 | ត្រីផ្កាចុំ ឬ ត្រីកាម៉ុងខ្លួនខ្លី | ៣៩០៩        | ៣៦៧៥         | ២៤៩២        | ១០០៧៦        | ១,៥៨%        | ៣៦៧៨        |
| <i>Euthynnus affinis</i>       | Mackerel tuna                  | ត្រីឈាម                           |             | ៣៥០០         |             | ៣៥០០         | ០,៥៥%        | ១២៨០        |
| <i>Scomberomorus commerson</i> | Narrow-barred Spanish mackerel | ត្រីបេកាខ្មៅ ឬ ត្រីបេកាឆ្មាត      |             | ៣៣២០         | ១០          | ៣៣៣០         | ០,៥២%        | ១២១០        |
| <i>Thunnus tonggol</i>         | Longtail Tuna                  | ត្រីប្រម៉ា                        |             | ១៥៣៥         |             | ១៥៣៥         | ០,២៤%        | ៥៥៩         |
| <i>Sarda orientalis</i>        | Striped bonito                 | ត្រីឈាមស                          | ៥០          |              | ៩០០         | ៩៥០          | ០,១៥%        | ៣៤៩         |
| <i>Auxis thazard</i>           | Bullet tuna                    | ត្រីកាឡាំង                        |             |              | ១៣០         | ១៣០          | ០,០២%        | ៤៧          |
| <b>ផលនេសាទរាយការណ៍សរុប</b>     |                                |                                   | <b>៣៩៥៩</b> | <b>១២០៣០</b> | <b>៣៥៣២</b> | <b>១៩៥២១</b> | <b>៣,០៧%</b> | <b>៧១២៣</b> |

យោងតាមទិន្នន័យនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ ផលនេសាទប្រមាណជា ៣% ជាប្រភេទដែលបានរៀបរាប់នៅក្រោម UNFSA និង RPOA តារាងទី១១។ សមាមាត្រនៃប្រភេទទាំងនេះ ដែលមាននៅក្នុងការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ អាចត្រូវបានធ្វើការគណនា ដោយប្រើការប៉ាន់ប្រមាណសរុបនៃផលនេសាទសមុទ្រ (ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យទទួលបានពី ការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ ឬទិន្នន័យប៉ាន់ប្រមាណផ្លូវការដោយ FIA)។ ការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុប ដែលរួមបញ្ចូលក្នុងតារាងទី១១ គឺផ្អែកលើការប៉ាន់ប្រមាណដោយផ្អែកលើទិន្នន័យទទួលបានពីការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ ។

## ២.៧ ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្របានប្រមូលទិន្នន័យតម្លៃនៃប្រតិបត្តិការនេសាទ ដែលជាផ្នែកមួយនៃការអង្កេត។ សេចក្តីសង្ខេបលទ្ធផលមានបង្ហាញជូននៅក្នុងតារាងទី១២។ ការវិភាគស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតត្រូវបានលើកគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីបង្កើតអនុសាសន៍សម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យនេសាទស្តីពីសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម។

**តារាងទី១២. សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ដែលបានជ្រើសរើស ដោយមានការរួមចំណែកដល់តម្លៃនេសាទ តាមខេត្ត និងប្រភេទទូកនេសាទ**

| កោះកុង           | ចំនួននាវិក | តម្លៃផលនេសាទមធ្យម (រៀល) | លំហូរសាច់ប្រាក់ដុល (រៀល) | ចំណេញដុល% | ការរួមចំណែកផ្ទៃចំណាយ (%) |              |             |       |        |
|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-------------|-------|--------|
| ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍  |            |                         |                          |           | ប្រាក់ខែ                 | ប្រេងម៉ាស៊ីន | ប្រេងឥន្ធនៈ | ទឹកកក | ផ្សេងៗ |
| ខ្នាតតូច         | ១,៩        | ៦០៧ ៥០០                 | -២៧ ៩៩៣                  | -៤,៦%     | ៤១,៥%                    | ០,៨%         | ៣៩,១%       | ៧,៩%  | ១០,៨%  |
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ | ២,៩        | ៣ ៤៧៨ ៥០០               | ៨៩២ ១៦៩                  | ២៥,៦%     | ៣០,០%                    | ០,៦%         | ៥៤,៣%       | ៦,៩%  | ៨,១%   |
| ខ្នាតមធ្យម >១៨   | ១២,៦       | ៣៥ ៨២៦ ០០០              | ១៤ ៨៩៦ ០០០               | ៤១,៦%     | ៣៧,៧%                    | ០,៤%         | ៥២,២%       | ៥,១%  | ៤,៥%   |
| អ្ននអ្នស <១២     | ២,៦        | ៣ ៣៤២ ០០០               | -៧១៣ ៧៣១                 | -២១,៤%    | ១៩,២%                    | ០,៦%         | ៦៧,៦%       | ៦,១%  | ៦,៥%   |
| អ្ននអ្នស >១៨     | ៤,៧        | ៨ ៤៨៦ ៥០០               | -៦ ៨៧៣ ៧៥០               | -៨១,០%    | ១២,០%                    | ០,៧%         | ៧៦,៤%       | ៥,៣%  | ៥,៦%   |
| អ្ននអ្នស ១២-១៨   | ៣,៨        | ៧ ១១៤ ០០០               | -៤ ០៥៦ ៦៤៦               | -៥៧,០%    | ១៦,២%                    | ០,៦%         | ៧៣,៣%       | ៥,៦%  | ៤,៣%   |
| ព្រះសីហនុ        | ចំនួននាវិក | តម្លៃផលនេសាទមធ្យម (រៀល) | លំហូរសាច់ប្រាក់ដុល (រៀល) | ចំណេញដុល% | ការរួមចំណែកផ្ទៃចំណាយ (%) |              |             |       |        |
| ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍  |            |                         |                          |           | ប្រាក់ខែ                 | ប្រេងម៉ាស៊ីន | ប្រេងឥន្ធនៈ | ទឹកកក | ផ្សេងៗ |
| ខ្នាតតូច         | ៥,០        | ៤ ៥៥៨ ០០០               | ១ ៩៥០ ១១៤                | ៤២,៨%     | ៦៧,៤%                    | ០,៤%         | ១៩,៤%       | ៣,៤%  | ៩,៤%   |
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ | ៤,២        | ៣ ០៣៦ ០០០               | ១ ៥០១ ១៣៥                | ៤៩,៤%     | ៦៥,១%                    | ១,៥%         | ២១,៣%       | ២,៧%  | ៩,៤%   |
| ខ្នាតមធ្យម >១៨   | ៤,៧        | ៥ ៨៨៣ ៥០០               | ២ ៥៤៩ ២៣៤                | ៤៣,៣%     | ៦៦,២%                    | ០,៦%         | ២៣,៦%       | ២,៨%  | ៦,៨%   |
| អ្ននអ្នស <១២     | ២,៦        | ៧០២ ០០០                 | -៩៧ ៨០៥                  | -១៣,៩%    | ៣៥,៣%                    | ៣,៤%         | ៥៣,៧%       | ១,៩%  | ៥,៨%   |
| អ្ននអ្នស >១៨     | ៣,៩        | ១ ៦២៦ ០០០               | -៨១៧ ៤៩៥                 | -៥០,៣%    | ១២,៣%                    | ៣,១%         | ៧៩,១%       | ២,៤%  | ៣,២%   |
| អ្ននអ្នស ១២-១៨   | ៣,៩        | ១ ៦៧៣ ០០០               | -៤៥ ២៣៩                  | -២,៧%     | ១៦,៦%                    | ៣,២%         | ៧៥,៣%       | ១,៥%  | ៣,៤%   |

| កំពត             | ចំនួននាវិក | តម្លៃផលនេសាទមធ្យម (រៀល) | លំហូរសាច់ប្រាក់ដុល (រៀល) | ចំណេញដុល% | ការរួមចំណែកផ្ទៃចំណាយ (%) |              |             |       |        |
|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-------------|-------|--------|
| ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍  |            |                         |                          |           | ប្រាក់ខែ                 | ប្រេងម៉ាស៊ីន | ប្រេងឥន្ធនៈ | ទឹកកក | ផ្សេងៗ |
| ខ្នាតតូច         | ១,៩        | ២២៣,០០០                 | ១០៧ ៥៥១                  | ៤៨,២%     | ៦៧,៦%                    | ០,៥%         | ២០,៩%       | ១,៨%  | ៩,១%   |
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ | ២,៨        | ១,៥០៨,៥០០               | ៣១៨ ៦៦៥                  | ២១,១%     | ៦៣,១%                    | ០,៧%         | ៣៣,៤%       | ០,៣%  | ២,៤%   |
| ខ្នាតមធ្យម >១៨   | ៥,៣        | ៥,៦៣៦,០០០               | -២៨២ ៩២៩                 | -៥,០%     | ៥៦,៥%                    | ០,៤%         | ២៥,៩%       | ៧,០%  | ១០,២%  |
| អ្ននអ្នស <១២     | ២,០        | ៤០៩,០០០                 | ៤៥ ០០២                   | ១១,០%     | ២១,៤%                    | ២,០%         | ៦៨,១%       | ៣,០%  | ៥,៦%   |
| អ្ននអ្នស >១៨     | -          | -                       | -                        | -         | -                        | -            | -           | -     | -      |
| អ្ននអ្នស ១២-១៨   | ២,០        | ៦៩៩,០០០                 | ១៨៤ ០៨១                  | ២៦,៣%     | ២៤,១%                    | ២,០%         | ៦៥,៦%       | ២,៩%  | ៥,៤%   |
|                  |            |                         |                          |           |                          |              |             |       |        |
| កែប              |            |                         |                          |           | ការរួមចំណែកផ្ទៃចំណាយ (%) |              |             |       |        |



| ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍  | ចំនួននាវិក | តម្លៃផលនេសាទមធ្យម (រៀល) | លំហូរសាច់ប្រាក់ដុល (រៀល) | ចំណេញដុល% | ប្រាក់ខែ | ប្រេងម៉ាស៊ីន | ប្រេងឥន្ធនៈ | ទឹកកក | ផ្សេងៗ |
|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------|----------|--------------|-------------|-------|--------|
| ខ្នាតតូច         | ១,៩        | ២១៤ ០០០                 | ៦៨ ៧៩៩                   | ៣២,១%     | ៥៩,៧%    | ៥,៨%         | ២៦,០%       | ១,៨%  | ៦,៧%   |
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ | ២,៨        | ៤៨៤ ០០០                 | ១១៦ ៤៦៦                  | ២៤,១%     | ៥៦,៤%    | ២,២%         | ៣៣,៧%       | ១,៤%  | ៦,៣%   |
| ខ្នាតមធ្យម >១៨   | ៣,៨        | ៩៣៤ ៥០០                 | ៩៧ ០៨៩                   | ១០,៤%     | ៤០,៥%    | ២,៣%         | ៥១,៤%       | ១,៤%  | ៤,៤%   |
| អ្ននអ្នស <១២     | ២,៦        | ៤០៩ ០០០                 | ១២០ ៣០៥                  | ២៩,៤%     | ៥៥,៥%    | ៦,៤%         | ២៨,៧%       | ២,០%  | ៧,៤%   |
| អ្ននអ្នស >១៨     | -          | -                       | -                        | -         | -        | -            | -           | -     | -      |
| អ្ននអ្នស ១២-១៨   | ២,៩        | ៧៨៧ ៥០០                 | ៤២៧ ១៣២                  | ៥៤,២%     | ៣៨,២%    | ១,១%         | ៥១,២%       | ២,៣%  | ៧,៣%   |

លំហូរសាច់ប្រាក់សរុប (GFC) និងប្រាក់ចំណេញដុល (GP%) ត្រូវបានគណនាដោយពិចារណាលើការចំណាយប្រតិបត្តិការនេសាទទាំងអស់ ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃថែទាំនិងការវិនិយោគដើមទុនក្នុងការទិញឧបករណ៍និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។ GFC អវិជ្ជមាន (បង្ហាញដោយអក្សរពណ៌ក្រហម) មានន័យថា ផ្អែកលើទិន្នន័យ ដែលទទួលបាន ប្រតិបត្តិការជាមធ្យមមិនរកប្រាក់ចំណេញទេ ដោយសារការចំណាយ ដែលបានរាយការណ៍គឺខ្ពស់ជាងតម្លៃនៃផលនេសាទ។

ប្រតិបត្តិការនេសាទស្ទើរតែទាំងអស់នៅខេត្តកំពតនិងកែប ទទួលបានផលចំណេញ ខណៈប្រតិបត្តិការនេសាទទាំងអស់នៅខេត្តកោះកុងនិងព្រះសីហនុមិនទទួលបានប្រាក់ចំណេញ។ ប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ គឺជាធាតុផ្សំដ៏ធំបំផុតនៃតម្លៃប្រតិបត្តិការនេសាទសម្រាប់គ្រប់ថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍។

### ៣. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងអនុសាសន៍

ការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ អនុវត្តដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលផលសមុទ្រ ដោយមានការសហការជាមួយមន្ត្រីខណ្ឌផលផលតំបន់ឆ្នេរ បានផ្តល់នូវទិន្នន័យនិងព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់ស្តីពីផលផលសមុទ្រ ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ ការវាយតម្លៃ និងការសម្រេចចិត្តកាន់តែប្រសើរក្នុងការគ្រប់គ្រង ហើយមានការកែតម្រូវវិធីសាស្ត្រខ្លះដោយមានការគាំទ្របច្ចេកទេសពី FAO CAPFISH។

១. ការប្រមូលទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមចាំបាច់ត្រូវធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញ។ ការប្រមូលទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គម គួរជាការអង្កេតប្រចាំត្រីមាសឬប្រចាំឆ្នាំ។ ការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រ និងការអង្កេត ចាំបាច់ត្រូវផ្អែកលើការវិភាគស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត និងការពិនិត្យឡើងវិញឱ្យស្របតាមតម្រូវការនៃផែនការគ្រប់គ្រងផលផលសមុទ្រ។

២. ភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យចាំបាច់ត្រូវកែលម្អ៖

ក. ប្រភពនៃទិន្នន័យចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសន៍ ថាទិន្នន័យដែលបានផ្តល់គឺទទួលបានពី

១. ការរំលឹកឡើងវិញដោយអ្នកនេសាទឬម្ចាស់ទូកនេសាទ ឬ ២. កត់ត្រាចម្លងពីកំណត់ត្រារបស់ពាណិជ្ជករ/ម្ចាស់ទូកនេសាទ។

- ខ. ការអង្កេតផ្ទៀងផ្ទាត់ចាំបាច់ត្រូវយកមកពិចារណាដើម្បីកំណត់ទាំងសមាសភាពប្រភេទ និងផលនេសាទតាមប្រភេទដោយប្រើសំណាករងដែលបានទិញពីអ្នកនេសាទ ឬម្ចាស់ទូកនេសាទសម្រាប់ការឡើងផលនេសាទតាមទូកនេសាទ ឧបករណ៍ ដែលជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ។
- គ. ការកំណត់លក្ខខណ្ឌសុពលភាពសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានអនុវត្តនៅទីវាល រួមមាន ការពិនិត្យឡើងវិញនូវ កម្មវិធី KoBo សម្រាប់អង្កេតផលនេសាទ កម្លាំងធ្វើនេសាទនិងតម្លៃ ដើម្បីកាត់បន្ថយការវាយអក្សរបន្ថែម និងចំណុចមិនរួមបញ្ចូលទាំងឡាយ ដើម្បីសម្រួលដល់ការងារសម្អាតទិន្នន័យ។
៣. ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកែលម្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ទូកនេសាទខ្នាតតូច < 6ម៉ែត្រដោយបន្ថែមចំនួនសំណាកចៃដន្យសម្រាប់ទូកនេសាទកន្ទុយវែង ដូចដែលបានណែនាំក្នុងអំឡុងពេលការវាយតម្លៃឆ្នាំ២០២១។
៤. ចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញលើការចាត់ថ្នាក់ឧបករណ៍នេសាទ ដែលប្រើក្នុងកម្មវិធី KoBo
  - ក. ធ្វើការញែកបំបែកអ្ននអូសជាប្រភេទរង ខ. pelagic /fly trawlers and beam trawlers
  - ខ. ពិនិត្យ និងការតម្រូវការចាត់ថ្នាក់និងឈ្មោះ ជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជី (drop-down list) សម្រាប់ជ្រើសរើសប្រភេទឧបករណ៍ ឈ្មោះដែលប្រើក្នុងកម្មវិធី KoBo។
៥. ធ្វើការពង្រឹងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងការកែច្នៃ (ការបោះចោលផលនេសាទ) ទាំងតាមរយៈការកែតម្រូវការអង្កេតតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទបច្ចុប្បន្ន និងការស្រាវជ្រាវបន្ថែម ជាពិសេសសម្រាប់ត្រីជី ត្រី ផលនេសាទផ្សេងទៀត និងផលនេសាទ ដែលគេបោះចោល។
  - ក. នៅក្នុងការអង្កេតតាមដាននិងវាយតម្លៃផលនេសាទ ប្រសិនបើត្រីជី ត្រី ផលនេសាទផ្សេងទៀតត្រូវបានរាយការណ៍គួរតែមានការបញ្ជាក់អំពីប្រភេទនិងការប្រើប្រាស់ដែលគេបានប្រើវាសម្រាប់៖ ចំណីត្រី ចំណីសម្រាប់វារីប្បកម្ម (ចិញ្ចឹមក្នុងបែរ) ការប្រើប្រាស់ បរិភោគរបស់មនុស្ស (ស្រស់ឬកែច្នៃ) ចំណីសម្រាប់បសុសត្វ សម្រាប់ធ្វើជីផ្សេងៗទៀត។
  - ខ. ធ្វើការកែលម្អ ទិន្នន័យស្តីពីសមាសភាពប្រភេទសម្រាប់ 'ត្រីជី' និងក្រុមប្រភេទ ជាពិសេសត្រី ផលនេសាទផ្សេងទៀតដែលរួមចំណែក១៣%នៃផលនេសាទសរុបដែលបានរាយការណ៍ តាមរយៈការធ្វើសំណាករង និងការវិភាគលើការឡើងផលនេសាទ ដែលបានជ្រើសរើសជាប្រធានបទស្រាវជ្រាវ ដោយសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល។
  - គ. ការបោះបង់ចោលផលនេសាទមានតិចតួចក្នុងទិន្នន័យ (តិចជាង ០,០៧% នៃផលនេសាទរាយការណ៍សរុប) ហើយជារឿយៗ ចំនួននេះតំណាងឱ្យតែសមាមាត្រដ៏តិចតួចនៃការបោះបង់ផលនេសាទពិតប្រាកដ ចំនុចនេះគួរតែត្រូវអង្កេតតាមរយៈការស្រាវជ្រាវដោយប្រើសៀវភៅបន្ទុកតាមការស្ម័គ្រចិត្ត ឬការរាយការណ៍ដោយអនាមិកឬតាមរយៈកម្មវិធីសង្កេតណាមួយ។
៦. មានការបញ្ចូលបន្ថែមឈ្មោះត្រីជាភាសាខ្មែរតាមមូលដ្ឋានច្រើនជាង១ ហើយសម្រាប់ឈ្មោះប្រភេទវិទ្យាសាស្ត្រ និងភាសាអង់គ្លេសដូចគ្នា ឬក្រុមប្រភេទ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើស្តង់ដារ និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងបញ្ជីឈ្មោះត្រី ដើម្បីបំបែកឈ្មោះប្រភេទវិទ្យាសាស្ត្រតាម ដែលអាចធ្វើបាន និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីជ្រើសរើសឈ្មោះ (Drop-down list) ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបញ្ចូលទិន្នន័យ និងជៀសវាងកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធទូទៅ។
៧. ធ្វើការកាត់បន្ថយការរាយការណ៍ពីផលនេសាទដោយមិនមានបញ្ជាក់ឧបករណ៍នេសាទ ហើយប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន ជៀសវាងការប្រមូលទិន្នន័យដោយមិនមានលក្ខណៈជាក់លាក់បា។ ធ្វើការកំណត់សំគាល់កំណត់ត្រាអង្កេត

៩. ធ្វើការអនុវត្តការអង្កេតសកម្មភាពនេសាទ ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណអំពីទូកនេសាទសកម្មប្រចាំខែសម្រាប់ប្រភេទទូកនេសាទ ឧបករណ៍សំខាន់ៗ។

១០. កែសម្រួលការចងកំណត់ ដើម្បីអាចឱ្យអាចធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈស្ថិតិលើផលនេសាទកម្លាំងធ្វើនេសាទ និងផលនេសាទសរុបតាមខេត្តនីមួយៗ។

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

ហត្ថលេខា



លោក ស៊ុយ សេរីវឌ្ឍន៍

បានឃើញ

ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជា

ប្រធានរដ្ឋបាលជលផល និងជាប្រធានកម្មវិធី CAPFISH-Capture

ថ្ងៃ ២៦ ០៥ ២០២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

ហត្ថលេខា



ជូ សុផា

ឧបសម្ព័ន្ធ១. ទម្ងន់សរុបតាមប្រភេទសរុប (គ.ក្រ) តាមខេត្ត

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ                 | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ                  | កំពត<br>កោះកុង | កែបព្រះ<br>សីហនុ | កំពត     | កែប     | សរុបរួម | %សរុប  | %កំណើន <sup>1</sup> |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------|---------|---------|--------|---------------------|
| <i>Encrasicholina heteroloba</i>   | Shorthead anchovy | កាកឹម                           | 29,345.0       | 165,533.0        | 2.0      |         | 194,880 | 30.62% | 30.62%              |
|                                    | Other fish nei    | ប្រភេទត្រីចំរុះ                 | 55,697.0       | 14,092.5         | 3,723.0  | 1,935.0 | 75,448  | 11.85% | 42.48%              |
|                                    | trash fish        | ត្រីជី                          | 17,207.0       | 31,515.8         | 416.0    | 1,505.0 | 50,644  | 7.96%  | 50.43%              |
| <i>Penaeus sp.</i>                 | Prawns nei        | បង្កា                           | 15,814.6       | 8,295.9          | 1,378.0  | 552.7   | 26,041  | 4.09%  | 54.52%              |
| <i>Portunus pelagicus</i>          | Swimming crab     | ក្អមសេះ                         | 9,863.5        | 8,695.8          | 2,108.9  | 3,054.5 | 23,723  | 3.73%  | 58.25%              |
|                                    | Needlefish nei    | ត្រីឆ្នោង                       | 33.0           |                  | 22,661.5 | 45.5    | 22,740  | 3.57%  | 61.82%              |
| <i>Metapenaeus spp.</i>            |                   | បង្កាឱខាក់                      | 21,074.0       | 145.3            | 39.7     | 10.0    | 21,269  | 3.34%  | 65.17%              |
|                                    | Mollusks nei      | សប្ប៊ីសត្វ ពពួកខ្យង ត្រី<br>ងាវ | 18,180.0       | 50.0             | 3.0      | 477.3   | 18,710  | 2.94%  | 68.11%              |
|                                    | Squids nei        | មីក                             | 13,940.4       | 2,341.6          | 151.0    | 155.8   | 16,589  | 2.61%  | 70.71%              |
| <i>Decapterus macrosoma</i>        | Shortfin scad     | ត្រីកាម៉ុងឬត្រីឆ្មាតូ           | 80.0           | 11,313.0         | 4,025.0  |         | 15,418  | 2.42%  | 73.14%              |
| <i>Atule mate</i>                  | Yellowtail scad   | ត្រីកូនគុំ                      | 15,001.0       |                  |          |         | 15,001  | 2.36%  | 75.49%              |
|                                    | Octopus           | មីកពឹងពាង                       | 8,552.0        | 477.0            | 938.0    | 679.1   | 10,646  | 1.67%  | 77.17%              |
| <i>Rastrelliger brachysoma</i>     | Short mackerel    | ត្រីផ្កាតូ ឬត្រីកាម៉ុងខ្លួនខ្លី | 3,675.0        | 2,492.0          | 3,909.0  |         | 10,076  | 1.58%  | 78.75%              |
| <i>Stolephorus indicus</i>         | Indian anchovy    | ត្រីក្រចកក្របី                  | 10,040.0       |                  |          | 1.0     | 10,041  | 1.58%  | 80.33%              |
|                                    | Pony fishes       | ត្រីកិ                          | 6,235.0        | 1,100.0          | 259.0    | 13.5    | 7,608   | 1.20%  | 81.52%              |
| <i>Scomberoides commersonianus</i> | Talang queenfish  | ត្រីកាឡាំង                      |                | 7,197.0          |          | 4.0     | 7,201   | 1.13%  | 82.65%              |
|                                    | Other catch nei   | ផ្សេងៗ                          | 390.5          | 144.0            | 6,587.1  | 65.0    | 7,187   | 1.13%  | 83.78%              |

<sup>1</sup> នេះគឺជាការប៉ាន់ស្មានទម្ងន់សរុបនៃទម្ងន់ប្រភេទ ដែលតម្រៀបតាមការចូលរួមចំណែក សម្រាប់តម្លៃខាងដើមទាំងអស់នៅក្នុងតារាង

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ             | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស                     | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ                                              | កំពត<br>កោះកុង | កែបព្រះ<br>សីហនុ | កំពត    | កែប     | សរុបរួម | %សរុប | %កំណើន <sup>1</sup> |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|---------|---------|-------|---------------------|
|                                | Shellfish nei                         | ខ្យង មីក ក្តាមផ្សេងៗ                                        | 502.0          | 6,068.0          |         | 221.0   | 6,791   | 1.07% | 84.85%              |
| <i>Chirocentrus dorab</i>      | Dorab wolf-herring                    | ត្រីស្រោមដាវ                                                | 5,520.0        |                  |         |         | 5,520   | 0.87% | 85.72%              |
| <i>Anodontostoma chacunda</i>  | Chacunda gizzard shad                 | ត្រីកាម៉ិយ                                                  | 10.0           | 1,392.0          | 3,859.0 | 179.0   | 5,440   | 0.85% | 86.57%              |
| <i>Sargocentron rubrum</i>     | Redcoat                               | ត្រីកាដី                                                    | 5,100.0        | 20.0             | 10.0    | 15.0    | 5,145   | 0.81% | 87.38%              |
| <i>Suborder Sepiina</i>        | Cuttlefish                            | មីកស្លូក                                                    | 3,885.0        | 333.5            | 218.7   | 358.8   | 4,796   | 0.75% | 88.13%              |
|                                | Cephalopods<br>(squids/cuttlefish)    | ពពួកមីកស្លូកនិងមីក<br>បំពង់                                 | 2,703.0        | 1,658.6          | 84.0    | 344.5   | 4,790   | 0.75% | 88.89%              |
| <i>Amblygaster sirm</i>        | Spotted sardine                       | ត្រីគូនបារាំង                                               | 4,100.0        |                  |         |         | 4,100   | 0.64% | 89.53%              |
| <i>Selaroides leptolepis</i>   | Yellow stripe trevally                | ត្រីឆ្មុតលឿង                                                | 3,700.0        |                  |         |         | 3,700   | 0.58% | 90.11%              |
| <i>Euthynnus affinis</i>       | Mackerel tuna                         | ត្រីឈាម                                                     | 3,500.0        |                  |         |         | 3,500   | 0.55% | 90.66%              |
| <i>Scomberomorus commerson</i> | Narrowbarred Spanish<br>mackerel      | ត្រីបេកាខ្មៅ ឬត្រីបេកា<br>ឆ្មុត                             | 3,320.0        | 10.0             |         |         | 3,330   | 0.52% | 91.18%              |
| <i>Rastrelliger kanagurta</i>  | Indian mackerel                       | ត្រីកាម៉ុងខ្លួនវែង                                          | 610.0          | 2,634.0          | 10.0    | 45.0    | 3,299   | 0.52% | 91.70%              |
| <i>Penaeus monodon</i>         | Giant tiger prawn                     | បង្កាខ្លីង                                                  | 1,396.0        | 273.0            | 63.0    | 1,383.2 | 3,115   | 0.49% | 92.19%              |
| <i>Amblygaster leiogaster</i>  | Smoothbelly sardine                   | ត្រីគូន                                                     | 3,000.0        | 20.0             |         |         | 3,020   | 0.47% | 92.67%              |
|                                | Mixed fish for (human)<br>consumption | ប្រភេទសម្រាប់ហូប                                            | 3,000.0        |                  |         |         | 3,000   | 0.47% | 93.14%              |
| <i>Leiognathus equulus</i>     | Common ponyfish                       | ត្រីសំបោរហៀរ "មាន<br>វិអិល"                                 | 2,881.0        |                  |         |         | 2,881   | 0.45% | 93.59%              |
|                                | Crabs (swimming crab,<br>mud crab)    | ពពួកក្តាម (រួមទាំងក្តាម<br>សេះ ក្តាមថ្ម ក្តាមជ័រ ជា<br>ដើម) | 2,073.5        | 3.0              | 35.0    | 670.3   | 2,782   | 0.44% | 94.03%              |
| <i>Megalaspis cordyla</i>      | Torpedo scad                          | ត្រីកន្ទុយរឹង                                               |                | 2,616.0          |         | 65.0    | 2,681   | 0.42% | 94.45%              |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ               | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស           | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ                                   | កំពត<br>កោះកុង | កែបព្រះ<br>សីហនុ | កំពត    | កែប     | សរុបរួម | %សរុប | %កំណើន <sup>1</sup> |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|---------|---------|-------|---------------------|
| <i>Siganus canaliculatus</i>     | Whitespotted Spinefoot      | ត្រីកន្តាំងក្រអូម                                | 2,060.0        |                  | 382.0   |         | 2,442   | 0.38% | 94.83%              |
| <i>Decapterus maruadsi</i>       | Round scad                  | ត្រីកូនគុំ                                       | 120.0          | 1,896.0          |         |         | 2,016   | 0.32% | 95.15%              |
| <i>Sardinella gibbosa</i>        | goldstripe sardine          | ត្រីគូន                                          | 500.0          | 1,120.0          |         | 2.0     | 1,622   | 0.25% | 95.40%              |
| <i>Thunnus tonggol</i>           | Longtail Tuna               | ត្រីប្រម៉ា                                       | 1,535.0        |                  |         |         | 1,535   | 0.24% | 95.65%              |
|                                  | squirrelfish                | ត្រីក្រហម                                        |                | 1,307.0          | 180.0   | 13.0    | 1,500   | 0.24% | 95.88%              |
| <i>Penaeus merguensis</i>        | Banana shrimp               | បង្កាប៉ាវ៉ា                                      | 661.5          | 703.5            | 0.5     | 61.5    | 1,427   | 0.22% | 96.11%              |
| <i>Rastrelliger faughni</i>      | Island mackerel             | ត្រីប៉ាឡាំង                                      |                |                  | 1,361.0 |         | 1,361   | 0.21% | 96.32%              |
| <i>Parastromateus niger</i>      | Black Pomfret               | ត្រីចាបខ្មៅ                                      | 1,205.0        | 2.0              |         |         | 1,207   | 0.19% | 96.51%              |
|                                  | Small mixed shrimp nei      | ដី                                               | 150.0          |                  |         | 1,042.2 | 1,192   | 0.19% | 96.70%              |
|                                  | Lizardfish                  | ត្រីក្អម                                         | 780.0          | 112.0            | 150.0   |         | 1,042   | 0.16% | 96.86%              |
| <i>Epinephelus coioides</i>      | Orange-spotted grouper      | ត្រីតុកកែកៅ                                      | 1,018.0        |                  |         | 5.0     | 1,023   | 0.16% | 97.02%              |
| <i>Hemiramphus far</i>           | Blackbarred halfbeak        | ត្រីផ្ទាំងផ្កា                                   |                |                  | 1,000.0 |         | 1,000   | 0.16% | 97.18%              |
|                                  | Mixed species catch in boat | ផលនេសាទមិនទាន់<br>ញែក(លាយគ្នា) នៅក្នុង<br>យូបទូក | 1,000.0        |                  |         |         | 1,000   | 0.16% | 97.34%              |
| <i>Sarda orientalis</i>          | Striped bonito              | ត្រីឈាមស                                         |                | 900.0            | 50.0    |         | 950     | 0.15% | 97.48%              |
| <i>Brevitrygon imbricata</i>     | Scaly whiplay               | បបែលមាន់                                         | 818.0          | 102.0            | 3.0     | 26.2    | 949     | 0.15% | 97.63%              |
|                                  | Rabbitfish                  | ត្រីកន្តាំង                                      |                |                  | 708.5   | 144.0   | 853     | 0.13% | 97.77%              |
| <i>Setipinna taty</i>            | Scaly hairfin anchovy       | ត្រីស្លឹកឫស្សី                                   | 850.0          |                  |         |         | 850     | 0.13% | 97.90%              |
| <i>Lutjanus argentimaculatus</i> | Mangrove red snapper        | ត្រីអាំងតឺយក្រហម                                 | 850.0          |                  |         |         | 850     | 0.13% | 98.03%              |
| <i>Anadara granosa</i>           | Blood cockle                | ត្រីឆ្កែឈាម                                      | 45.0           | 780.0            |         |         | 825     | 0.13% | 98.16%              |
|                                  | Mantis shrimp               | បង្កងកណ្តុប                                      | 93.1           | 188.3            | 518.7   | 6.5     | 807     | 0.13% | 98.29%              |
| <i>Acanthurus sp.</i>            | Surgeonfish                 | ត្រីកាតាំង                                       | 505.0          |                  | 251.7   | 37.5    | 794     | 0.12% | 98.42%              |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ                 | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស              | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ              | កំពត<br>កោះកុង | កែបព្រះ<br>សីហនុ | កំពត  | កែប   | សរុបរួម | %សរុប | %កំណើន <sup>1</sup> |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------|-------|---------|-------|---------------------|
|                                    | Shrimps (all kinds of shrimps) | ពពួកបង្កាត្រប់ប្រភេទទាំងអស់ | 482.0          | 7.0              | 75.0  | 111.0 | 675     | 0.11% | 98.52%              |
| <i>Crenimugil seheli</i>           | Bluespot mullet                | ត្រីក្បក                    | 94.0           |                  | 528.5 | 16.5  | 639     | 0.10% | 98.62%              |
|                                    | Cephalopods (octopus)          | ពពួកមីកពីងពាង               | 450.0          | 102.0            | 60.0  | 25.0  | 637     | 0.10% | 98.72%              |
| <i>Nemipterus hexodon</i>          | Ornate treadfin bream          | ត្រីអាងគីមលី                | 542.0          |                  |       |       | 542     | 0.09% | 98.81%              |
|                                    | Crabs nei                      | ក្តាមផ្សេងៗ                 |                |                  |       | 528.0 | 528     | 0.08% | 98.89%              |
|                                    | Tuna                           | ត្រីឈាម                     | 506.0          |                  |       |       | 506     | 0.08% | 98.97%              |
| <i>Scomberomorus sp.</i>           | Spanish mackerel species nei   | ត្រីបេកា                    | 250.3          | 104.0            | 106.0 |       | 460     | 0.07% | 99.04%              |
|                                    | Parrot fish                    | ត្រីសេក                     |                |                  | 227.5 | 174.0 | 402     | 0.06% | 99.11%              |
| <i>Otolithes ruber</i>             | Tigertooth Croaker             | ត្រីចង្កូមបី                | 372.0          | 2.0              |       |       | 374     | 0.06% | 99.16%              |
|                                    | Sharks                         | ឆ្លាម                       |                | 349.5            |       |       | 350     | 0.05% | 99.22%              |
|                                    | Rays nei                       | បបែល                        | 6.0            | 250.0            | 8.0   | 72.5  | 337     | 0.05% | 99.27%              |
| <i>Decapterus russelli</i>         | Slender scad                   | ត្រីកន្ទុយវីង               | 18.0           | 267.0            |       |       | 285     | 0.04% | 99.32%              |
| <i>Eleutheronema tetradactylum</i> | Four-finger threadfin          | ត្រីកាវ៉ាវ                  | 52.5           | 54.0             | 143.8 | 9.0   | 259     | 0.04% | 99.36%              |
| <i>Portunus spp.</i>               | Swimming crabs                 | ក្តាមសេះ                    | 2.0            | 34.0             | 6.0   | 203.0 | 245     | 0.04% | 99.40%              |
| <i>Episesarma sp.</i>              | Vinegar crab                   | ក្តាមជ័រ                    |                |                  |       | 226.0 | 226     | 0.04% | 99.43%              |
| <i>Lutjanus russelli</i>           | Russell's snapper              | ត្រីបោះត្រា                 | 168.0          |                  |       |       | 168     | 0.03% | 99.46%              |
| <i>Pseudorhombus arsius</i>        | Large-tooth flounder           | ត្រីអណ្តាតផ្អែ              | 94.5           | 48.0             | 5.0   | 14.0  | 162     | 0.03% | 99.48%              |
| <i>Thryssa hamiltonii</i>          | Hamilton's thryssa             | ត្រីស្លឹកឫស្សី              | 120.0          | 40.0             |       |       | 160     | 0.03% | 99.51%              |
| <i>Trichiurus lepturus</i>         | Largehead hairtail             | ត្រីកុកក្បាលធំ              | 150.0          |                  |       |       | 150     | 0.02% | 99.53%              |
| <i>Episesarma versicolor</i>       | Violet vinegar crab            | ក្តាមជ័រ                    | 36.5           |                  |       | 106.0 | 143     | 0.02% | 99.55%              |
| <i>Scylla serrata</i>              | Mud crab                       | ក្តាមថ្មី                   | 115.9          | 2.0              | 1.7   | 18.0  | 138     | 0.02% | 99.58%              |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ             | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស          | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ          | កំពត<br>កោះកុង | កែបព្រះ<br>សីហនុ | កំពត  | កែប  | សរុបរួម | %សរុប | %កំណើន <sup>1</sup> |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-------|------|---------|-------|---------------------|
| <i>Auxis thazard</i>           | Bullet tuna                | ត្រីកាឡាំង              |                | 130.0            |       |      | 130     | 0.02% | 99.60%              |
| <i>Anodontostoma chacuda</i>   | Chacunda gizzard shad      | ត្រីកាម៉យ               |                | 100.0            | 5.0   | 20.0 | 125     | 0.02% | 99.62%              |
| <i>Sillago sihama</i>          | Silver sillago             | ត្រីព្រលួស              |                | 19.0             | 23.5  | 70.0 | 113     | 0.02% | 99.63%              |
| <i>Lethrinus harak</i>         | Thumbprint emperor         | ត្រីបោះត្រា             | 88.0           |                  |       | 20.0 | 108     | 0.02% | 99.65%              |
| <i>scomberoides tala</i>       | Barred queenfish           | ត្រីកាឡាំង              |                | 107.0            |       |      | 107     | 0.02% | 99.67%              |
| (blank)                        | Lobster                    | បង្កងប៉ាក               | 6.3            | 55.0             | 27.5  | 17.4 | 106     | 0.02% | 99.68%              |
|                                | Other catch                | ផ្សេងៗទៀត Others        |                |                  | 100.0 | 4.0  | 104     | 0.02% | 99.70%              |
| <i>Saurida undosquamis</i>     | Bushtooth lizarfish        | ត្រីក្អមចិនអុជខ្មៅ      |                | 52.0             |       | 52.0 | 104     | 0.02% | 99.72%              |
| <i>Nemipterus japonicus</i>    | Japanese threadfin bream   | ត្រីជប៉ុនក្រហម          |                |                  | 100.0 |      | 100     | 0.02% | 99.73%              |
| <i>Panna microdon</i>          | Panna croaker              | ត្រីប្រម៉ា              | 1.0            |                  | 90.5  | 5.0  | 96      | 0.02% | 99.75%              |
|                                | Sea basses and groupers    | ត្រីតុកកែ               | 90.0           |                  |       |      | 90      | 0.01% | 99.76%              |
| <i>Chiloscyllium punctatum</i> | Brownbanded bambooshark    | ឆ្លាមឆ្លូត              | 80.0           |                  |       | 4.0  | 84      | 0.01% | 99.78%              |
| <i>Priacanthus tayenus</i>     | Purple-spotted bigeye      | ត្រីក្រហមភ្នែកលឿន       | 80.0           |                  |       |      | 80      | 0.01% | 99.79%              |
|                                | Emperors, scavengers nei   | ត្រីគ្រាប់ខ្នុរ         | 2.0            |                  | 72.0  | 5.5  | 80      | 0.01% | 99.80%              |
| <i>Nemipterus furcosus</i>     | Forktailed Threadfin Bream | ត្រីក្រហមស្រកាទន់       | 75.0           |                  |       |      | 75      | 0.01% | 99.81%              |
| <i>Sphyræna obtusata</i>       | Obtuse barracuda           | ត្រីអង្រែ               | 25.0           | 7.0              | 36.0  | 6.5  | 75      | 0.01% | 99.82%              |
|                                | Terapons                   | ត្រីត្រសក់              |                |                  | 57.0  | 13.5 | 71      | 0.01% | 99.83%              |
|                                | Breams                     | ត្រីក្រហម ឬត្រីឆ្លូតពីរ | 20.0           | 11.0             |       | 39.0 | 70      | 0.01% | 99.85%              |
| <i>Sillago ingenuua</i>        | Bay sillago                | ត្រីព្រលួសធម្មតា        |                |                  |       | 61.5 | 62      | 0.01% | 99.86%              |
| <i>Lutjanus gibbus</i>         | humpback red snapper       | ត្រីឆ្កែក្រហម           | 60.0           |                  |       |      | 60      | 0.01% | 99.87%              |



| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ              | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស         | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ          | កំពត<br>កោះកុង | កែបព្រះ<br>សីហនុ | កំពត | កែប  | សរុបរួម | %សរុប  | %កំណើន <sup>1</sup> |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------|------|---------|--------|---------------------|
| <i>Diagramma pictum</i>         | Painted sweetlips         | ត្រីកាដី                | 50.0           |                  |      | 6.0  | 56      | 0.01%  | 99.87%              |
| <i>Carangoides plagiotaenia</i> | Barcheek trevally         | ត្រីកាំគូច              |                | 55.0             |      |      | 55      | 0.01%  | 99.88%              |
|                                 | Barracuda                 | ត្រីអង្រែ               | 40.0           | 14.0             |      |      | 54      | 0.01%  | 99.89%              |
| <i>Arius maculatus</i>          | Spotted catfish           | ត្រីក្អក                | 39.0           |                  | 11.6 | 2.0  | 53      | 0.01%  | 99.90%              |
| <i>Gerres abbreviatus</i>       | Deepbody silverbidy       | ត្រីដូរអង្ករ            |                |                  |      | 51.0 | 51      | 0.01%  | 99.91%              |
| <i>Chiloscyllium griseum</i>    | Grey bambooshark          | ឆ្លាមគីង្កក់ឬឆ្លាមឆ្អុត |                | 10.0             |      | 38.0 | 48      | 0.01%  | 99.91%              |
|                                 | Shellfish nei             | ងាវចំរុះ                |                |                  |      | 45.5 | 46      | 0.01%  | 99.92%              |
| <i>Selar crumenophthalmus</i>   | Bigeye scad               | ត្រីកន្ទុយវីងភ្នែកធំ    |                | 45.0             |      |      | 45      | 0.01%  | 99.93%              |
| <i>Karalla daura</i>            | Goldstripe ponyfish       | ត្រីសំបោរហៀរអិល         | 40.0           |                  |      |      | 40      | 0.01%  | 99.94%              |
| <i>Lates calcarifer</i>         | Barramundi                | ត្រីឆ្លង់ស              |                | 2.0              |      | 35.0 | 37      | 0.01%  | 99.94%              |
|                                 | Snappers, jobfishes       | ត្រីអាំងកឹយ             |                |                  | 3.5  | 32.0 | 36      | 0.01%  | 99.95%              |
|                                 | mixed coral reef fish nei | ត្រីផ្កាថ្មចំរុះ        |                |                  |      | 30.0 | 30      | <0.01% | 99.95%              |
| <i>Lactarius lactarius</i>      | False trevally            | ត្រីស្លឹកខ្មុរ          | 22.0           |                  |      | 5.0  | 27      | <0.01% | 99.96%              |
|                                 | Mullets                   | ត្រីក្បក                | 23.0           |                  | 3.0  |      | 26      | <0.01% | 99.96%              |
|                                 | Drums and croakers nei    | ត្រីចង្កូមបី            | 21.0           |                  | 1.0  | 3.0  | 25      | <0.01% | 99.96%              |
| <i>Thalamita crenata</i>        | Crenate swimming crab     | ក្តាមថ្មខៀវ             |                |                  |      | 22.0 | 22      | <0.01% | 99.97%              |
| <i>Ellochelon vaigiensis</i>    | Squaretail Mullet         | ត្រីក្បកខ្នុក           | 21.0           |                  |      |      | 21      | <0.01% | 99.97%              |
| <i>Saurenhelys cancrivora</i>   | Slender Sorcerer          | ត្រីខ្លីងសមុទ្រ         |                |                  |      | 20.8 | 21      | <0.01% | 99.97%              |
|                                 | Flounders and soles nei   | ត្រីអណ្តាតឆ្កែ          | 0.5            |                  | 13.5 | 6.0  | 20      | <0.01% | 99.98%              |
| (blank)                         | Cephalopods               | មីកហ្វាយសាយ             |                | 19.0             |      | 0.5  | 20      | <0.01% | 99.98%              |
| <i>Rachycentron canadum</i>     | Cobia                     | ត្រីផ្ទក់សមុទ្រ         |                |                  |      | 14.0 | 14      | <0.01% | 99.98%              |
| <i>Gerres oyena</i>             | Common silverbidy         | ត្រីដូរអង្ករ            |                |                  | 13.0 |      | 13      | <0.01% | 99.98%              |
| <i>Acanthurus lineatus</i>      | Lined surgeonfish         | ត្រីកាតាំងឆ្អុត         | 3.0            |                  | 0.5  | 9.0  | 13      | <0.01% | 99.99%              |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ              | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស       | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ                    | កំពត<br>កោះកុង | កែបព្រះ<br>សីហនុ | កំពត | កែប  | សរុបរួម | %សរុប  | %កំណើន <sup>1</sup> |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------|------|---------|--------|---------------------|
| <i>Scarus ghobban</i>           | Blue-barred parrotfish  | ត្រីសេកស្រកាលឿង                   | 1.0            |                  | 0.5  | 10.0 | 12      | <0.01% | 99.99%              |
| <i>Paralichthys olivaceus</i>   | Olive flounder          | ត្រីអណ្តាតផ្កា                    | 1.0            |                  |      | 7.0  | 8       | <0.01% | 99.99%              |
| <i>Lutjanus malabaricus</i>     | Malabar blood snapper   | ត្រីក្រហម                         |                |                  |      | 8.0  | 8       | <0.01% | 99.99%              |
| <i>Scomberomorus lineolatus</i> | Streaked seerfish       | ត្រីបេកា                          | 7.0            |                  |      |      | 7       | <0.01% | 99.99%              |
|                                 | Trevallies              | ត្រីកាំកូច                        |                |                  |      | 5.0  | 5       | <0.01% | 99.99%              |
| <i>Priacanthus hamrur</i>       | Moontail                | ត្រីភ្នែកឡាន                      |                |                  |      | 5.0  | 5       | <0.01% | 99.99%              |
|                                 | Cutlassfish             | ត្រីកុក                           |                |                  | 4.0  |      | 4       | <0.01% | 99.99%              |
| <i>Choerodon anchorago</i>      | Orangedotted tuskfish   | ត្រីសេកទឹកក្រូច                   |                |                  |      | 4.0  | 4       | <0.01% | 99.99%              |
|                                 | Sharks and Rays         | ប្រភេទត្រីដី(ពពួកមាន<br>តម្លៃថោក) |                |                  | 1.0  | 3.0  | 4       | <0.01% | 100.00%             |
| <i>Carcharhinus sorrah</i>      | Spottail Shark          | ឆ្លាម                             |                |                  | 3.8  |      | 4       | <0.01% | 100.00%             |
| <i>Hemigymnus fasciatus</i>     | Barred thicklip         | ត្រីសេកមាត់ក្រាស់                 |                |                  | 3.0  |      | 3       | <0.01% | 100.00%             |
|                                 | Threadfins nei          | ត្រីកាវ៉ាវ                        |                |                  |      | 2.5  | 3       | <0.01% | 100.00%             |
| <i>Polydactylus sexfilis</i>    | Sixfinger threadfin     | ត្រីកាវ៉ាវព្រុយប្រាំមួយ           |                | 2.0              |      |      | 2       | <0.01% | 100.00%             |
|                                 | Herrings                | ត្រីក្បូក                         | 2.0            |                  |      |      | 2       | <0.01% | 100.00%             |
| <i>Coris sp.</i>                | Rainbow Wrasse          | ត្រីក្រឹម                         |                |                  | 2.0  |      | 2       | <0.01% | 100.00%             |
| <i>Leiognathus smithhursti</i>  | Smithhurst's ponyfish   | ត្រីកិខ្លួនខ្លី                   |                |                  |      | 2.0  | 2       | <0.01% | 100.00%             |
| <i>Pampus argenteus</i>         | Silver pomfret          | ត្រីចាបស                          |                |                  |      | 2.0  | 2       | <0.01% | 100.00%             |
| <i>Albula neoguinaica</i>       | Sharpjaw bonefish       | ត្រីបេកា                          |                |                  | 2.0  |      | 2       | <0.01% | 100.00%             |
| <i>Nemipterus thosaporni</i>    | Palefin threadfin bream | ត្រីក្រហម                         |                |                  |      | 2.0  | 2       | <0.01% | 100.00%             |
| <i>Gazza minuta</i>             | Toothpony               | ត្រីសំបោរហៀរ "គ្មាន<br>វិលីល"     | 2.0            |                  |      |      | 2       | <0.01% | 100.00%             |
| <i>Cheilinus trilobatus</i>     | Tripletail wrasse       | ត្រីសេកព្រុយបីកង់                 |                |                  |      | 1.5  | 2       | <0.01% | 100.00%             |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ           | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស      | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ          | កំពត<br>កោះកុង   | កែបព្រះ<br>សីហនុ | កំពត            | កែប             | សរុបរួម          | %សរុប  | %កំណើន <sup>1</sup> |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|---------------------|
| <i>Acentrogobius caninus</i> | Tropical sand goby     | ត្រីត្រង់ដោល/ ត្រីដំឡូង |                  |                  | 1.0             |                 | 1                | <0.01% | 100.00%             |
| <i>Terapon jarbua</i>        | Jarbua terapon         | ត្រីត្រសក់កន្ទុយឆែក     | 1.0              |                  |                 |                 | 1                | <0.01% | 100.00%             |
| <i>Cheilinus fasciatus</i>   | Redbreasted wrasse     | ត្រីសេកបង្កង់           |                  |                  |                 | 1.0             | 1                | <0.01% | 100.00%             |
|                              | Congers nei            | អន្ទង់សមុទ្រ            |                  |                  | 1.0             |                 | 1                | <0.01% | 100.00%             |
| <i>Siganus virgatus</i>      | Doublebarred spinefoot | ត្រីកន្ត្រាំងថ្ម        |                  |                  |                 | 0.5             | 1                | <0.01% | 100.00%             |
| <i>Maculabatis gerrardi</i>  | Whitespottted whipray  | បបែលអុជ                 |                  |                  | 0.5             |                 | 1                | <0.01% | 100.00%             |
| <i>Sillago sp.</i>           | Silver sillago         | ត្រីព្រលួស              |                  |                  |                 | 0.5             | 1                | <0.01% | 100.00%             |
|                              | <b>សរុបរួម</b>         |                         | <b>286,879.6</b> | <b>277,419.3</b> | <b>56,824.2</b> | <b>15,313.3</b> | <b>636,436.4</b> |        |                     |

ឧបសម្ព័ន្ធ២. តម្លៃសរុបរាយការណ៍តាមប្រភេទ (១០០០ រៀល) តាមខេត្តនីមួយៗ

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ                 | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស               | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ                      | កោះកុង  | ព្រះសីហនុ | កំពត    | កែប    | សរុបរួម | %សរុប  | %<br>កំណើន. |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|---------|--------|-------------|
| <i>Portunus pelagicus</i>          | Swimming crab                   | ក្តាមសេះ                            | 222,441 | 316,009   | 45,093  | 83,123 | 666,667 | 18.29% | 18.3%       |
|                                    | Other fish nei                  | ប្រភេទត្រីចំរុះ                     | 265,131 | 103,497   | 21,076  | 19,548 | 409,252 | 11.23% | 29.5%       |
|                                    | Squids nei                      | មីក                                 | 305,249 | 41,940    | 3,257   | 2,769  | 353,215 | 9.69%  | 39.2%       |
| <i>Penaeus sp.</i>                 | Prawns nei                      | បង្កា                               | 197,071 | 99,863    | 13,499  | 9,407  | 319,840 | 8.77%  | 48.0%       |
| <i>Metapenaeus spp.</i>            |                                 | បង្កាឱខាក់                          | 280,338 | 3,575     | 944     | 200    | 285,057 | 7.82%  | 55.8%       |
| <i>Encrasicholina heteroloba</i>   | Shorthead anchovy               | កាកឹម                               | 21,665  | 187,091   | 20      | -      | 208,776 | 5.73%  | 61.5%       |
| <i>Atule mate</i>                  | Yellowtail scad                 | ត្រីកូនគុំ                          | 120,007 | -         | -       | -      | 120,007 | 3.29%  | 64.8%       |
|                                    | Octopus                         | មីកពីងពាង                           | 93,164  | 6,208     | 11,196  | 8,603  | 119,170 | 3.27%  | 68.1%       |
|                                    | Needlefish nei                  | ត្រីឆ្មោង                           | 583     | -         | 106,669 | 348    | 107,600 | 2.95%  | 71.0%       |
| <i>Decapterus macrosoma</i>        | Shortfin scad                   | ត្រីកាម៉ុងឬត្រីប្លាធូ               | 86      | 76,539    | 23,175  | -      | 99,800  | 2.74%  | 73.8%       |
|                                    | Other catch nei                 | ផ្សេងៗ                              | 4,122   | 3,980     | 74,737  | 545    | 83,384  | 2.29%  | 76.1%       |
| <i>Suborder Sepiina</i>            | Cuttlefish                      | មីកស្លុក                            | 51,099  | 4,913     | 3,017   | 5,199  | 64,227  | 1.76%  | 77.8%       |
|                                    | Cephalopods (squids/cuttlefish) | ពពួកមីកស្លុកនិង<br>មីកបំពង់         | 34,164  | 18,035    | 835     | 9,640  | 62,673  | 1.72%  | 79.5%       |
| <i>Rastrelliger brachysoma</i>     | Short mackerel                  | ត្រីផ្កាធូ ឬត្រីកាម៉ុង<br>ខ្លីនខ្លី | 21,847  | 16,414    | 23,809  | -      | 62,070  | 1.70%  | 81.3%       |
| <i>Scomberoides commersonianus</i> | Talang queenfish                | ត្រីកាឡាំង                          | -       | 60,150    | -       | 80     | 60,230  | 1.65%  | 82.9%       |
| <i>Penaeus monodon</i>             | Giant tiger prawn               | បង្កាខ្លីង                          | 23,636  | 6,348     | 1,699   | 26,352 | 58,036  | 1.59%  | 84.5%       |
| <i>Euthynnus affinis</i>           | Mackerel tuna                   | ត្រីឈាម                             | 46,250  | -         | -       | -      | 46,250  | 1.27%  | 85.8%       |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ               | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស             | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ              | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | កំពត   | កែប   | សរុបរួម | %សរុប | %<br>កំណើន. |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|-------|---------|-------|-------------|
| <i>Scomberomorus commerson</i>   | Narrowbarred Spanish mackerel | ត្រីបេកាខ្មៅ ឬត្រីបេកាឆ្មុត | 43,550 | 150       | -      | -     | 43,700  | 1.20% | 87.0%       |
|                                  | trash fish                    | ត្រីជី                      | 11,510 | 21,951    | 244    | 968   | 34,673  | 0.95% | 87.9%       |
|                                  | Mantis shrimp                 | បង្កងកណ្តុប                 | 1,839  | 18,079    | 10,923 | 225   | 31,065  | 0.85% | 88.8%       |
| <i>Rastrelliger kanagurta</i>    | Indian mackerel               | ត្រីកាម៉ុងខ្លួនវែង          | 2,950  | 21,009    | 20     | 540   | 24,519  | 0.67% | 89.4%       |
| <i>Epinephelus coioides</i>      | Orange-spotted grouper        | ត្រីតុកកែកៅ                 | 21,463 | -         | -      | 200   | 21,663  | 0.59% | 90.0%       |
| <i>Sargocentron rubrum</i>       | Redcoat                       | ត្រីកាជី                    | 18,400 | 10        | 4      | 15    | 18,429  | 0.51% | 90.5%       |
| <i>Decapterus maruadsi</i>       | Round scad                    | ត្រីកូនគុំ                  | 620    | 15,854    | -      | -     | 16,474  | 0.45% | 91.0%       |
| <i>Thunnus tonggol</i>           | Longtail Tuna                 | ត្រីប្រម៉ា                  | 15,170 | -         | -      | -     | 15,170  | 0.42% | 91.4%       |
| <i>Anodontostoma chacunda</i>    | Chacunda gizzard shad         | ត្រីកាម៉យ                   | 80     | 4,611     | 8,645  | 837   | 14,173  | 0.39% | 91.8%       |
| <i>Megalaspis cordyla</i>        | Torpedo scad                  | ត្រីកន្ទុយវីង               | -      | 13,277    | -      | 805   | 14,082  | 0.39% | 92.2%       |
| <i>Penaeus merguensis</i>        | Banana shrimp                 | បង្កាប៉ារ៉ា                 | 7,723  | 4,947     | 15     | 959   | 13,644  | 0.37% | 92.6%       |
| <i>Siganus canaliculatus</i>     | Whitespotted Spinefoot        | ត្រីកន្តាំងក្រអូម           | 11,865 | -         | 1,489  | -     | 13,354  | 0.37% | 92.9%       |
|                                  | Mollusks nei                  | សប្បីសត្វ ពពួកខ្យង ត្រី ងាវ | 6,609  | 1,000     | 6      | 5,644 | 13,259  | 0.36% | 93.3%       |
| <i>Parastromateus niger</i>      | Black Pomfret                 | ត្រីចាបខ្មៅ                 | 12,050 | 40        | -      | -     | 12,090  | 0.33% | 93.6%       |
|                                  | Lizardfish                    | ត្រីក្អក់ចិន                | 9,700  | 176       | 425    | -     | 10,301  | 0.28% | 93.9%       |
| <i>Rastrelliger faughni</i>      | Island mackerel               | ត្រីប៉ាឡាំង                 | -      | -         | 9,885  | -     | 9,885   | 0.27% | 94.2%       |
|                                  | squirrelfish                  | ត្រីក្រហម                   | -      | 7,488     | 800    | 74    | 8,361   | 0.23% | 94.4%       |
| <i>Lutjanus argentimaculatus</i> | Mangrove red snapper          | ត្រីអាំងកឹយក្រហម            | 8,150  | -         | -      | -     | 8,150   | 0.22% | 94.6%       |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ           | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស               | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ                                       | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | កំពត  | កែប   | សរុបរួម | %សរុប | %<br>កំណើន. |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|---------|-------|-------------|
|                              | Shrimps                         | ពពូកបង្កាត្រប់<br>ប្រភេទទាំងអស់                      | 6,150  | 88        | 935   | 957   | 8,130   | 0.22% | 94.8%       |
| <i>Selaroides leptolepis</i> | Yellow stripe<br>trevally       | ត្រីឆ្មូតលឿង                                         | 8,047  | -         | -     | -     | 8,047   | 0.22% | 95.1%       |
|                              | Shellfish nei                   | ខ្យង មីក ក្តាមផ្សេងៗ                                 | 1,003  | 6,693     | -     | 329   | 8,025   | 0.22% | 95.3%       |
|                              | Cephalopods<br>(octopus)        | ពពូកមីកពីងពាង                                        | 5,215  | 1,383     | 842   | 335   | 7,775   | 0.21% | 95.5%       |
|                              | Small mixed shrimp<br>nei       | គី                                                   | 750    | -         | -     | 6,978 | 7,728   | 0.21% | 95.7%       |
|                              | Pony fishes                     | ត្រីកិ                                               | 5,184  | 1,750     | 476   | 53    | 7,463   | 0.20% | 95.9%       |
| <i>Brevitrygon imbricata</i> | Scaly whiplay                   | បបែលមាន់                                             | 5,764  | 1,102     | 8     | 291   | 7,164   | 0.20% | 96.1%       |
| <i>Sardinella gibbosa</i>    | goldstripe sardine              | ត្រីគូន                                              | 300    | 6,500     | -     | 8     | 6,808   | 0.19% | 96.3%       |
|                              | Mixed species catch<br>in boat  | ផលនេសាទមិន<br>ទាន់ញែកលាយ)<br>នៅក្នុងយូប (គ្នា<br>ទុក | 6,800  | -         | -     | -     | 6,800   | 0.19% | 96.5%       |
|                              | Lobster                         | បង្កងប៉ាក                                            | 488    | 5,420     | 426   | 387   | 6,721   | 0.18% | 96.7%       |
| <i>Portunus spp.</i>         | Swimming crabs                  | ក្តាមសេះ                                             | 20     | 712       | 120   | 5,845 | 6,697   | 0.18% | 96.9%       |
| <i>Acanthurus sp.</i>        | Surgeonfish                     | ត្រីកាតាំង                                           | 3,540  | -         | 2,301 | 485   | 6,326   | 0.17% | 97.0%       |
| <i>Scomberomorus sp.</i>     | Spanish mackerel<br>species nei | ត្រីបេកា                                             | 3,768  | 1,567     | 801   | -     | 6,136   | 0.17% | 97.2%       |
| <i>Stolephorus indicus</i>   | Indian anchovy                  | ត្រីក្រូចក្របី                                       | 6,080  | -         | -     | 15    | 6,095   | 0.17% | 97.4%       |
| <i>Hemiramphus far</i>       | Blackbarred halfbeak            | ត្រីផ្ទោងផ្កា                                        | -      | -         | 6,000 | -     | 6,000   | 0.16% | 97.5%       |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ                 | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស                 | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ                                          | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | កំពត  | កែប   | សរុបរួម | %សរុប | %<br>កំណើន. |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|---------|-------|-------------|
|                                    | Mixed fish for consumption        | ប្រភេទសម្រាប់ហូប                                        | 6,000  | -         | -     | -     | 6,000   | 0.16% | 97.7%       |
| <i>Chirocentrus dorab</i>          | Dorab wolf-herring                | ត្រីស្រោមដាវ                                            | 5,430  | -         | -     | -     | 5,430   | 0.15% | 97.8%       |
| <i>Leiognathus equulus</i>         | Common ponyfish                   | ត្រីសំបោរហៀរ "មានរំអិល"                                 | 5,135  | -         | -     | -     | 5,135   | 0.14% | 98.0%       |
|                                    | Sharks                            | ស្លាម                                                   | -      | 4,726     | -     | -     | 4,726   | 0.13% | 98.1%       |
| <i>Scylla serrata</i>              | Mud crab                          | ក្តាមថ្មី                                               | 3,255  | 62        | 75    | 910   | 4,302   | 0.12% | 98.2%       |
|                                    | 6-Crabs (swimming crab, mud crab) | ពពួកក្តាម រួមទាំង) ក្តាមសេះ: ក្តាម (ថ្មី ក្តាមជ័រ ជាដើម | 2,339  | 30        | 82    | 1,844 | 4,295   | 0.12% | 98.3%       |
| <i>Sarda orientalis</i>            | Striped bonito                    | ត្រីឈាមស                                                | -      | 3,780     | 400   | -     | 4,180   | 0.11% | 98.5%       |
| <i>Amblygaster leiogaster</i>      | Smoothbelly sardine               | ត្រីតូន                                                 | 3,600  | 160       | -     | -     | 3,760   | 0.10% | 98.6%       |
| <i>Amblygaster sirm</i>            | Spotted sardine                   | ត្រីតូនបារាំង                                           | 3,660  | -         | -     | -     | 3,660   | 0.10% | 98.7%       |
| <i>Eleutheronema tetradactylum</i> | Fourfinger threadfin              | ត្រីកាវ៉ាវ                                              | 390    | 964       | 1,996 | 255   | 3,605   | 0.10% | 98.8%       |
|                                    | Rabbitfish                        | ត្រីកន្តាំង                                             | -      | -         | 2,670 | 797   | 3,466   | 0.10% | 98.9%       |
|                                    | Rays nei                          | បបែល                                                    | 54     | 2,050     | 60    | 1,014 | 3,178   | 0.09% | 98.9%       |
| <i>Anadara granosa</i>             | Blood cockle                      | ត្រែងឈាម                                                | 962    | 1,950     | -     | -     | 2,912   | 0.08% | 99.0%       |
| <i>Pseudorhombus arsius</i>        | Large tooth flounder              | ត្រីអណ្តាតឆ្មៃ                                          | 611    | 1,356     | 7     | 171   | 2,144   | 0.06% | 99.1%       |
| <i>Crenimugil seheli</i>           | Bluespot mullet                   | ត្រីក្បក                                                | 713    | -         | 1,034 | 114   | 1,861   | 0.05% | 99.1%       |
| <i>Trichiurus lepturus</i>         | Large head hairtail               | ត្រីកុកក្បាលធំ                                          | 1,800  | -         | -     | -     | 1,800   | 0.05% | 99.2%       |
| <i>Nemipterus hexodon</i>          | Ornate treadfin bream             | ត្រីអាងគីមលី                                            | 1,713  | -         | -     | -     | 1,713   | 0.05% | 99.2%       |
| <i>Lutjanus russelli</i>           | Russell's snapper                 | ត្រីបោះត្រា                                             | 1,541  | -         | -     | -     | 1,541   | 0.04% | 99.3%       |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ              | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស       | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ      | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | កំពត | កែប   | សរុបរួម | %សរុប | %<br>កំណើន. |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-----------|------|-------|---------|-------|-------------|
|                                 | Parrot fish             | ត្រីសេក             | -      | -         | 732  | 730   | 1,461   | 0.04% | 99.3%       |
| <i>Decapterus russelli</i>      | Slender scad            | ត្រីកន្ទុយរឹង       | 66     | 1,318     | -    | -     | 1,384   | 0.04% | 99.4%       |
|                                 | Sea basses and groupers | ត្រីតុកកែ           | 1,310  | -         | -    | -     | 1,310   | 0.04% | 99.4%       |
| <i>Otolithes ruber</i>          | Tigertooth Croaker      | ត្រីចង្កូមបី        | 1,204  | 30        | -    | -     | 1,234   | 0.03% | 99.4%       |
|                                 | Crabs nei               | ក្តាមផ្សេងៗ         | -      | -         | -    | 1,177 | 1,177   | 0.03% | 99.5%       |
| <i>Setipinna taty</i>           | Scaly hairfin anchovy   | ត្រីស្លឹកឫស្សី      | 1,135  | -         | -    | -     | 1,135   | 0.03% | 99.5%       |
| <i>Carangoides plagiotaenia</i> | Barcheek trevally       | ត្រីកាំគូច          | -      | 1,100     | -    | -     | 1,100   | 0.03% | 99.5%       |
| <i>Auxis thazard</i>            | Bullet tuna             | ត្រីកាឡាំង          | -      | 1,040     | -    | -     | 1,040   | 0.03% | 99.5%       |
| <i>scomberoides tala</i>        | Barred queenfish        | ត្រីកាឡាំង          | -      | 856       | -    | -     | 856     | 0.02% | 99.6%       |
| <i>Sillago sihama</i>           | Silver sillago          | ត្រីព្រលួស          | -      | 48        | 92   | 701   | 840     | 0.02% | 99.6%       |
|                                 | Tuna                    | ត្រីឈាម             | 818    | -         | -    | -     | 818     | 0.02% | 99.6%       |
| <i>Saurida undosquamis</i>      | Bushtooth lizarfish     | ត្រីក្តិនិរុទ្ធអ្នៅ | -      | 623       | -    | 154   | 777     | 0.02% | 99.6%       |
| <i>Chiloscyllium punctatum</i>  | Brownbanded bambooshark | ឆ្កាមឆ្មុត          | 530    | -         | -    | 120   | 650     | 0.02% | 99.7%       |
|                                 | Cephalopods             | មីកហ្វូយសាយ         | -      | 608       | -    | 18    | 626     | 0.02% | 99.7%       |
| <i>Lutjanus gibbus</i>          | humpback red snapper    | ត្រីឆ្មុតក្រហម      | 600    | -         | -    | -     | 600     | 0.02% | 99.7%       |
| <i>Sillago ingenuua</i>         | Bay sillago             | ត្រីព្រលួសធម្មតា    | -      | -         | -    | 583   | 583     | 0.02% | 99.7%       |
| <i>Episesarma versicolor</i>    | Violet vinegar crab     | ក្តាមជ័រ            | 61     | -         | -    | 512   | 573     | 0.02% | 99.7%       |
| <i>Lethrinus harak</i>          | Thumbprint emperor      | ត្រីបោះត្រា         | 247    | -         | -    | 300   | 547     | 0.02% | 99.7%       |
| <i>Anodontostoma chacuda</i>    | chacunda gizzard shad   | ត្រីកាម៉យ           | -      | 450       | 15   | 80    | 545     | 0.01% | 99.8%       |
| <i>Arius maculatus</i>          | Spotted catfish         | ត្រីក្អក            | 264    | -         | 255  | 4     | 523     | 0.01% | 99.8%       |



| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ             | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស            | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ                 | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | កំពត | កែប | សរុបរួម | %សរុប | %<br>កំណើន. |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|------|-----|---------|-------|-------------|
| <i>Panna microdon</i>          | Panna croaker                | ត្រីប្រម៉ា                     | 15     | -         | 406  | 100 | 521     | 0.01% | 99.8%       |
| <i>Sphyraena obtusata</i>      | Obtuse barracuda             | ត្រីអង្រែ                      | 125    | 91        | 217  | 78  | 511     | 0.01% | 99.8%       |
|                                | Breams                       | ត្រីក្រហម ឬត្រីឆ្កែត<br>ពីរ    | 160    | 132       | -    | 192 | 484     | 0.01% | 99.8%       |
|                                | Emperors,<br>scavengers nei  | ត្រីគ្រាប់ខ្នុរ                | 6      | -         | 441  | 23  | 470     | 0.01% | 99.8%       |
| <i>Chiloscyllium griseum</i>   | Grey bambooshark             | ឆ្ការត្រីក្នុងកំប្លោម<br>ឆ្កែត | -      | 200       | -    | 257 | 457     | 0.01% | 99.8%       |
| <i>Selar crumenophthalmus</i>  | Bigeye scad                  | ត្រីកន្ទុយរឹងភ្នែកធំ           | -      | 450       | -    | -   | 450     | 0.01% | 99.8%       |
| <i>Gerres abbreviatus</i>      | Deep body silver<br>biddy    | ត្រីជួរអង្ករ                   | -      | -         | -    | 403 | 403     | 0.01% | 99.9%       |
|                                | Barracuda                    | ត្រីអង្រែ                      | 200    | 186       | -    | -   | 386     | 0.01% | 99.9%       |
| <i>Episesarma sp.</i>          | Vinegar crab                 | ក្តាមជ័រ                       | -      | -         | -    | 318 | 318     | 0.01% | 99.9%       |
|                                | mixed coral reef fish<br>nei | ត្រីផ្កាថ្មចំរុះ               | -      | -         | -    | 300 | 300     | 0.01% | 99.9%       |
| <i>Lates calcarifer</i>        | Barramundi                   | ត្រីឆ្កែស                      | -      | 50        | -    | 245 | 295     | 0.01% | 99.9%       |
|                                | Snappers, jobfishes          | ត្រីអាំងក៊ីយ                   | -      | -         | 77   | 200 | 277     | 0.01% | 99.9%       |
|                                | Shellfish nei                | ងារចំរុះ                       | -      | -         | -    | 273 | 273     | 0.01% | 99.9%       |
| <i>Diagramma pictum</i>        | Painted sweetlips            | ត្រីកាជី                       | 260    | -         | -    | 2   | 262     | 0.01% | 99.9%       |
| <i>Thryssa hamiltonii</i>      | Hamilton's thryssa           | ត្រីស្លឹកឫស្សី                 | 72     | 185       | -    | -   | 257     | 0.01% | 99.9%       |
|                                | Other catch                  | ផ្សេងៗទៀត                      | -      | -         | 200  | 47  | 247     | 0.01% | 99.9%       |
|                                | Mulletts                     | ត្រីក្បក                       | 175    | -         | 45   | -   | 220     | 0.01% | 99.9%       |
| <i>Rachycentron canadum</i>    | Cobia                        | ត្រីផ្ទាំងសមុទ្រ               | -      | -         | -    | 207 | 207     | 0.01% | 99.9%       |
| <i>Saurenchelys cancrivora</i> | Slender Sorcerer             | ត្រីខ្លីងសមុទ្រ                | -      | -         | -    | 189 | 189     | 0.01% | 99.9%       |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ              | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស             | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ                    | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | កំពត | កែប | សរុបរួម | %សរុប  | %<br>កំណើន. |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|------|-----|---------|--------|-------------|
|                                 | Drums and croakers<br>nei     | ត្រីចង្កូមបី                      | 141    | -         | 6    | 27  | 174     | <0.01% | 100.0%      |
| <i>Ellochelon vaigiensis</i>    | Squaretail Mullet             | ត្រីក្បកខ្នុក                     | 168    | -         | -    | -   | 168     | <0.01% |             |
| <i>Gerres oyena</i>             | Common silverbidy             | ត្រីដូរអង្ករ                      | -      | -         | 156  | -   | 156     | <0.01% |             |
|                                 | Congers nei                   | អន្ទង់សមុទ្រ                      | -      | -         | 150  | -   | 150     | <0.01% |             |
|                                 | Terapons                      | ត្រីត្រសក់                        | -      | -         | 91   | 27  | 118     | <0.01% |             |
| <i>Nemipterus furcosus</i>      | Forktailed Threadfin<br>Bream | ត្រីក្រហមស្រកា<br>ទន់             | 116    | -         | -    | -   | 116     | <0.01% |             |
| <i>Carcharhinus sorrah</i>      | Spottail Shark                | ឆ្លាម                             | -      | -         | 114  | -   | 114     | <0.01% |             |
| <i>Scomberomorus lineolatus</i> | Streaked seerfish             | ត្រីបេកា                          | 105    | -         | -    | -   | 105     | <0.01% |             |
| <i>Priacanthus tayenus</i>      | Purple-spotted<br>bigeye      | ត្រីក្រហមភ្នែក<br>លៀន             | 103    | -         | -    | -   | 103     | <0.01% |             |
| <i>Thalamita crenata</i>        | Crenate swimming<br>crab      | ក្តាមថ្មខៀវ                       | -      | -         | -    | 90  | 90      | <0.01% |             |
|                                 | Flounders and soles<br>nei    | ត្រីអណ្តាតឆ្កែ                    | 3      | -         | 28   | 52  | 83      | <0.01% |             |
|                                 | Threadfins nei                | ត្រីកាក្រវី                       | -      | -         | -    | 75  | 75      | <0.01% |             |
| <i>Nemipterus japonicus</i>     | Japanese threadfin<br>bream   | ត្រីជប៉ុនក្រហម                    | -      | -         | 70   | -   | 70      | <0.01% |             |
| <i>Acanthurus lineatus</i>      | Lined surgeonfish             | ត្រីកាតាំងឆ្នួត                   | 15     | -         | 3    | 41  | 59      | <0.01% |             |
| <i>Paralichthys olivaceus</i>   | Olive flounder                | ត្រីអណ្តាតឆ្កែ                    | 5      | -         | -    | 50  | 55      | <0.01% |             |
| <i>Polydactylus sexfilis</i>    | Six-finger threadfin          | ត្រីកាក្រវីព្រួយ<br>ប្រាំមួយ      | -      | 50        | -    | -   | 50      | <0.01% |             |
|                                 | Sharks and Rays               | ប្រភេទត្រីជីពពួត)<br>(មានតម្លៃថោក | -      | -         | 20   | 28  | 48      | <0.01% |             |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ           | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស       | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ               | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | កំពត | កែប | សរុបរួម | %សរុប  | %<br>កំណើន. |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|-----------|------|-----|---------|--------|-------------|
| <i>Scarus ghobban</i>        | Blue-barred parrotfish  | ត្រីសេកស្រកា<br>លឿង          | -      | -         | 2    | 45  | 47      | <0.01% |             |
| <i>Lutjanus malabaricus</i>  | Malabar blood snapper   | ត្រីក្រហម                    | -      | -         | -    | 36  | 36      | <0.01% |             |
| <i>Karalla daura</i>         | Goldstripe ponyfish     | ត្រីសំបោរហៀរ<br>រំអិល        | 30     | -         | -    | -   | 30      | <0.01% |             |
|                              | Trevallies              | ត្រីកាំកូច                   | -      | -         | -    | 28  | 28      | <0.01% |             |
| <i>Lactarius lactarius</i>   | False trevally          | ត្រីស្លឹកខ្នុរ               | 20     | -         | -    | 8   | 28      | <0.01% |             |
| <i>Priacanthus hamrur</i>    | Moontail                | ត្រីភ្នែកឡាន                 | -      | -         | -    | 25  | 25      | <0.01% |             |
|                              | Herrings                | ត្រីក្បក                     | 20     | -         | -    | -   | 20      | <0.01% |             |
| <i>Albula neoguinaica</i>    | Sharpjaw bonefish       | ត្រីបេកា                     | -      | -         | 14   | -   | 14      | <0.01% |             |
| <i>Choerodon anchorago</i>   | Orangedotted tuskfish   | ត្រីសេកទឹកក្រូច              | -      | -         | -    | 12  | 12      | <0.01% |             |
| <i>Pampus argenteus</i>      | Silver pomfret          | ត្រីចាបស                     | -      | -         | -    | 10  | 10      | <0.01% |             |
| <i>Gazza minuta</i>          | Toothpony               | ត្រីសំបោរហៀរ<br>"គ្មានរំអិល" | 10     | -         | -    | -   | 10      | <0.01% |             |
| <i>Nemipterus thosaporni</i> | Palefin threadfin bream | ត្រីក្រហម                    | -      | -         | -    | 9   | 9       | <0.01% |             |
| <i>Coris sp.</i>             | Rainbow Wrasse          | ត្រីត្រីម                    | -      | -         | 8    | -   | 8       | <0.01% |             |
| <i>Hemigymnus fasciatus</i>  | Barred thicklip         | ត្រីសេកមាត់ក្រាស់            | -      | -         | 8    | -   | 8       | <0.01% |             |
| <i>Siganus virgatus</i>      | Doublebarred spinefoot  | ត្រីកន្ទាំងថ្ម               | -      | -         | -    | 6   | 6       | <0.01% |             |
| <i>Cheilinus fasciatus</i>   | Redbreasted wrasse      | ត្រីសេកបង្កង់                | -      | -         | -    | 5   | 5       | <0.01% |             |
| <i>Cheilinus trilobatus</i>  | Tripletail wrasse       | ត្រីសេកព្រួយបីកង់            | -      | -         | -    | 5   | 5       | <0.01% |             |
|                              | Cutlassfish             | ត្រីកុក                      | -      | -         | 4    | -   | 4       | <0.01% |             |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ             | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស     | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ         | កោះកុង    | ព្រះសីហនុ | កំពត    | កែប     | សរុបរួម   | %សរុប  | %<br>កំណើន. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------|-------------|
| <i>Leiognathus smithhursti</i> | Smithhurst's ponyfish | ត្រីកិន្ទន្ទី          | -         | -         | -       | 4       | 4         | <0.01% |             |
| <i>Acentrogobius caninus</i>   | Tropical sand goby    | ត្រីត្រងោលត្រី / ដំឡូង | -         | -         | 2       | -       | 2         | <0.01% |             |
| <i>Sillago sp.</i>             | Silver sillago        | ត្រីព្រលួស             | -         | -         | -       | 1       | 1         | <0.01% |             |
| <i>Maculabatis gerrardi</i>    | Whitespottted whipray | បបែលអុជ                | -         | -         | 1       | -       | 1         | <0.01% |             |
| <b>សរុប</b>                    |                       |                        | 1,956,825 | 1,100,859 | 382,866 | 204,660 | 3,645,209 |        |             |

ឧបសម្ព័ន្ធ៣. ទម្ងន់ផលនេសាទជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃ (គ.ក្រ/ថ្ងៃ) តាមឧបករណ៍និងខេត្ត

| កោះកុង               | ខ្នាតតូច |              | ខ្នាតមធ្យម |              |
|----------------------|----------|--------------|------------|--------------|
| ប្រភេទឧបករណ៍នេសាទ    | មធ្យម    | ε%           | មធ្យម      | ε%           |
| អូនអូស               |          |              | 126.5      | 15.3%        |
| មងក្តាម              | 6.8      | 11.5%        | 6.7        | 12.1%        |
| មងត្រី               | 5.5      | <b>43.6%</b> | 61.5       | 26.9%        |
| លបក្តាម              | 8.0      | 25.0%        | 56.6       | 9.5%         |
| មងត្រីកាម៉ុង         | 34.0     | 10.8%        | 46.1       | 14.5%        |
| សន្ទូចមីក            | 40.3     | 10.4%        | 51.4       | 7.2%         |
| ឈើមឌុន               | 40.7     | 12.3%        | 34.2       | 20.5%        |
| មងបង្ការ             | 117.0    | <b>57.6%</b> | 254.1      | <b>46.6%</b> |
| លបត្រី               |          |              | 86.9       | 11.1%        |
| សន្ទូចអូសមីក         |          |              | 31.3       | 17.9%        |
| ឈ្មាងអូសក្រែងឈាម     |          |              | 4.9        | 19.4%        |
| សន្ទូចរនងមីក         |          |              | 28.0       | 14.9%        |
| លបខ្យង               |          |              | 41.5       | 3.6%         |
| មងហ៊ុំ               |          |              | 2,043.0    | <b>54.2%</b> |
| រនាស់អូសគ្រុក្រឡាហូល | 585.0    | 3.0%         |            |              |
| មងបង្កងប៉ាក          |          |              | 7.9        | <b>34.2%</b> |
| លបមីក                | 13.0     | 15.4%        |            |              |

| ព្រះសីហនុ         | ខ្នាតតូច |      | ខ្នាតមធ្យម |       |
|-------------------|----------|------|------------|-------|
| ប្រភេទឧបករណ៍នេសាទ | មធ្យម    | ε%   | មធ្យម      | ε%    |
| អូនអូស            |          |      | 470.4      | 6.1%  |
| មងក្តាម           | 41.6     | 8.8% | 43.5       | 13.2% |
| មងត្រី            | 59.7     | 5.8% | 126.3      | 8.3%  |
| មងត្រីកាម៉ុង      |          |      | 232.5      | 8.7%  |
| សន្ទូចមីក         |          |      | 76.5       | 21.6% |
| មងបង្ការ          |          |      | 31.0       | 13.1% |
| លបខ្យង            |          |      | 46.7       | 7.1%  |

| កំពត              | ខ្នាតតូច |      | ខ្នាតមធ្យម |              |
|-------------------|----------|------|------------|--------------|
| ប្រភេទឧបករណ៍នេសាទ | មធ្យម    | ε%   | មធ្យម      | ε%           |
| អូនអូស            |          |      | 39.7       | 3.0%         |
| មងក្តាម           | 8.1      |      | 12.5       | <b>60.0%</b> |
| មងត្រី            | 43.3     | 0.1% | 69.4       | 17.6%        |

|               |      |       |       |              |
|---------------|------|-------|-------|--------------|
| លបក្តាម       | 16.1 | 0.7%  | 21.2  | 3.9%         |
| មងត្រីកាម៉ុង  | 39.5 | 2.3%  | 105.2 | 23.6%        |
| មងត្រីធ្មោង   |      |       | 301.8 | <b>45.0%</b> |
| មងត្រីក្បក    | 9.8  | 2.5%  |       |              |
| មងត្រីកន្តាំង | 25.6 | 5.1%  |       |              |
| លឺបរុញដោយដៃ   | 11.5 | 6.3%  |       |              |
| មងបង្កាបីជាន់ | 6.7  | 10.4% |       |              |

| កែប               | ខ្នាតតូច |       | ខ្នាតមធ្យម |       |
|-------------------|----------|-------|------------|-------|
| ប្រភេទឧបករណ៍នេសាទ | មធ្យម    | ε%    | មធ្យម      | ε%    |
| អូនអូស            |          |       | 50.5       | 2.4%  |
| មងក្តាម           |          |       | 17.8       | 4.5%  |
| មងត្រី            | 18.2     | 0.00% | 26.3       | 23.8% |
| លបក្តាម           | 11.8     | 0.02% | 22.4       | 18.3% |
| មងត្រីកាម៉ុង      |          |       | 11.3       | 11.1% |
| សន្ទូចមីក         |          |       | 35.0       | 14.3% |
| សន្ទូចអូសមីក      |          |       | 16.5       | 9.1%  |

ឧបសម្ព័ន្ធ៤. ផលនេសាទសរុបប៉ាន់ប្រមាណប្រចាំឆ្នាំតាមខេត្តនីមួយៗ

**ទម្ងន់ផលនេសាទមធ្យម**

| ថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍ | កំពត    | កែប  | កោះកុង  | ព្រះសីហនុ | ថ្នាក់ជាតិ |
|-----------------------|---------|------|---------|-----------|------------|
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ម     | 283.2   | 27.3 | 348.5   | 229.3     | 213.0      |
| ខ្នាតមធ្យម ១៨-២៤ម     | 1,763.1 | 42.2 | 5,382.5 | 765.4     | 1,743.3    |
| ខ្នាតតូច < ៦ម         |         |      | 19.2    |           | 19.2       |
| ខ្នាតតូច ៦-១២ម        | 43.4    | 18.9 | 132.5   | 199.2     | 78.4       |
| អ្ននអ្នស ៦-១២ម        | 50.2    | 58.3 | 412.7   | 169.3     | 105.5      |
| អ្ននអ្នស ១២-១៨ម       | 100.6   | 80.8 | 2,504.3 | 945.0     | 1,020.3    |
| អ្ននអ្នស ១៨-២៤ម       |         |      | 5,342.8 | 1,011.0   | 1,732.9    |

តម្លៃពណ៌ក្រហម មិនត្រឹមត្រូវតាមបែបស្ថិតិ និងមិនគួរប្រើ

**គម្លាតស្តង់ដារ (Standard Deviation) សម្រាប់ទម្ងន់ផលនេសាទ**

| ថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍<br>នេសាទ | កំពត  | កែប   | កោះកុង  | ព្រះសីហនុ | ថ្នាក់ជាតិ |
|--------------------------------|-------|-------|---------|-----------|------------|
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ម              | 583.3 | 18.3  | 1,069.8 | 359.6     | 687.4      |
| ខ្នាតមធ្យម ១៨-២៤ម              | 498.1 | 33.9  | 8,258.5 | 501.4     | 4,144.9    |
| ខ្នាតតូច < ៦ម                  |       |       | 4.6     |           | 4.6        |
| ខ្នាតតូច ៦-១២ម                 | 38.8  | 15.5  | 352.0   | 109.2     | 221.4      |
| អ្ននអ្នស ៦-១២ម                 | 20.3  | 17.8  | 571.1   | 218.7     | 230.7      |
| អ្ននអ្នស ១២-១៨ម                | 242.1 | 118.2 | 5,605.9 | 1,456.2   | 2,547.0    |
| អ្ននអ្នស ១៨-២៤ម                |       |       | ,6110.3 | 1,850.8   | 3,294.3    |

**ចំនួនការឡើងផលនេសាទ**

| ថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍<br>នេសាទ | កំពត | កែប | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | ថ្នាក់ជាតិ |
|--------------------------------|------|-----|--------|-----------|------------|
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ម              | 85   | 172 | 179    | 106       | 542        |
| ខ្នាតមធ្យម ១៨-២៤ម              | 14   | 16  | 16     | 32        | 78         |
| ខ្នាតតូច < ៦ម                  |      |     | 5      |           | 5          |
| ខ្នាតតូច ៦-១២ម                 | 134  | 96  | 143    | 22        | 395        |
| អ្ននអ្នស ៦-១២ម                 | 180  | 142 | 45     | 44        | 411        |
| អ្ននអ្នស ១២-១៨ម                | 35   | 23  | 47     | 212       | 317        |
| អ្ននអ្នស ១៨-២៤ម                |      |     | 6      | 30        | 36         |

**តម្លៃកម្រិតលម្អៀងសមស្រប (ε%) នៃផលនេសាទជាមធ្យម**

| ថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍<br>នេសាទ | កំពត  | កែប   | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | ថ្នាក់ជាតិ |
|--------------------------------|-------|-------|--------|-----------|------------|
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ម              | 22.3% | 5.1%  | 22.9%  | 15.2%     | 13.9%      |
| ខ្នាតមធ្យម ១៨-២៤ម              | 7.6%  | 20.1% | 38.4%  | 11.6%     | 26.9%      |
| ខ្នាតតូច < ៦ម                  |       |       | 10.7%  |           | 10.7%      |
| ខ្នាតតូច ៦-១២ម                 | 7.7%  | 8.4%  | 22.2%  | 11.7%     | 14.2%      |
| អូនអូស ៦-១២ម                   | 3.0%  | 2.6%  | 20.6%  | 19.5%     | 10.8%      |
| អូនអូស ១២-១៨ម                  | 40.7% | 30.5% | 32.7%  | 10.6%     | 14.0%      |
| អូនអូស ១៨-២៤ម                  |       |       | 46.7%  | 33.4%     | 31.7%      |

តម្លៃ ε%, ខ្ពស់ជាង ៣០% ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្លៃមធ្យម មិនត្រឹមត្រូវតាមបែបស្ថិតិ និងមិនគួរប្រើសម្រាប់ការគណនាទេ ការកំណត់តម្លៃនេះក៏អនុវត្តសម្រាប់ទម្ងន់ផលនេសាទមធ្យម និងការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ ផងដែរ។

**ចំនួនដំណើរនេសាទជាមធ្យមប្រចាំខែ**

| ថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍<br>នេសាទ | កំពត | កែប  | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | ថ្នាក់ជាតិ |
|--------------------------------|------|------|--------|-----------|------------|
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ម              | 19.3 | 11.7 | 14.0   | 18.2      | 14.5       |
| ខ្នាតមធ្យម ១៨-២៤ម              | 2.5  | 8.1  | 2.1    | 7.2       | 5.2        |
| ខ្នាតតូច < ៦ម                  |      |      | 22.2   |           | 21.7       |
| ខ្នាតតូច ៦-១២ម                 | 20.7 | 15.6 | 16.3   | 6.4       | 16.9       |
| អូនអូស ៦-១២ម                   | 18.3 | 17.6 | 9.5    | 21.4      | 17.0       |
| អូនអូស ១២-១៨ម                  | 23.5 | 19.1 | 7.9    | 23.7      | 21.2       |
| អូនអូស ១៨-២៤ម                  |      |      | 1.4    | 18.5      | 11.7       |

**ផលនេសាទជាមធ្យមប្រចាំខែ**

| ថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍<br>នេសាទ | កំពត    | កែប     | កោះកុង   | ព្រះសីហនុ | ថ្នាក់ជាតិ |
|--------------------------------|---------|---------|----------|-----------|------------|
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ម              | 5,464.7 | 317.9   | 4,882.2  | 4,173.3   | 3,086.4    |
| ខ្នាតមធ្យម ១៨-២៤ម              | 4,407.9 | 340.6   | 11,533.9 | 5,511.2   | 9,082.3    |
| ខ្នាតតូច < ៦ម                  | -       | -       | 425.3    | -         | 415.7      |
| ខ្នាតតូច ៦-១២ម                 | 898.6   | 294.7   | 2,154.2  | 1,283.5   | 1,324.9    |
| អូនអូស ៦-១២ម                   | 921.2   | 1,025.9 | 3,930.7  | 3,627.6   | 1,787.4    |
| អូនអូស ១២-១៨ម                  | 2,362.2 | 1,540.0 | 19,761.0 | 22,363.3  | 21,609.4   |
| អូនអូស ១៨-២៤ម                  | -       | -       | 7,480.0  | 18,702.6  | 20,292.6   |



**ចំនួនទូកនេសាទសរុប**

| ថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍នេសាទ | កំពត | កែប | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | ថ្នាក់ជាតិ |
|----------------------------|------|-----|--------|-----------|------------|
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ម          | 300  | 304 | 566    | 649       | 1819       |
| ខ្នាតមធ្យម ១៨-២៤ម          | 6    | 0   | 67     | 42        | 115        |
| ខ្នាតតូច < ៦ម              | 4    | 0   | 886    | 34        | 924        |
| ខ្នាតតូច ៦-១២ម             | 406  | 227 | 1538   | 944       | 3115       |
| អ្ននអ្នស ៦-១២ម             | 311  | 63  | 167    | 579       | 1120       |
| អ្ននអ្នស ១២-១៨ម            | 12   | 0   | 112    | 275       | 399        |
| អ្ននអ្នស ១៨-២៤ម            | 0    | 0   | 50     | 0         | 50         |

លេខជិតពណ៌ក្រហមបង្ហាញពីកន្លែង ដែលមិនមានកត់ត្រាទូកនេសាទសម្រាប់ថ្នាក់ទូកនេសាទ និងខេត្ត ប៉ុន្តែមានការរាយការណ៍អំពីការឡើងផលនេសាទ ឬផ្ទុយពីនេះវិញ ដែលមិនមានទិន្នន័យឡើងផលនេសាទ ប៉ុន្តែមានកត់ត្រាទូកនេសាទ ពេលនាំអោយការប៉ាន់ប្រមាណផលនេសាទសរុបទាប

**ទូកនេសាទសកម្មសរុប (%)**

| ថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍នេសាទ | កំពត | កែប | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | ថ្នាក់ជាតិ |
|----------------------------|------|-----|--------|-----------|------------|
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ម          | 300  | 304 | 566    | 649       | 1819       |
| ខ្នាតមធ្យម ១៨-២៤ម          | 6    | 0   | 67     | 42        | 115        |
| ខ្នាតតូច < ៦ម              | 4    | 0   | 886    | 34        | 924        |
| ខ្នាតតូច ៦-១២ម             | 406  | 227 | 1538   | 944       | 3115       |
| អ្ននអ្នស ៦-១២ម             | 311  | 63  | 167    | 579       | 1120       |
| អ្ននអ្នស ១២-១៨ម            | 12   | 0   | 112    | 275       | 399        |
| អ្ននអ្នស ១៨-២៤ម            | 0    | 0   | 50     | 0         | 50         |

សមាមាត្រនៃទូកនេសាទសកម្មគឺផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មានដោយមន្ត្រីខណ្ឌផលផល

**ផលនេសាទសរុបប៉ាន់ប្រមាណប្រចាំខែ (តោន)**

| ថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍នេសាទ | កំពត           | កែប          | កោះកុង         | ព្រះសីហនុ       | សរុបតាមខេត្ត    | ថ្នាក់ជាតិ      |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ម          | 1,393.5        | 82.0         | 2,348.3        | 2,303.6         | 6,127.4         | 4,771.6         |
| ខ្នាតមធ្យម ១៨-២៤ម          | 22.0           | -            | 657.4          | 198.4           | 855.8           | 890.1           |
| ខ្នាតតូច < ៦ម              | -              | -            | 320.2          | -               | 320.2           | 326.3           |
| ខ្នាតតូច ៦-១២ម             | 310.0          | 56.9         | 2,815.6        | 1,029.3         | 4,211.8         | 3,508.4         |
| អ្ននអ្នស ៦-១២ម             | 243.2          | 55.4         | 558.2          | 1,784.8         | 2,641.6         | 1,701.6         |
| អ្ននអ្នស ១២-១៨ម            | 23.6           | -            | 1,877.3        | 5,233.0         | 7,110.3         | 7,325.6         |
| អ្ននអ្នស ១៨-២៤ម            | -              | -            | 321.6          | -               | 321.6           | 872.6           |
| <b>សរុប</b>                | <b>1,992.4</b> | <b>194.3</b> | <b>8,898.7</b> | <b>10,549.2</b> | <b>21,634.6</b> | <b>19,396.2</b> |

**ផលនេសាទសរុបប៉ាន់ប្រមាណប្រចាំឆ្នាំ (តោន)**

| <b>ថ្នាក់ទូកនេសាទ-ឧបករណ៍<br/>នេសាទ</b> | <b>កំពត</b>   | <b>កែប</b>   | <b>កោះកុង</b>  | <b>ព្រះសីហនុ</b> | <b>សរុបតាម<br/>ខេត្ត</b> | <b>ថ្នាក់ជាតិ</b> |
|----------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| ខ្នាតមធ្យម ១២-១៨ម                      | 16,722        | 984          | 28,180         | 27,644           | <b>73,530</b>            | 57,259            |
| ខ្នាតមធ្យម ១៨-២៤ម                      | 264           | -            | 7,889          | 2,381            | <b>10,534</b>            | 10,681            |
| ខ្នាតតូច < ៦ម                          | -             | -            | 3,843          | -                | <b>3,843</b>             | 3,916             |
| ខ្នាតតូច ៦-១២ម                         | 3,720         | 683          | 33,787         | 12,352           | <b>50,542</b>            | 42,101            |
| អ្ននអ្នស ៦-១២ម                         | 2,919         | 665          | 6,698          | 21,417           | <b>31,699</b>            | 20,420            |
| អ្ននអ្នស ១២-១៨ម                        | 283           | -            | 22,528         | 62,796           | <b>85,607</b>            | 87,907            |
| អ្ននអ្នស ១៨-២៤ម                        | -             | -            | 3,860          | -                | <b>3,860</b>             | 10,471            |
| <b>សរុប</b>                            | <b>23,909</b> | <b>2,332</b> | <b>106,784</b> | <b>126,590</b>   | <b>259,615</b>           | <b>232,755</b>    |