

គោលការណ៍ណែនាំសំរាប់ធ្វើ អត្តសញ្ញាណកម្ម និងការគ្រប់គ្រង ជំងឺលើដំណាំបន្លែ



រៀបចំដោយ: កម្មវិធីវិធានការចម្រុះ គ្រប់គ្រងជំងឺ IPM សហការជាមួយអង្គការ FAO

ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៨

Code: 439-02

Date: _____

Donated by: _____

អារម្ភកថា

សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំសំរាប់ធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្ម និងការគ្រប់គ្រងជំងឺសំខាន់ៗ លើដំណាំបន្លែនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះ រៀបចំឡើងដោយកម្មវិធីវិធានការចម្រុះ គ្រប់គ្រងដំណាំ (IPM) នៃនាយកដ្ឋានក្សេត្រសាស្ត្រ និងកែលំអដឹកសិកម្ម ដើម្បីជួយដល់ ប្រជាកសិករ ដែលកំពុងដាំដំណាំបន្លែ គ្រូ IPM និងមន្ត្រីកសិកម្មបានស្វែងយល់បន្ថែមអំពី ជំងឺសំខាន់ៗដែលកើតមាននៅលើដំណាំបន្លែ ការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្ម និងវិធានការផ្សេងៗ ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងកំចាត់ជំងឺទាំងនោះ ។

ដោយយោងតាមបទពិសោធន៍ដែលបានអនុវត្តជាក់ស្តែងក្នុងការដាំដុះដំណាំបន្លែ នៅសាលារៀនចំការកសិករ និងសកម្មភាពក្រោយសាលារៀនចំការកសិករកន្លងមក ក្រុម គ្រូ IPM និងកសិករតែងតែជួបប្រទះនូវបញ្ហាជំងឺជាច្រើនលើដំណាំបន្លែដែលបង្កឡើងដោយ ពពួកផ្សិត បាក់តេរី វីរុស ឬណេម៉ាតូត ។ កសិករភាគច្រើនមិនដឹងច្បាស់លាស់ពីប្រភពនៃជំងឺ ហើយតែងតែប្រើថ្នាំកសិកម្មក្នុងការកំចាត់ជំងឺទាំងនោះ ។ លើសពីនេះទៀត មានកសិករ មួយចំនួនបានប្រើថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតដើម្បីកំចាត់ និងទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺទៀតផង ។ ហេតុដូច្នេះ ទើបកម្មវិធី IPM ដោយមានការឧបត្ថម្ភពិគម្រោង FAO-IPM បានរៀប ចំចងក្រងសៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំនេះ សំរាប់ជាជំនួយក្នុងការសម្របសម្រួល និងដោះ ស្រាយបញ្ហាជំងឺលើដំណាំបន្លែនៅតាមសាលារៀនចំការកសិករ ក៏ដូចជានៅតាមតំបន់ដាំដុះ បន្លែផ្សេងៗទៀត ។

សៀវភៅនេះរៀបចំឡើងតាមរយៈការប្រមូលផ្តុំនូវបទពិសោធន៍ល្អៗ និងរបបគំហើញ ថ្មីៗ របស់ក្រុមគ្រូ IPM ទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស ។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា សៀវភៅនេះនឹងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ល្អៗ ដល់អ្នកបច្ចេកទេស កសិកម្ម គ្រូ IPM ស្រុក កសិករគ្រូ IPM និងកសិករ ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងគ្រប់គ្រង ផលិតកម្មដំណាំបន្លែអោយកាន់តែទទួលបានជោគជ័យថែមទៀត ។

យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍នូវរាល់ការចូលរួមមតិយោបល់កែលំអផ្សេងៗ ពីអស់លោកលោក ស្រីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ ដើម្បីជួយកែសម្រួលសៀវភៅនេះកាន់តែមានប្រយោជន៍ថែម ទៀត ។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការ FAO-IPM លើដំណាំបន្លែ ដែលបានជួយ ឧបត្ថម្ភសំរាប់ការរៀបចំ និងបោះពុម្ពសៀវភៅនេះ ។

អ្នករៀបរៀង:

លោក ឆិន ឆាយ	អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
លោក ជូ ជ័យធីរិទ្ធ	ប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោង FAO-IPM លើដំណាំបន្លែ
លោកស្រី ស្រ៊ុន ខេម៉ា	ជំនួយការប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោង FAO-IPM លើ ដំណាំបន្លែ
លោក ឈិត ម៉ាក	មន្ត្រីបច្ចេកទេស គម្រោង FAO-IPM លើដំណាំបន្លែ
លោកស្រី ជា លីរ៉ា	មន្ត្រីវដ្តបាល គម្រោង FAO-IPM លើដំណាំបន្លែ
លោក វ៉ែន រតនា	គណនេយ្យករ គម្រោង FAO-IPM លើដំណាំបន្លែ

	ទំព័រ
អត្តសញ្ញាណកម្ម និងការគ្រប់គ្រងជម្ងឺផ្សិត.....	១
I- ជម្ងឺផ្សិតលើដំណាំត្រសក់	៣
១- ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង ដោយផ្សិត (Downy Mildew)	៥
២- ជម្ងឺអុចមូលលើស្លឹក ដើម ផ្លែ ដោយផ្សិត (Anthracnose)	៦
៣- ជម្ងឺម្សៅលើស្លឹក ដោយផ្សិត (Powdery Mildew)	៧
៤- ជម្ងឺអុចស្លឹក ដោយផ្សិត (Alternia Leaf Spot)	៨
៥- ជម្ងឺអុចរទុះស្លឹក ដោយផ្សិត (Corynespora Leaf Spot)	៩
៦- ជម្ងឺស្លាកដើម ស្លឹក ដោយផ្សិត (Gummy Stem Blight).....	១០
៧- ជម្ងឺស្រពោនលឿងស្លឹក ដោយផ្សិត (Fusarium Wilt)	១២
៨- ជំងឺរលួយផ្លែ ដោយផ្សិត (Fruit Rots)	១៣
II- ជម្ងឺផ្សិតលើដំណាំស្ពៃ.....	២១
១- ជម្ងឺត្រម៉ាំងឫស ដោយផ្សិត (Clubroot)	២៣
២- ជម្ងឺស្រពោនលឿងស្លឹក ដោយផ្សិត (Fusarium Yellows)	២៤
៣- ជម្ងឺអុចស្លឹក ដោយផ្សិត (Alternaria Leaf Spot)	២៥
៤- ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង ដោយផ្សិត (Downy Mildew)	២៦
៥- ជំងឺឆេះក្តោប ដោយផ្សិត (White Mold or Watery Soft Rot)	២៧
៦- ជម្ងឺអុចរង្វង់ស ដោយផ្សិត (White Spot)	២៨
៧- ជម្ងឺរសុកតូនីញ៉ា ដោយផ្សិត (Rhizoctonia Diseases)	២៩
III- ជម្ងឺផ្សិតលើដំណាំប៉េងប៉ោះ.....	៣៧
១- ជម្ងឺឆេះស្លឹក ផ្លែ ដោយផ្សិត (Late Blight)	៣៩
២- ជម្ងឺខ្លោចគូទផ្លែ ដោយផ្សិត (Buckeye Rot)	៤០
៣- ជម្ងឺស្រពោនលឿងស្លឹក ដោយផ្សិត (Fusarium Wilt)	៤១

៤-ជម្ងឺខ្នុរស្លឹក ដោយផ្សិត (Leaf Mold)	៤២
៥-ជម្ងឺផ្សិតស្លឹក ដោយផ្សិត (Black Leaf Mold)	៤៣
៦-ជម្ងឺដំបៅកង ដោយផ្សិត (Early Blight)	៤៣
៧-ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌ប្រផេះ ដោយផ្សិត (Gray Leaf Spot)	៤៤
៨-ជម្ងឺរលួយដើម ដោយផ្សិត (Stem Rot or Southern Blight)	៤៥
៩-ជម្ងឺម្សៅលើស្លឹក ដោយផ្សិត (Powdery Mildew)	៤៦
អត្តសញ្ញាណកម្មនិងការគ្រប់គ្រងនៃជម្ងឺបាក់តេរី.....	៥៥
១- តើអ្វីជាជម្ងឺបាក់តេរី ?	៥៧
២- ជម្ងឺបាក់តេរីនេះស្លឹក	៥៩
៣- ជម្ងឺបាក់តេរីស្រពោនស្រស់	៦០
ភ្នាក់ងារចំលង និងវិធានការគ្រប់គ្រងជម្ងឺវីរុស.....	៦៧
ជម្ងឺរូញលឿងស្លឹក (ព័ត៌មានលំអិតពីវដ្តជីវិត វិធានការគ្រប់គ្រង និងរោគសញ្ញាជម្ងឺ)	៧២
ខ្លឹមសារ និងគោលការណ៍នៃបរិស្ថានជម្ងឺ និងវិធានការគ្រប់គ្រង.....	៨១
ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺផ្សិត (រូបទី ១)	៨៣
ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺបាក់តេរី (រូបទី ២)	៨៣
ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺវីរុស (រូបទី ៣)	៨៤
ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺណេមាតូត (រូបទី ៤. ៥. ៦)	៨៤

អង្គសញ្ញាណកម្ម និងការគ្រប់គ្រងជម្ងឺឆ្លង

I - ជម្ងឺផ្សិតលើដំណាំត្រសក់

- | | |
|---|-----------------------|
| ១~ ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង ដោយផ្សិត | Downy Mildew |
| ២~ ជម្ងឺអុចមូលលើស្លឹក ដើម ផ្លែ ដោយផ្សិត | Anthracnose |
| ៣~ ជម្ងឺមេរ្យាលើស្លឹក ដោយផ្សិត | Powdery Mildew |
| ៤~ ជម្ងឺអុចស្លឹក ដោយផ្សិត | Alternaria Leaf Spot |
| ៥~ ជម្ងឺអុចទុះស្លឹក ដោយផ្សិត | Corynespora Leaf Spot |
| ៦~ ជម្ងឺស្លោកដើម ស្លឹក ដោយផ្សិត | Gummy Stem Blight |
| ៧~ ជម្ងឺស្រពោនលឿងស្លឹក ដោយផ្សិត | Fusarium Wilt |
| ៨~ ជម្ងឺរលួយផ្លែ ដោយផ្សិត | Fruit Rots |

១-ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង ដោយផ្សិត (Downy Mildew)

គ្រាករាបង្កជម្ងឺ: ផ្សិត *Pseudoperonospora cubensis* (រូបទី ១. ២. ៣. ៤)

ការពិពណ៌នា:

- ផ្សិត sporangiophores ដុះចេញពីស្លឹកមាតា (stomata) ដែលមានរាងដូចស៊ីត និងប្រព័ន្ធពណ៌ប្រផេះ ទៅជាពណ៌ស្វាយ
- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺនេះមានច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នា តែជាទូទៅមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នា

ការឆ្លងរាលដាល: ជម្ងឺនេះឆ្លងរាលដាលពាសពេញពីភពលោក ហើយឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៅតំបន់ត្រូពិក

លក្ខខណ្ឌនៃការរាលដាលរបស់ជម្ងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺឆ្លងតាមរយៈមនុស្ស ឬពួកប៉ារ៉ាស៊ីត
- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺសល់នៅក្នុងកាកសំណល់រុក្ខជាតិ ដំណាំដុះម្តងឬម្តងដំណាំត្រសក់ដែលដុះក្នុងព្រៃ
- ផ្សិត Sporangia បាចសាចពាសវាលពាសកាលតាមរយៈខ្យល់និងទឹកភ្លៀង
- សំណើមខ្ពស់ដែលបណ្តាលមកពីទឹកសន្សើម អំពូ ឬភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជម្ងឺកាន់តែលូតលាស់ខ្លាំង
- ជម្ងឺអាចកើតមាននិងសាយភាយខ្លាំងក្លា អាស្រ័យទៅលើសីតុណ្ហភាព ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញានៃជម្ងឺ:

- ជម្ងឺកើតឡើងច្រើននៅលើដំណាំត្រសក់ និងមីឡុង ប៉ុន្តែពួកដំណាំត្រសក់កើតខ្លាំងក្លាជាង
- រោគសញ្ញាដំបូងយើងសង្កេតឃើញមានស្នាមអុចៗពណ៌លឿង ដែលមានរាងជាមុំកែងរួចប្រែជាពណ៌ត្នោត
- ស្ព័ររូឡេស៊ីន (Sporulation) យើងអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ដោយភ្នែកទទេនៅលើផ្ទៃស្លឹក
- ផ្សិតស្ព័ររែងហ្គីយ៉ូហ្វ័រ (Sporangiophores) លេចចេញពីស្លឹកមាតា (stomata)
- ផ្សិតស្ព័ររែងហ្គី (Sporangia) មានពណ៌ក្រមៅ ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ប្រើប្រាស់ពូជធន់ទៅតាមប្រភេទនៃភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ
- ត្រូវដឹងពីប្រភេទភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់
- ដាំដំណាំអោយរង្វិល
- ធ្វើសវាងការស្រោចទឹកពីលើខ្លាំង ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពសើមរបស់ស្លឹក
- បាញ់ថ្នាំផ្សិតក្នុងករណីចាំបាច់

២. ជម្ងឺអុចមូលលើស្លឹក ដើម ផ្លែ ដោយផ្សិត (Anthracnose)

គ្មានការបង្កជម្ងឺ: *Colletotrichum lagenarium* (រូបទី ៥. ៦. ៧. ៨)

ការពិពណ៌នា:

- មានរាងជាស៊ីឡាំង, non-septate ជាផ្សិតហែយាលីនកូនីខៀវ hyaline conidia ផ្សិតកូនីខៀវ conidia បង្កើតនៅក្នុង acervuli ជាមួយ setae
- ផ្សិតចំនួនបីប្រភេទត្រូវបានគេកត់សំគាល់

ការឆ្លងរាលដាល: ពាសពេញពិភពលោក

លក្ខខណ្ឌនៃការរាលដាលរបស់ជម្ងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺស្ថិតនៅយូរក្នុងកំទេចកំទីកាកសំណល់រុក្ខជាតិ អាចជាជម្ងឺគ្រាប់ពូជ និងអាចឆ្លងពីចំការ ដាំដំណាំត្រសក់ជិតខាងដំណាំត្រសក់ដុះម្ខាង ឬ អំបូរដំណាំត្រសក់ដែលដុះក្នុងព្រៃ
- ផ្សិតកូនីខៀវ (Conidial) រាលដាលដោយសារការបាចសាច់ទឹក និងទឹកភ្លៀងដែលមានខ្យល់បោកបក់ខ្លាំង
- ភ្លៀងមានរយៈពេលយូរ និងសីតុណ្ហភាពក្ដៅខ្លាំង ។

សញ្ញានិងរោគសញ្ញានៃជម្ងឺ:

- ជម្ងឺនេះភាគច្រើនកើតនៅលើដំណាំឪឡឹក ត្រសក់និងមីឡុង ប៉ុន្តែពួកដំណាំត្រសក់ កើតខ្លាំងក្លាជាង
- ស្នាមដំបៅនៅលើស្លឹកត្រសក់និងមីឡុងមានពណ៌ត្នោត និងមានរាងជារង្វង់ ដែល មានអង្កត់ផ្ចិតប្រវែងប្រមាណ ១ សម ចំណែកស្នាមដំបៅនៅលើដំណាំ ឪឡឹកមាន ទំហំតូច និងមានពណ៌ខ្មៅ
- ស្នាមដំបៅនៅលើមែក និងទងស្លឹកមានរាងមូលទ្រវែង និងខ្វង
- ស្នាមដំបៅនៅលើផ្លែ កើតឡើងនៅដំណាក់កាលទុំ ផ្លែអុចមានស្នាមជាំទឹក ហើយ ប្រែទៅជាដំបៅរាង ជារង្វង់ និងខ្វង ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ការប្រើប្រាស់ពូជធន់: អាចមានពូជធន់លើដំណាំត្រសក់ និងដំណាំឪឡឹក និងគ្មាន ពូជធន់លើដំណាំមីឡុង
- ការសំអាតគ្រាប់ពូជ
- ការដាំដំណាំឆ្លាស់ ដោយមិនដាំដំណាំអំបូរត្រសក់ដដែលៗ
- ការកូរដីអោយបានជ្រៅ និង ការបាញ់ថ្នាំផ្សិតកំចាត់ជំងឺផ្សិត

៣-ជម្ងឺមេរុវលើស្លឹក ដោយផ្សិត (Powdery Mildew)

ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ: *Erysiphe cichoracearum* & *Sphaerotheca fuligena* (រូបទី ៩. ១០.១១)

ការពិពណ៌នា: ផ្សិតស៊ីលីនដ្រិក (cylindrical) ផ្សិតហែយាលីនកូនីខៀវ (hyaline conidia) បានបង្កើតជាច្រវាក់ស្ត័រកូនីយ៉ូហ្វ័រ (conidiophores) នៅផ្នែកខាងលើ និងខាង ក្រោមផ្ទៃស្លឹក ។

ការឆ្លងរាលដាល: ពាសពេញពិភពលោក

លក្ខខណ្ឌនៃការរាលដាលរបស់ជម្ងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្ក គឺជាពពួកប៉ារ៉ាស៊ីត ដែលអាចរស់នៅក្នុងកាកសំណល់រុក្ខជាតិ និងដំណាំអំបូរត្រសក់ដែល ដុះក្នុងព្រៃបានពេញមួយឆ្នាំ នៅតំបន់ត្រូពិក
- ផ្សិតកូនីខៀវ Conidia រាលដាលដោយសារខ្យល់

- កំដៅខ្លាំង និងការស្រោចស្រពលើសលុប អាចធ្វើអោយស្លឹកដុះលូតលាស់ និងរាលដាលខ្លាំងកំដៅខ្លាំង និង ទឹកសន្សើមច្រើនបង្កឱ្យមានជម្ងឺកើតឡើង ក្នុងករណីគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញានៃជម្ងឺ:

- ដំណាំអំបូរត្រសក់តែងតែជួបប្រទះនឹងជម្ងឺនេះ ប៉ុន្តែដំណាំឪឡឹកជួបប្រទះតិចតួច
- អុចពណ៌លឿងលេចឡើងនៅលើស្លឹក និងមែក បន្ទាប់មកក្លាយជាពណ៌សម្បែររបស់ conidia រាលដាល ពាសពេញលើស្លឹកមានស្នាមអុចពណ៌ស
- ដំបៅរាលដាលគ្របពេញផ្ទៃស្លឹកខាងលើ
- ជម្ងឺរាលដាលខ្លាំងបណ្តាលអោយស្លឹកស្ងួត ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ការប្រើប្រាស់ពូជធន់ទ្រាំ:
 - o ប្រភេទពូជត្រសក់ និងមីឡុងមួយចំនួន យើងអាចរកបាន ប៉ុន្តែជម្ងឺនៅតែកើតមានឡើង
 - o ប្រភេទពូជត្រសក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលធន់ទ្រាំបាននឹងជម្ងឺនេះ
- បាញ់ថ្នាំផ្សិតកំចាត់ជម្ងឺផ្សិតក្នុងករណីចាំបាច់

៤. ជម្ងឺអុចស្លឹក ដោយផ្សិត (Alternaria Leaf Spot)

ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ: *Alternaria cucumerina* (រូបទី ១២.១៣.១៤)

ការពិពណ៌នា:

- Conidia មានពណ៌ខ្មៅនិងមានរាងទ្រវែងដូចចំពុះសត្វ
- Conidia បង្កើតបានជាច្រវាក់មួយខ្សែ និងជួនកាលបង្កើតជាច្រវាក់ពីរខ្សែ

ការឆ្លងរាលដាល: មានការឆ្លងរាលដាលនៅពាសពេញពិភពលោក

លក្ខខណ្ឌនៃការរាលដាលរបស់ជម្ងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺរស់នៅក្នុងកាកសំណល់រុក្ខជាតិ ស្មៅ និងនៅលើអំបូរដំណាំត្រសក់ផ្សេងទៀត
- ផ្សិតកូនីខៀវ Conidia រាលដាលដោយសារខ្យល់
- ជម្ងឺកើតឡើងច្រើននៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានសំណើមខ្ពស់

- ស្លឹកដំណាំសើមយូរបណ្តាលអោយស្តួរលូតលាស់ និងរាលដាលខ្លាំង ទោះបីជាអ័ព្ទ និងភ្លៀងច្រើន ក៏ជាលក្ខខណ្ឌសមស្របសំរាប់ការរាលដាលជម្ងឺផងដែរ ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញានៃជម្ងឺ:

- ជម្ងឺកើតច្រើនលើដំណាំមីឡុង និងអំបូរដំណាំត្រសក់
- ស្នាមដំបៅជាំខ្មៅ និងមានរាងជារង្វង់ ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតប្រវែង ៣- ៤ ស.ម ហើយស្លឹក មានពណ៌ លឿងចំពោះដំណាំមីឡុង ចំណែកដំណាំឪឡឹកវិញមាន ស្នាមដំបៅពណ៌ខ្មៅតូចៗ
- ស្នាមដំបៅរាលចូលគ្នា និងបណ្តាលឱ្យស្លឹកជ្រុះ
- ស្នាមដំបៅនៅលើផ្លែមីឡុងមានពណ៌ត្នោត និងខ្វង ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ដាំដំណាំឆ្លាស់រយៈពេលមួយឆ្នាំ ដោយគ្មានដាំដំណាំអំបូរត្រសក់
- ពូជធន់ទ្រាំនឹងជម្ងឺនេះមិនងាយនឹងរកបាន ប៉ុន្តែមានពូជមួយចំនួនអាចធន់ទ្រាំបាន
- កាត់បន្ថយសំណើមនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់
- ចាំបាច់ត្រូវបាញ់ថ្នាំកំចាត់ផ្សិតក្នុងកំឡុងពេលដែលជម្ងឺកកើតឡើងច្រើន ។

៥-ជំងឺអុបរទុះស្លឹក ដោយផ្សិត (Corynespora Leaf Spot)

ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ: *Corynespora cassiicola* (រូបទី ១៥. ១៦. ១៧)

ការពិពណ៌នា:

- ផ្សិត conidia ផ្លាស់ប្តូរទ្រង់ទ្រាយ និងបង្កើតបានជាសរសៃហែយណ្ឌីនជាច្រើន បន្ទាប់មកសរសៃនេះ ប្រែជាពណ៌ត្នោតខ្មៅ ។
- ផ្សិត conidia បង្កើតស្តួរជាថ្នាក់ៗ និងមានផ្សិតកូនីឌីយូហ្គីរពណ៌ខ្មៅ conidiophores

ការឆ្លងរាលដាល: ឆ្លងរាលដាលនៅតំបន់ត្រូពិច

លក្ខខណ្ឌនៃការរាលដាលរបស់ជម្ងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺមានចំនួនច្រើន រស់នៅក្នុងកាកសំណល់រុក្ខជាតិ ស្មៅ និងដំណាំផ្សេងៗទៀត
- ផ្សិតកូនីឌី (Conidia) អាចឆ្លងរាលដាលដោយសារខ្យល់ និងទឹកភ្លៀង

- ភ្លៀង និងសីតុណ្ហភាពក្ដៅល្មម ជាលក្ខខណ្ឌសមស្របដល់ការរាលដាលជំងឺបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅចំការ ។
- កំដៅខ្ពស់ជំងឺអាចរាលដាលបានយ៉ាងលឿននៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជំងឺ:

- ជំងឺនេះបានបង្កអោយខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះដំណាំត្រសក់ និងមីឡុង
- ស្នាមដំបៅដំបូងដូចជាដំណាក់ទឹកតូចៗ ហើយរាលដាលធំទៅៗ
- ស្នាមដំបៅមានរាងជារង្វង់ មានពណ៌ទង់ដែង និងជួនកាលជាចំណុចៗ
- ជាធម្មតា ដំបៅលើស្លឹកមានពណ៌ដូចត្រសក់ត្រាំ មានទំហំធំជាងចំណិតត្រសក់
- នៅពេលដែលដំបៅរីករាលដាលកាន់តែធំស្លឹកទាំងមូលប្រែជាពណ៌លឿងហើយងាប់ ។
- ផ្លែមិនមានខូចខាតដោយសារជំងឺនេះទេ

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- មានពូជធន់ទ្រាំអាចទប់ស្កាត់ជំងឺនេះ
- សំអាតកំទេចកំទីរបស់ដំណាំចាស់ៗ និងសំអាតកាកសំណល់ក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ព្រមទាំងកាត់បន្ថយសំណើម ។
- បាញ់ថ្នាំសំលាប់ផ្សិត ។

៦. ជំងឺស្លោកដើម ស្លឹក ដោយផ្សិត (Gummy Stem Blight)

គ្រាករមេជំងឺ: *Didymella bryoniae* (រូបទី ១៨. ១៩. ២០. ២១)

ការពិពណ៌នា:

- ផ្សិតកូនីឡេ Conidia ជួនកាលគ្មានច្រវាក់ និងជួនកាលទៀតមានច្រវាក់តែមួយគត់ ដែលបង្កើតឡើង នៅក្នុងផ្សិតភីនីឡេ (pycnidia) ។
- ផ្សិតអាស់កូស្ទ័រ (ascospores) មានច្រវាក់តែមួយគត់បង្កើតឡើងនៅក្នុងផ្សិតពែរីធីស៊ីយ៉ា (perithecia)

ការឆ្លងរាលដាល: ពាសពេញពិភពលោក ប៉ុន្តែកើតច្រើននៅតំបន់ត្រូពិច

លក្ខខណ្ឌនៃការលូតលាស់របស់ជម្ងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺរស់យ៉ាងយូរនៅក្នុងកំទេចកំទីដំណាំត្រសក់និងស្មៅ និងអាចឆ្លងជម្ងឺតាមគ្រាប់ពូជ ។
- ផ្សិត Conidia រាលដាលបានសាចដោយសារភ្លៀង និងខ្យល់បោកបក់
- ការធ្លាក់ភ្លៀងជាប់ៗគ្នា និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ងាយស្រួលដល់ការរាលដាលរបស់ជម្ងឺ
- កន្លែងដែលរបួសដោយសារការផ្សាំមែក ការប្រមូលផល ឬដោយសារសត្វល្អិត គឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ ដែលភ្នាក់ងារបង្ករោគជ្រៀតចូលក្នុងដើម ។
- ជម្ងឺកើតឡើងទាំងនៅទីវាល និងក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញានៃជម្ងឺ:

- ស្លឹក ទង និងផ្លែ គឺជាកន្លែងងាយទទួលរងពីជម្ងឺនេះ ចំពោះដំណាំត្រសក់ មីឡុង និងឌីឡឹក ។
- ភ្នាក់ងារបង្ករោគ ដែលកើតឡើងនៅលើស្លឹកកូទីឡេដុងអាចបណ្តាលអោយកូនដំណាំឆាប់ងាប់ ។
- ដំបៅនៅលើស្លឹកមានរាងជារង្វង់ ហើយមានពណ៌ទង់ដែង បន្ទាប់មកប្រែជាពណ៌ខ្មៅ ភាគច្រើននៅលើ ផ្លែមានពណ៌ខ្មៅ ។
- ដំបៅនៅលើទងចាប់ផ្តើមដំបូងដូចជាដំណាក់កាលទឹករាងទ្រវែង ដែលដំណាក់កាលនោះដូចជាជ័រឈើម្យ៉ាង ក្រោយមកវាស្ងួតហើយរលើកចេញ ។
- រោគសញ្ញានៅលើផ្លែមានភាពខុសប្លែកគ្នាទៅតាមប្រភេទដំណាំ ប៉ុន្តែជាទូទៅស្តុមាតាពណ៌ខ្មៅលូតលាស់បង្កើតជាភិនឡេវ (pycnidia) និងពេរីធីស៊ីយ៉ា (perithecia) ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ត្រូវសំអាតភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺក្នុងគ្រាប់ពូជ និងដាំដំណាំឆ្លាស់ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំម្តង ។
- ប្រភេទពូជធន់ទ្រាំនឹងជម្ងឺនេះ ពុំអាចរកបានដោយងាយស្រួលទេ
- ផ្ទះកញ្ចក់ត្រូវធ្វើឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អដើម្បីកាត់បន្ថយភាពសើមខ្លាំងនៅលើស្លឹក ឱ្យបានជាអប្បបរមា ។
- បាញ់ថ្នាំសំលាប់ផ្សិតក្នុងករណីចាំបាច់ ។

៧. ជម្ងឺស្រពោនលើខ្លឹមស្លឹក ដោយផ្សិត (Fusarium Wilt)

គ្លាក់ងារបង្កជម្ងឺ: (រូបទី ២២. ២៣. ២៤)

- *Fusarium oxysporum* f.sp. *cucumerinum* on cucumber
- *Fusarium oxysporum* f.sp. *melonis* on cantaloupe
- *Fusarium oxysporum* f.sp. *niveum* on watermelon

ការពិពណ៌នា: macro & micro conidia and thick-walled chlamydospores

ការឆ្លងរាលដាល: ពាសពេញពិភពលោក

លក្ខខណ្ឌនៃការរាលដាលរបស់ជម្ងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្ករោគអាចរស់នៅក្នុងដីបានច្រើនឆ្នាំ
- ការឆ្លងរាលដាលពីចំការមួយទៅចំការមួយទៀតតាមរយៈឧបករណ៍កសិកម្ម កំទេចកំទី និងតាមការស្រោចស្រព
- ការរាលដាលជម្ងឺនេះ គឺអាស្រ័យទៅលើសីតុណ្ហភាព និងសំណើមដីខ្ពស់

សញ្ញា និងរោគសញ្ញានៃជម្ងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺនីមួយៗបង្កជម្ងឺលើប្រភេទដំណាំមួយជាក់លាក់
- ដំណាំអាចទទួលរងជម្ងឺនេះ នៅគ្រប់ដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំ
- កូនដំណាំងាប់ ឬក្រិន
- ដំណាំចាស់ៗចាប់ផ្តើមលឿង ហើយស្រពោននៅពេលថ្ងៃត្រង់ រហូតបានពីរ ឬបីថ្ងៃ បន្ទាប់មកស្រពោន និងងាប់។ រោគសញ្ញាដំបូងកើតឡើង នៅលើដំណាំមួយ ឬពីរ ដើមប៉ុណ្ណោះ ។
- សរសៃរុក្ខជាតិរបស់រុក្ខជាតិបានប្រែពណ៌ទៅជាលឿង ឬត្នោត ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ប្រើប្រាស់ពូជធន់នឹងជម្ងឺ ក្នុងករណីអាចរកបាន
- ចៀសវាងដាំដំណាំនៅចំការដែលមានកើតជម្ងឺនេះ
- ដាំដំណាំឆ្លាស់ជាមួយស្រូវ ពន្លឺចំណីដើម្បីកាត់បន្ថយការរស់នៅរបស់មេរោគ
- ផ្សាំលើដំណាំដែលមានភាពធន់ទ្រាំ
- ប្រភេទពូជធន់ទ្រាំនឹងជម្ងឺនេះ មិនងាយនឹងរកបានឡើយ ។

៨. ជំងឺរលួយផ្លែ ដោយផ្សិត (Fruit Rots)

គ្មានការបង្កជំងឺ: (រូប ២៥. ២៦. ២៧. ២៨. ២៩) Choanephora cucurbitarum, Pythium spp., Rhizoctonia solani

ការពិពណ៌នា:

- ផ្សិតកូនីហ្វូរ៉ា បានបង្កើតជាស្ព័ររងហ្គី ដោយនៅផ្នែកខាងចុងមានបែកមែកដោយលេចចេញជាអាងមូលមានពណ៌ត្នោត និងពណ៌ស្វាយ ។
- ផ្សិតភីស្យូម Pythium ជាទូទៅបានកាត់ផ្តាច់នូវច្រវាក់សរសៃផ្សិតមីសេលូមពណ៌ស នៅលើផ្លែ និងបង្កើត ជាស្ព័ររងហ្គី (Sporangia) និងអ៊ូសស្ព័រ oospores
- ផ្សិតរីសូកតូនីញ៉ា Rhizoctonia បង្កើតជាទំរង់សរសៃមីសេលូម នៅខ្លែងខាងស្តាំជាកង់ៗ ។

ការឆ្លងរាលដាល: ពាសពេញពិភពលោក

លក្ខខណ្ឌនៃការរាលដាលរបស់ជំងឺ:

- ផ្សិតកូនីហ្វូរ៉ាច្រើនកើតឡើងលើដំណាំពពួកឱឡឹក និងរាលដាលខ្លាំងកំឡុងពេលភ្លៀង និងសំណើមខ្ពស់ ។ ស្ព័របស់ផ្សិតឆ្លងតាមរយៈសត្វល្អិត ខ្យល់ និងការបាចសាច់ទឹក
- ជំងឺរលួយផ្លែដូចកប្បាសច្រើនកើតឡើងលើដំណាំអំបូរត្រសក់ រោគសញ្ញាដំបូងលើផ្លែដែលប៉ះដីនិងរាលដាលខ្លាំងក្នុងលក្ខខណ្ឌដីមានសំណើមខ្ពស់
- ជំងឺរលួយផ្លែប៉ោងកើតលើដំណាំត្រសក់ និងរាលដាលលើផ្លែដែលប៉ះដី ។ សំណើមដីខ្ពស់អាចធ្វើអោយជំងឺរាលដាល ប៉ុន្តែមិនរាលដាលខ្លាំងក្លាទេ ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញានៃជំងឺ:

- រោគសញ្ញាដំបូងរលួយនៅផ្នែកខាងចុង និងរាលដាលដល់ផ្លែទាំងមូលដែលបណ្តាលមកពីរលួយសើមលេចចេញផ្សិតរាងដូចមូលមានអុចពណ៌ខ្មៅ នៅផ្នែកកោសិកា រុក្ខជាតិដែលខូចខាត ។
- ជំងឺរលួយផ្លែដូចកប្បាស គឺបណ្តាលមកពីមានស្នាមរលួយសើមរាលដាលទៅផ្លែយ៉ាងរហ័ស និងគ្របដោយសរសៃមីសេលូមពណ៌សទន់ៗលូតលាស់នៅពេលអាកាសធាតុសើមខ្លាំង ជំងឺរលួយផ្លែប៉ោង ដែលបណ្តាលមកពីស្នាមដំបៅលើផ្លែដែលប៉ះដី ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- អនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងដំណាំដែលអាចកាត់បន្ថយសំណើមក្នុងដី ការខូចខាតផ្លែ និងការការពារផ្លែដែលប៉ះ ដី។ ឧទាហរណ៍: វិធានការគ្របបង្ហូរស្ទឹងខ្មៅ ឬការដោតចំណារអាចកាត់បន្ថយការរាលដាលជម្ងឺ ។
- ការបាញ់ថ្នាំផ្សិតការពារមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេ ប៉ុន្តែអាចទប់ស្កាត់ការរាលដាលជម្ងឺបានមួយចំនួន ។



ត្រសក់

១- ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង ដោយផ្សិត




មីឡូង

២- ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង ដោយផ្សិត



ត្រសក់

៣- ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង ដោយផ្សិត




មីឡូង

៤- ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង ដោយផ្សិត



មីឡូង

៥- ជម្ងឺអុចមូលលើស្លឹក ដើម ផ្លែ ដោយផ្សិត




ឱឡឹក

៦- ជម្ងឺអុចមូលលើស្លឹក ដើម ផ្លែ ដោយផ្សិត




៧- ជម្ងឺអុចមូលលើស្លឹក ដើម ផ្លែដោយផ្សិត




៨- ជម្ងឺអុចមូលលើស្លឹក ដើម ផ្លែដោយផ្សិត



៩- ជម្ងឺមេរ្យាលើស្លឹក ដោយផ្សិត




១០- ជម្ងឺមេរ្យាលើស្លឹក ដោយផ្សិត



១១- ជម្ងឺមេរ្យាលើស្លឹក ដោយផ្សិត




១២- ជម្ងឺអុចស្លឹក ដោយផ្សិត




១៣. ជំងឺអុចស្លឹក ដោយផ្សិត



១៤. ជំងឺអុចស្លឹក ដោយផ្សិត



១៥. ជំងឺអុចរន្ទះស្លឹក ដោយផ្សិត



១៦. ជំងឺអុចរន្ទះស្លឹក ដោយផ្សិត



១៧. ជំងឺអុចរន្ទះស្លឹក ដោយផ្សិត



១៨. ជំងឺស្លាកដើម ស្លឹក ដោយផ្សិត



ថ្មីឡើង

១៩. ជម្ងឺស្លាកដើម ស្លឹក ដោយផ្សិត



ត្រសក់

២០. ជម្ងឺស្លាកដើម ស្លឹក ដោយផ្សិត




ត្រសក់

២១. ជម្ងឺស្លាកដើម ស្លឹក ដោយផ្សិត



ថ្មីឡើង

២២. ជម្ងឺស្លាកដើម ស្លឹក ដោយផ្សិត



ថ្មីឡើង

២៣. ជម្ងឺស្លាកដើម ស្លឹក ដោយផ្សិត



ត្រសក់

២៤. ជម្ងឺស្លាកដើម ស្លឹក ដោយផ្សិត



ត្រីសក់

២៥~ ជំងឺរលួយផ្លែ ដោយផ្សិត



២៦~ ជំងឺរលួយផ្លែ ដោយផ្សិត



ត្រីសក់

២៧~ ជំងឺរលួយផ្លែ ដោយផ្សិត



ឆ្មៅ

២៨~ ជំងឺរលួយផ្លែ ដោយផ្សិត



ឆ្មៅ

២៩~ ជំងឺរលួយផ្លែ ដោយផ្សិត

II-ជម្ងឺផ្សិតលើដំណាំស្ពៃ

១~ ជម្ងឺត្រចៀកម្លូង ដោយផ្សិត	Clubroot
២~ ជម្ងឺស្រពោនលើខ្លឹមស្លឹក ដោយផ្សិត	Fusarium Yellows
៣~ ជម្ងឺអុចស្លឹក ដោយផ្សិត	Alternaria Leaf Spot
៤~ ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង ដោយផ្សិត	Downy Mildew
៥~ ជម្ងឺឆេះក្តោប ដោយផ្សិត	White Mold
៦~ ជម្ងឺអុចរង្វង់ស ដោយផ្សិត	White Spot
៧~ ជម្ងឺរសុត្យនីញ្ញាវី ដោយផ្សិត	Rhizoctonia Diseases

១. ជម្ងឺត្រមេរោងឫស ដោយផ្សិត (Clubroot)

ភ្នាក់ងារបង្ក: ផ្សិតឈ្មោះប្លាស្មូឌីយ៉ូហ្វរ៉ា ប្រាស៊ីកា *Plasmodiophora brassicae* (រូបទី ១. ២)

ការពិពណ៌នា: Intracellular plasmodium បង្កើតគីស zoosporangia និង zoospores (បច្ចុប្បន្នត្រូវបាន គេ ចាត់ថ្នាក់ជាប្រូតូសូអា) ។

ការឆ្លងរាលដាល: ពាសពេញពិភពលោក ប៉ុន្តែបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់ដែលមានសីតុណ្ហភាព ក្តៅ និង តំបន់ខ្ពង់រាបត្រូពិច ។

លក្ខខណ្ឌរាលដាលរបស់ជម្ងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ អាចរស់នៅជាប៉ារ៉ាស៊ីត ហើយស្តីរបស់វាអាចរស់នៅក្នុងដីបានរយៈពេល ១០ឆ្នាំ និង អាចរស់នៅក្នុងអំបូរស្មៅគ្រុយស៊ីហ្គ័រ
- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺឆ្លងរាលដាលតាមរយៈឧបករណ៍កសិកម្ម ការហូរច្រោះ និងការស្ទូងកូនដែលកើតជម្ងឺ
- លក្ខខណ្ឌសមស្របរបស់ជម្ងឺរាលដាលខ្លាំងលើដីអាស៊ីត និងសំណើមដីចាប់ពី២០-២៥ អង្សាសេ ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជម្ងឺ:

- អំបូរដំណាំស្ពៃដែលងាយទទួលរងជម្ងឺនេះធ្ងន់ធ្ងររួមមាន ស្ពៃក្តោប ស្ពៃជើងទា និងស្ពៃមើម
- ការរីកចម្រើននៃឫសកែវ ឬសរយាង និងសរសៃឆ្មាៗរបស់ឫសរុក្ខជាតិ អាចបណ្តាលឱ្យប្រព័ន្ធឫសទាំងអស់ ត្រមោង ។
- រុក្ខជាតិក្រិន និងស្រពោនដោយសារមានជំងឺនៅលើមែក
- ស្លឹកផ្នែកខាងក្រោមប្រពណ៌លឿង នៅដំណាក់កាលដំបូងមុនពេលជម្ងឺរាលដាល ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ពូជធ្ងន់ទ្រាំអាចរកបាន ប៉ុន្តែប្រភេទពូជខ្លះមិនអាចធ្ងន់ទ្រាំជម្ងឺនេះទេ
- ចៀសវាង ដាំដំណាំនៅលើចំការដែលកើតជម្ងឺ
- បង្កើន pH ដីអោយស្មើនឹង ៧.២ ដោយបាចកំបោរសដើម្បីកាត់បន្ថយការរាលដាលរបស់ជម្ងឺ

- ស្ទង់កូនដែលគ្មានជម្ងឺ ការដុតចំបើងនៅលើថ្នាលសំណាប អាចកាត់បន្ថយការកើតជម្ងឺក្នុងដី
- បាញ់ថ្នាំផ្សិតក្នុងករណីចាំបាច់ អាចកាត់បន្ថយការរាលដាលរបស់ជម្ងឺបាន

២. ជម្ងឺស្រពោនលឿងស្លឹក ដោយផ្សិត (Fusarium Yellow) (Fusarium Yellow)

ភ្នាក់ងារបង្ក: *Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans* (រូបទី ៣. ៤) (រូបដង)

ការពិពណ៌នា: ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ បង្កើត macroconidia, microconidia និង clamydospores

ការរួមរាលដាល: ពាសពេញពិភពលោក ប៉ុន្តែមានបញ្ហាតិចតួចនៅតំបន់ដីត្រជាក់ និងតំបន់ត្រូពិច ។

លក្ខខណ្ឌរាលដាលរបស់ជម្ងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺឆ្លងរាលដាលតាមរយៈឧបករណ៍កសិកម្ម ការហូរច្រោះ និងការស្ទង់កូនដែលកើតជម្ងឺ
- ប្រសិនបើចំការមានកើតជម្ងឺ ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺរស់នៅក្នុងដីបានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ
- ជម្ងឺអាចរាលដាលនៅពេលសីតុណ្ហភាពក្នុងដីចាប់ពី ១៦-៣២ អង្សាសេ ប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាពសមស្របបំផុត គឺ ២៧ អង្សាសេ ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជម្ងឺ:

- ដំណាំស្ពៃក្តោបងាយទទួលរងជម្ងឺនេះណាស់ ប៉ុន្តែក៏អាចឆ្លងទៅដំណាំអំបូរស្ពៃផ្សេងទៀតដែរ
- រុក្ខជាតិដែលកើតជម្ងឺនេះ ដំបូងឆាងស្លឹកមានសភាពក្រិន និងពណ៌បៃតងលាយលឿង
- ស្លឹកខាងក្រោមរមួលមួយចំហៀង ហើយស្លឹកពណ៌លឿងកើតមានកាន់តែខ្លាំងនៅលើផ្ទៃនៃទ្រនុងស្លឹក
- ប្រព័ន្ធសរសៃរុក្ខសរសៃប្រែជាពណ៌ត្នោត
- រុក្ខជាតិនៅតែនៅរស់ប៉ុន្តែក្រិន ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ រុក្ខជាតិហាក់ដូចជាងាប់ ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ប្រើពូជធន់ទ្រាំ
- បច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើន មានពូជធន់ទ្រាំ អាចការពារជម្ងឺយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

៣. ជម្ងឺអុចស្លឹក ដោយផ្សិត (Alternaria Leaf Spot)

ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ: *Alternaria brassicae* & *Alternaria brassicicola* (រូបទី ៥. ៦)

ការពិពណ៌នា:

- ប្រភេទទាំងពីរនេះបង្កើត conidia ពណ៌ខ្មៅ
- ផ្សិត *brassicae* conidia មានបណ្តោយប្រវែង 75-350 μ x ទទឹងប្រវែង 20-30 μ
- ផ្សិត *brassicicola* conidia មានបណ្តោយប្រវែង 18-130 μ x ទទឹងប្រវែង 8-20 μ ។

ការឆ្លងរាលដាល: រាលដាលពាសពេញពិភពលោក ។

លក្ខខណ្ឌរាលដាលរបស់ជម្ងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺរស់នៅ និងបង្កើតស្ព័រក្នុងកាកសំណល់ដំណាំនិង រស់នៅលើរុក្ខជាតិ ចង្រៃដែលងាយទទួលរង ជម្ងឺនិងអាចជាជម្ងឺគ្រាប់ពូជ
- ផ្សិត Conidia រាលដាលតាមរយៈខ្យល់
- ជម្ងឺនេះរាលដាលខ្លាំងនៅពេលអាកាសធាតុក្ដៅ និងស្លឹករុក្ខជាតិមានសើមដោយទឹកភ្លៀង និងទឹកសន្សើម
- សីតុណ្ហភាពសមស្របបំផុតសំរាប់ការរាលដាលជម្ងឺ គឺ ២៥-៣០ អង្សាសេ ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជម្ងឺ:

- ភាគច្រើនដំណាំអំបូរស្តែងងាយទទួលរងជម្ងឺនេះ នៅគ្រប់ដំណាក់កាលលូតលាស់ទាំងអស់
- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺទាំងពីរប្រភេទខាងលើនេះ គឺមានរោគសញ្ញាប្រហែលគ្នា និងអាចឃើញរោគសញ្ញាកើតឡើងនៅលើដើមតែមួយ ។
- ជម្ងឺអុចស្លឹកគឺលេចចេញរោគសញ្ញាអុចតូចៗ រហូតរាលដាលដល់មុខកាត់ប្រហែល ៥សម ។ ជួនកាលមានប្រវែង ១.៥ សម និងមានពណ៌ខ្មៅរាងរង្វង់
- ដំបៅនៅលើគ្រាប់ពូជ និងផ្លែ គឺមានអុចរន្ទះៗរាងមូល
- ដំបៅនៅលើផ្លែខាងក្រៅអាចរាលដាលដល់ក្នុង និងបំផ្លាញគ្រាប់ពូជបណ្តាលអោយគ្រាប់ពូជស្ងួត ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ប្រើគ្រាប់ពូជដែលគ្មានជម្ងឺ (pathogen-free seed) ការសំអាតគ្រាប់ពូជដោយទឹកក្ដៅ និងថ្នាំគីមីអាច មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំបាត់ជម្ងឺនៅក្នុងគ្រាប់ពូជ
- មិនមានពូជធន់ទ្រាំទៅនឹងជម្ងឺនេះទេ និងចៀសវាងការស្រោចស្រពពីលើដំណាំ
- ប្រើថ្នាំសំលាប់ផ្សិតអាចមានប្រសិទ្ធភាពពេលជម្ងឺកើតឡើងច្រើន ។

៤. ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង ដោយផ្សិត (Downy Mildew)

ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ: *Hyaloperonospora parasitica* (រូបទី ៧. ៨. ៩. ១០. ១១)

ការពិពណ៌នា: Hyaline sporangia បានបង្កើតឡើងនៅលើ hyaline sporangiophores ដុះបែកខ្លែងជាពីរហើយ **oospores** បង្កើតនៅក្នុងជាលិការុក្ខជាតិ

ការឆ្លងរាលដាល: រាលដាលពាសពេញពិភពលោក

លក្ខខណ្ឌរាលដាលរបស់ជម្ងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺរស់នៅជាប៉ារ៉ាស៊ីត វារស់ក្នុងកាកសំណល់រុក្ខជាតិដោយបង្កើតជាអូស្ទ័រ **oospores** រីនៅលើដំណាំអំបូរស្ពៃ និងពពួកស្ពៅ
- ផ្សិតស្ដីរវែងហ្ន៎ **Sporangia** រាលដាលតាមរយៈខ្យល់ និងការបាចសាចរបស់ទឹកភ្លៀង
- ភាពសើមយូរនៅលើស្លឹកតាមរយៈទឹកភ្លៀង អង្ក រឺទឹកសន្សើមអាចបង្កឱ្យជម្ងឺរាលដាលលឿនបំផុត
- ជម្ងឺរាលដាលខ្លាំងនៅពេលយប់សីតុណ្ហភាពពី ១០-១៥អង្សាសេ និងមិនរាលដាលនៅពេលសីតុណ្ហភាព លើសពី២៤អង្សាសេ ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជម្ងឺ:

- ភាគច្រើនដំណាំអំបូរស្ពៃងាយទទួលរងជម្ងឺនេះ ។ ជាពិសេសជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿងនេះបំផ្លាញលើកូនស្ពៃក្ដោបតូចៗ និងជាជម្ងឺដែលបំផ្លាញស្លឹកលើដំណាំស្ពៃជើងទានៅក្នុងអាស៊ី ។
- មានដំបៅអុចពណ៌លឿងលេចឡើងនៅលើស្លឹកខាងលើ និងស្លឹកផ្នែកខាងក្រោមមានដុះផ្សិត **sporangiophores** និង **sporangia** បង្កើតជាសសៃពណ៌សទន់ៗ

- ជម្ងឺនេះកើតឡើងនៅលើដំណាំខាត់ណាផ្កា និងដំណាំប្រកួលី ធ្វើអោយមានស្នាមឆ្អុតពណ៌ត្នោតនៅចំកណ្តាល ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ពូជដំណាំប្រកួលី ២ ទៅ ៣ប្រភេទ ដែលធន់ទ្រាំជម្ងឺនេះ
- ដំណាំអំបូរស្តែផ្សេងៗអាចទប់ស្កាត់ជម្ងឺនេះបាន ប៉ុន្តែគ្មានពូជណាមានកំរិតធន់ទ្រាំខ្ពស់ឡើយ
- គ្មានពូជធន់ទ្រាំនឹងជម្ងឺនេះទេ
- ចៀសវាងការស្រោចស្រពពីខាងលើ
- បាញ់ថ្នាំសំលាប់ផ្សិតប្រើក្នុងករណីចាំបាច់ នៅពេលជម្ងឺកើតមានហើយលក្ខខណ្ឌសមស្របដែលនាំអោយជម្ងឺ នេះរីករាលដាលខ្លាំង ។

៥. ជំងឺឆេះក្លោប ដោយផ្សិត (White Mold or Watery Soft Rot)

ភ្នាក់ងារបង្ក: *Sclerotinia sclerotiorum* (រូបទី ១២)

ការពិពណ៌នា: ផ្សិតនេះបង្កើតសរសៃមីសេលរួមពណ៌សដូចកប្បាស និង sclerotia ពណ៌ខ្មៅ

ការឆ្លងរាលដាល: រាលដាលពាសពេញពិភពលោក ហើយកើតមាននៅតំបន់សីតុណ្ហភាពក្ដៅ និងខ្ពង់រាបត្រូពិច ។

លក្ខខណ្ឌរាលដាលរបស់ជម្ងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺអាចរស់នៅក្នុងកាកសំណល់ដំណាំជំរកផ្សេងៗ រឺជាផ្សិតស្លឹកស្លឹក (Sclerotia)ដែលរស់នៅក្នុងដី
- ក្នុងលក្ខខណ្ឌសំណើមត្រជាក់ (16-21° C) ជាលក្ខខណ្ឌសមស្របដល់ការរាលដាលជម្ងឺ
- ផ្សិត Ascospores គឺជាចំណុចសំខាន់នៃការរាលដាល

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជម្ងឺ:

- ស្តែក្ដោប និងដំណាំអំបូរគ្រុយស៊ីហ្វ័រផ្សេងទៀត ងាយទទួលរងជម្ងឺដូចដំណាំដទៃទៀតដែរ
- ទឹកជ្រាបចូលក្នុងដើម ស្លឹក រឺក្នុងក្ដោបតាមរយៈផ្សិតពណ៌ស អាចបង្កអោយដុះសរសៃមីសេលរួម និងបង្កើត ជាទំរង់ផ្សិតដ៏រឹងមាំ និង sclerotia ពណ៌ខ្មៅរឹង

- ជម្ងឺអាចកើតឡើងនៅក្នុងចំការ វិការទុកដាក់បន្ទាប់ពីប្រមូលផល ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ចៀសវាងដាំដុះដំណាំទាំងនេះ នៅលើចំការដែលកើតមានជម្ងឺនេះ
- ដាំដំណាំអំបូរគ្រុយស៊ីហ្វ័រមិនជាមួយដំណាំស្រូវ
- កូរដីអោយបានជ្រៅដើម្បីកប់ផ្សិត sclerotia
- ការពន្លឺចទឹកចំការអាចបំផ្លាញ sclerotia ដូច្នេះការដាំដំណាំមិនជាមួយដំណាំស្រូវ ពន្លឺចទឹកអាចកាត់បន្ថយការរស់នៅរបស់ផ្សិត sclerotia នៅក្នុងដី
- គ្មានពូជធន់ទ្រាំនឹងជម្ងឺនេះទេ
- ការប្រើថ្នាំសំលាប់ផ្សិតអាចទប់មិនអោយជម្ងឺរីករាលដាលបានមួយចំនួនៗ ។

៦. ជម្ងឺអុចរង្វង់ស ដោយផ្សិត (White Spot)

ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ: *Pseudocercospora capsella* (រូបទី ១៣)

ការពិពណ៌នា: ផ្សិតនេះបង្កើតជាសរសៃ hyaline ផ្សិត conidia មានរាងទ្រវែងដែល មានច្រវាក់ ១ ទៅ ៥ ថ្នាំង ។ ផ្សិត conidiophores ក្លាយជាសរសៃ hyaline ។

ការឆ្លងរាលដាល: រាលដាលពាសពេញពិភពលោក

លក្ខខណ្ឌរាលដាលរបស់ជម្ងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺរស់នៅក្នុងកាកសំណល់រុក្ខជាតិ ដែលបន្ទុកទុកដំណាំងាយទទួលរង ជម្ងឺជាច្រើន និងពពួកស្មៅអំបូរដំណាំស្រូវ
- ក្នុងលក្ខខណ្ឌសំណើមត្រជាក់ ជាលក្ខខណ្ឌសមស្របដល់ការរាលដាលជម្ងឺ ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជម្ងឺ:

- ជម្ងឺកើតធ្ងន់ធ្ងរនៅលើដំណាំស្ពៃមើម ស្ពៃជើងទា និងស្ពៃខ្សែវ
- ជម្ងឺបំផ្លាញកូទីឡេដូង ស្លឹក ទង និងផ្លែ
- រោគសញ្ញាជាលើស្លឹកមានទ្រង់ទ្រាយច្បាស់ ដោយប្រព័ន្ធពណ៌សទៅពណ៌លឿងត្នោត ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត ប្រហែល ១០ ម.ម
- ដំបៅរាលដាលចូលគ្នា ធ្វើអោយស្លឹករុក្ខជាតិទាំងមូលងាប់ ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ចៀសវាងដាំដំណាំញឹកពេក
- ចៀសវាងក្នុងការដាំដំណាំដែលងាយទទួលរងជំងឺដដែល នៅតំបន់តែមួយ
- បន្ទាប់ពីប្រមូលផលហើយត្រូវទុករយៈពេលអោយបានសមស្រប ដើម្បីអោយអស់កាកសំណល់ដំណាំក្នុងដី មុននឹងដាំដំណាំថ្មីទៀត ។

៧. ជំងឺស្រុកត្បូងឆ្មារ ដោយផ្សិត (Rhizoctonia Diseases)

ភ្នាក់ងារបង្ក: *Rhizoctonia solani* (រូបថត ១៤. ១៥. ១៦. ១៧. ១៨. ១៩. ២០)

ការពិពណ៌នា: មីសេល្យូមមានបែកខ្លែងជាមុំ ហើយ sclerotia មានទំហំ ផ្សេងៗគ្នា និងប្រែពណ៌ត្នោតស្រាលទៅពណ៌ខ្មៅ ។


ការរាលដាល: រាលដាលពាសពេញពិភពលោក

ជំងឺដែលបង្ក ដោយផ្សិតស្រុកត្បូងឆ្មារ RHIZOCTONIA:


- ជំងឺរលាកគល់លើសំណាប (Damping-off of Seedlings)
- ជំងឺរលាកគល់ដូចខ្សែលួស Wire Stem
- ជំងឺឆេះស្លឹក មែកដូចសំណាញ់ Web Blight
- ជំងឺរលួយគូទក្តោប Bottom Rot
- ជំងឺរលួយក្តោប Head Rot

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- សំលាប់មេរោគក្នុងដីត្រូវបានណែនាំសំរាប់ដាំដុះដំណាំបន្ត ដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺនេះ
- ប្រសិនបើសាបកូននៅថ្នាល ត្រូវធ្វើ Fumigate រឺ សំលាប់មេរោគក្នុងដី មុនពេលធ្វើថ្នាលសំណាប
- រៀបចំចង្កូរបង្ហូរទឹកអោយបានត្រឹមត្រូវ និងលើករងអោយខ្ពស់ដើម្បីកុំអោយមានដក់ទឹកនៅក្នុងចំការ
- ប្រើជីស្រស់ ឬជីសរីរាង្គដទៃទៀតដែលពុកផុយល្អ និងកុំអោយដីខ្ចាតទៅលើដំណាំអាចកាត់បន្ថយជំងឺ Bottom Rot និង Head Rot
- ប្រើថ្នាំសំលាប់ផ្សិតនៅលើកូនសំណាប និងថ្នាល នៅពេលដែលជំងឺរាលដាលខ្លាំង
- បាញ់ថ្នាំផ្សិតបន្ទាប់ពីស្ទូងរួចក្នុងករណីចាំបាច់អាចកាត់បន្ថយជំងឺរលាកគល់



១~ ជំងឺត្រចៀកចូស ដោយផ្សិត




២~ ជំងឺត្រចៀកចូស ដោយផ្សិត



៣~ ជំងឺស្រពោនលើឡូត៍ ដោយផ្សិត




៤~ ជំងឺស្រពោនលើឡូត៍ ដោយផ្សិត



៥~ ជំងឺអុចស្លឹក ដោយផ្សិត



៦~ ជំងឺអុចស្លឹក ដោយផ្សិត



ស្តែងើងទា

៧~ ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង ដោយផ្សិត




ប្រកូលី

៨~ ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង ដោយផ្សិត



ស្តែងក្តោប

៩~ ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង ដោយផ្សិត



ស្តែងផ្កា

១០~ ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង ដោយផ្សិត



ប្រកូលី

១១~ ជម្ងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង ដោយផ្សិត




១២~ ជំងឺស្លែក្លោម ដោយផ្សិត



១៣~ ជំងឺអុបទ្វេងស ដោយផ្សិត



១៤~ ជំងឺលោកគល់លើសំណាម



១៥~ ជំងឺលោកគល់ដូចខ្សែល្អស



១៦~ ជម្ងឺឆេះស្លឹក មែក ដូចសំណាញ់



១៧~ ជម្ងឺឆេះស្លឹក មែក ដូចសំណាញ់



ស្លែកក្លោប



ស្លែកក្លោប

១៨~ ជម្ងឺរលួយក្លោប



១៩~ ជម្ងឺរោគគល់លើសំណាម



២០~ ជម្ងឺរោគគល់លើសំណាម

III-ជម្ងឺផ្សិតលើដំណាំប៉េងប៉ោះ

- ១~ ជម្ងឺឆេះស្លឹក ផ្លែ ដោយផ្សិត (Late Blight)
- ២~ ជម្ងឺខ្លោចគូងផ្លែ ដោយផ្សិត (Buckeye Rot)
- ៣~ ជម្ងឺស្រពោនលើស្លឹក ដោយផ្សិត (Fusarium Wilt)
- ៤~ ជម្ងឺខ្ទុះស្លឹក ដោយផ្សិត (Leaf Mold)
- ៥~ ជម្ងឺផ្សិតស្លឹក ដោយផ្សិត (Black Leaf Mold)
- ៦~ ជម្ងឺដំបៅកង ដោយផ្សិត (Early Blight)
- ៧~ ជម្ងឺអុំបស្លឹកពណ៌ប្រផេះ ដោយផ្សិត (Gray Leaf Spot)
- ៨~ ជម្ងឺរលួយដើម ដោយផ្សិត Stem Rot (Southern Blight)
- ៩~ ជម្ងឺមេរ្យាលើស្លឹក ដោយផ្សិត (Powdery Mildew)

១. ជំងឺឆេះស្លឹក ផ្លែ ដោយផ្សិត (Late Blight)

ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺ: *Phytophthora infestans* (រូបទី ១. ២. ៣)

ការពិពណ៌នា: Sporangiophores មានខ្លែងដុះចេញពីស្នូម៉ាតាផ្ទុកដោយផ្សិត
Sporangia រាងដូចផ្លែក្រូច

ការឆ្លងរាលដាល: រាលដាលខ្លាំងនៅតំបន់អាកាសធាតុមធ្យម និងតំបន់ខ្ពង់រាបត្រូពិច

លក្ខខណ្ឌរាលដាលជំងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺអាចរស់នៅលើដំណាំប៉េងប៉ោះ ដំណាំដំឡូងបារាំង និងរុក្ខជាតិដុះម្សៅ និងមិនរស់នៅក្នុងកាកសំណល់រុក្ខជាតិទេ ។
- ស្លឹកសើមរយៈពេលយូរបណ្តាលមកពីភ្លៀង ឬអំពូលនិងត្រជាក់ខ្លាំងអាចបង្កអោយជំងឺរាលដាល
- ផ្សិត Sporangia រាលដាលតាមរយៈការសាច់ទឹកភ្លៀង និងខ្យល់បោកបក់ ទឹកភ្លៀង គឺជាកត្តាដែលបង្កអោយមានការរាលដាលកាន់តែខ្លាំង ។
- ជំងឺនេះច្រើនកើតលើដំណាំប៉េងប៉ោះ និងដំណាំដំឡូង ហើយវាមានប្រភេទខុសគ្នា ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជំងឺ:

- ស្លឹកដំណាំប៉េងប៉ោះដែលនៅជិតដីងាយទទួលរងជំងឺនេះ
- ស្នាមដំបៅនៅលើស្លឹករាលដាលធំ ស្លឹកដែលជាទឹកប្រែជាពណ៌ត្នោតនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយ
- ផ្សិតពណ៌សដុះ (sporangiophores & sporangia) រាលដាលលើស្នាមជាំរបស់ស្លឹកក្នុងកំឡុងពេលស្លឹកសើម
- ស្នាមដំបៅនៅលើមែក គឺជាទឹក ក្រោយមកក្លាយទៅជាពណ៌ត្នោត ស្នាមដំបៅសើរៗ នៅផ្នែកខាងលើ និងផ្ទះបន្ទាប់មកដើមផ្នែកខ្លះងាប់
- ដំបៅនៅលើផ្លែ គឺរឹងហើយប្រែពីពណ៌បៃតងលឿងទៅជាពណ៌ត្នោត បើមើលពីខាងក្រៅទៅមានសភាពដូចជាស្បែក ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ដាំកូនដំណាំប៉េងប៉ោះដែលគ្មានជំងឺ
- មានពូជប៉េងប៉ោះ ២ ទៅ ៣ ប្រភេទដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងជំងឺនេះ
- ចៀសវាងដាំដំណាំប៉េងប៉ោះជិតចំការដំឡូងបារាំង
- បាញ់ថ្នាំផ្សិតក្នុងករណីចាំបាច់ អាចទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលរបស់ជំងឺបាន

២. ជំងឺខ្លោចគូទផ្លែ ដោយផ្សិត (Buckeye Rot)

ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺ: *Phytophthora nicotianae* and *Phytophthora capsici* (រូបទី ៤)

ការពិពណ៌នា: ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺទាំងពីរប្រភេទខាងលើនេះបង្កើតជា sporangia ហើយរំដោះអូស្ទ័រ

ការឆ្លងរាលដាល: រាលដាលពាសពេញពិភពលោក ប៉ុន្តែភាគច្រើនរាលដាលនៅតំបន់អាកាសធាតុក្ដៅ និងសើមខ្លាំង ។

លក្ខខណ្ឌរាលដាលជំងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺទាំងនេះ រស់នៅក្នុងដី ដែលបង្កើតផ្សិត oospores, sporangia & zoospores
- ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមានដំណាំជាជម្រកច្រើនប្រភេទ
- ភ្លៀងរយៈពេលយូរ និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាលក្ខខណ្ឌសមស្របសំរាប់ការរាលដាលជំងឺ
- ការសាច់ទឹកនាំយក zoospores ពីដីទៅផ្លែ និងផ្លែដែលប៉ះដី រឺនៅក្បែរដីងាយទទួលរងការឆ្លងរាលដាលបំផុត ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជំងឺ:

- ស្នាមដំបៅរាងជារង្វង់ រលោងភ្លឺៗ និងរង្វង់ពណ៌ត្នោតខ្មៅ ហើយស្នាមដំបៅនេះអាចរាលដាលដល់ពាក់កណ្តាលផ្លែ រឺច្រើនជាងនេះ
- រោគសញ្ញាដំបូងកើតឡើងនៅលើផ្លែខ្លី ប៉ុន្តែផ្លែទុំក៏អាចកើតឡើងដែរ
- ជាទូទៅទងផ្លែមិនឆ្លងជំងឺនេះទេ ប៉ុន្តែកង្វះសារធាតុផូស្វ័រ (P) ជួនកាលក៏បង្កអោយខ្លោចគូទផ្លែដែរ ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- គ្មានពូជធន់ទ្រាំនឹងជំងឺនេះទេ
- លើករងដំណាំអោយខ្ពស់ ដើម្បីងាយស្រួលធ្វើចង្អុរបង្ហូរទឹកចេញ
- ប្រើផ្លាស្ទិច រឺកំទេចចំបើងគ្របថ្នាល ដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងតាមរយៈការខ្ចាតដីទៅប៉ះរុក្ខជាតិ
- ដោតចំណារដើម្បីការពារផ្លែប៉ះដី
- បាញ់ថ្នាំផ្សិត អាចកាត់បន្ថយការកើតឡើងរបស់ជំងឺ

៣. ជម្ងឺស្រពោនលើក្លែងស្លឹក ដោយផ្សិត (Fusarium Wilt)

ភ្នាក់ងារបង្ក: *Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici* (រូបទី ៥. ៦)

ការពិពណ៌នា: ផ្សិតនេះបង្កើត macroconidia, microconidia ស្តួរមានស្រោម

ការឆ្លងរាលដាល: ពាសពេញពិភពលោក ហើយកើតមានច្រើនបំផុតនៅតំបន់អាកាសធាតុក្តៅល្ងម

លក្ខខណ្ឌរាលដាលជម្ងឺ:

ភ្នាក់ងារបង្កគឺជាប្រភេទមេរោគក្នុងដី និងអាចរស់នៅក្នុងដីបានរយៈពេល ៥ ទៅ ៦ ឆ្នាំ ទោះបីជាគ្មានរុក្ខជាតិជាកម្រកក៏ដោយ ។ វាអាចជាជម្ងឺគ្រាប់ពូជ ប៉ុន្តែប្រភេទគ្រាប់ពូជ ដែលក្រុមហ៊ុនផលិតគឺបានការពារ ដោយថ្នាំសំលាប់ផ្សិត ។

- ជម្ងឺនេះច្រើនកើតលើដីអាស៊ីត ដីខ្សាច់ និងដីដែលមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកមិនបានល្អ
- ជម្ងឺនេះមានបីប្រភេទ គឺប្រភេទទី១ ច្រើនកើតនៅតំបន់អាស៊ី ប្រភេទទី២ កកើតឡើងជាប្រចាំ និងប្រភេទទី៣ លេចឡើងតិចតួចប៉ុណ្ណោះតែប្រសិនបើតំបន់ដាំប៉េងប៉ោះច្រើនកកើតឡើងកាន់តែខ្លាំង
- សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងដីសើមខ្លាំង ជាលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតសំរាប់ការរាលដាលជម្ងឺ ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជម្ងឺ:

- រោគសញ្ញាដំបូងគឺស្លឹកឆេះពណ៌លឿងចាប់ពីផ្នែកខាងក្រោម ដើមក្បែរដីរហូតដល់ស្លឹកខាងលើ
- ដំណាំចាប់ផ្តើមស្រពោននៅផ្នែកខាងចុងនៅពេលថ្ងៃ និងស្រស់វិញនៅពេលយប់ បន្ទាប់មកទៀតរុក្ខជាតិ ប្រែជាស្រពោនជាប្រចាំ
- សរសៃរុក្ខសមានពណ៌ត្នោតរាលដាលពេញដើម និងរាលដាលដល់មែកខាងចុង ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ប្រើពូជធន់ទ្រាំ: ពូជដែលអាចរកបានស្រួល ជាពូជធន់ទ្រាំទៅនឹងប្រភេទទី១ និងប្រភេទទី ២
- ដាំដំណាំឆ្លាស់ក្នុងរយៈពេល ៥-៧ ឆ្នាំ ជាមួយដំណាំផ្សេងៗទៀត
- ដាំដំណាំឆ្លាស់ប៉េងប៉ោះជាមួយស្រូវពន្លឺច្រើន
- ប្រើខ្នែងបំបៅប៉េងប៉ោះជាមួយជើងទំរដែលជាពូជធន់ទ្រាំ
- ផ្សាំប៉េងប៉ោះទៅលើជើងទំរដែលមានពូជធន់ទ្រាំប៉េងប៉ោះ និងត្រប់ជាជើងទំរ

៤. ជម្ងឺខ្លួនស្លឹក ដោយផ្សិត (Leaf Mold)

គ្រាប់ខាងចន្ទៈ *Fulvia fulva* (= *Cladosporium fulvum*) (រូបទី ៧. ៨. ៩)

ការពិពណ៌នា: ផ្សិតនេះបង្កើតកោសិកា ជាពង្សាក៏ជាច្រវាក់ ផ្សិតកូនីខៀវមានពណ៌ខ្មៅ នៅលើផ្សិត កូនីឌីយ៉ូហ្វ័រ conidiophores ដែលកើតឡើងតាមរយៈស្នូម៉ាតា ។

ការឆ្លងរាលដាល: តំបន់ត្រូពិច តំបន់ subtropical ក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ និងពាសពេញ ពិភពលោក ។

លក្ខខណ្ឌរាលដាលជម្ងឺ:

- ផ្សិតរស់នៅក្នុងកាកសំណល់រុក្ខជាតិ ផ្សិតស្លឹកស្លឹកស្លឹក sclerotia និងផ្សិតកូនីខៀវ អាចរស់នៅក្នុងដីបានយូរ
- ជម្ងឺនេះកើតឡើងលើដំណាំប៉េងប៉ោះនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ ប៉ុន្តែអាចកើតឡើងនៅចំការដែរ
- សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងក្តៅល្មមជាមួយកំដៅខ្ពស់ជាលក្ខខណ្ឌប្រសើរសំរាប់ការ រាលដាលជម្ងឺ
- ការរាលដាលរបស់ជម្ងឺនេះកើតឡើងតាមរយៈខ្យល់ ដែលបោកបក់នាំផ្សិត កូនីខៀវ conidia ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជម្ងឺ:

- រោគសញ្ញាដំបូងនៅលើស្លឹកខាងក្រោម គឺមានចំនុចពណ៌បៃតងស្លេក ហើយប្រែជា ពណ៌លឿង ។ ស្លឹកខាងក្រោមដំបៅ និងរាលដាលពណ៌បៃតងស្លេកផ្ទុកទៅដោយដុំ ផ្សិតនៃ conidiophores និង conidia
- ដំបៅរាលដាលចូលគ្នា និងធ្វើអោយស្លឹកស្ងួត ហើយជាលទ្ធផលធ្វើអោយជ្រុះស្លឹក
- ពេលខ្លះផ្លែខ្លី អាចទទួលរងការបំផ្លាញហើយវិវត្តទៅជាដំបៅពណ៌ខ្មៅ

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ដកដើម និងបំផ្លាញកាកសំណល់រុក្ខជាតិចោល ជាពិសេសការដាំដុះនៅក្នុងផ្ទះ កញ្ចក់
- បង្កើតអោយមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីកាត់បន្ថយកំដៅនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់
- មានពូជធន់ទ្រាំទៅនឹងជម្ងឺ ប៉ុន្តែភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺវិវត្តនូវប្រភេទថ្មីយ៉ាងលឿន ដែល ជំនះលើពូជទាំងនេះបាន

- ប្រើថ្នាំផ្សិតអាចកាត់បន្ថយការកើតឡើងរបស់ជម្ងឺ

៥-ជម្ងឺធូលីស្លឹក ដោយផ្សិត (Black Leaf Mold)

គ្លាក់ងារបង្ក: *Pseudocercospora fuligena* (រូបទី ១០. ១១)

ការពិពណ៌នា: ផ្សិតនេះបង្កើតកោសិកា ជា ១-៣ ថ្នាក់ជាច្រវាក់ផ្សិតកូនីខៀវមានរាងមូល conidia ពណ៌លឿង បែតងជាបណ្តុំ conidiophores ដែលដុះចេញពីស្លឹកម៉ាតា ។

ការឆ្លងរាលដាល: តំបន់ត្រូពិច និងតំបន់ subtropic ក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ និងទូទាំងពិភពលោក
លក្ខខណ្ឌរាលដាលរបស់ជម្ងឺ:

- ស្លឹកសើមយូរកំដៅខ្ពស់ និងសីតុណ្ហភាពក្តៅល្មម គឺជាលក្ខខណ្ឌសមស្របសំរាប់ជម្ងឺរាលដាល
- ផ្សិតកូនីខៀវអាចឆ្លងរាលដាលតាមរយៈខ្យល់
- ជម្ងឺធូលីស្លឹកដោយផ្សិតនេះរាលដាលខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីភាគខាងត្បូង

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជម្ងឺ:

- អុចស្លឹកពណ៌លឿងកើតឡើងនៅខ្នងស្លឹកខាងលើ និងមានផ្សិតរាលដាលពីពណ៌ប្រផេះទៅជាពណ៌ខ្មៅ ដែលវិវត្តនៅខ្នងស្លឹកខាងក្រោម ។
- ដំបៅរាលដាលចូលគ្នា ហើយគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃស្លឹកភាគច្រើន
- ស្លឹករុក្ខជាតិរមួលឡើង នាំអោយបញ្ចេញផ្ទៃស្លឹកខាងក្រោម ។ ស្លឹកភាគច្រើននៅតែរមួលជាប់គ្នា ហើយធ្វើអោយរុក្ខជាតិខ្វះត្រួយ ។
- ផ្ទៃប៉េងប៉ោះមិនកើតជម្ងឺនេះទេ ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- គ្មានពូជធន់ទ្រាំទៅនឹងជម្ងឺនេះទេ
- បាញ់ថ្នាំផ្សិតអាចទប់ស្កាត់នៅពេលជម្ងឺរាលដាលខ្លាំង ។

៦-ជម្ងឺដំបៅកង ដោយផ្សិត (Early Blight)

គ្លាក់ងារបង្ក: *Alternaria solani* (រូបទី ១២. ១៣. ១៤. ១៥)

ការពិពណ៌នា: ផ្សិតនេះបង្កើត muriform conidia ដែលបង្កើតឡើងជាច្រវាក់ពីរខ្សែ

ការឆ្លងរាលដាល: ពាសពេញពិភពលោក

លក្ខខណ្ឌរាលដាលរបស់ជំងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺអាចរស់នៅក្នុងកាកសំណល់រុក្ខជាតិ ដំណាំប៉េងប៉ោះដុះម្តង និងដំណាំអំបូរសូឡាណាសេព្រៃ និងអាចជាជំងឺគ្រាប់ពូជ
- ស្លឹកសើមយូរដោយសារសន្សើមនៅពេលយប់ច្រើនភ្លៀងញឹកញាប់ រឺការស្រោចស្រពពិលើ ជាលក្ខខណ្ឌសមស្របបំផុតសំរាប់ជំងឺរាលដាល
- រុក្ខជាតិចាស់ៗ រឺរុក្ខជាតិដែលមានការលូតលាស់មិនធម្មតា (stressed plants) គឺងាយទទួលរងជំងឺច្រើនជាងគេ ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជំងឺ:

- រោគសញ្ញាដំបូងមានចំនុចតូចៗពណ៌ខ្មៅ អុចជារង្វង់លេចឡើងរាលដាលជាដំបៅដែលបង្កើតបានជាកងរង្វង់ច្បាស់
- ដំបៅលើដើម និងទងស្លឹកមានរាងជាពងក្រពើ ដំបៅលើដើមដំណាំខ្លីៗ ងាយខូចខាត
- ដំបៅលើផ្លែ រាលដាលខ្លាំងនៅជិតទងផ្លែ ទាំងផ្លែចាស់ និងផ្លែខ្លី ។

វិធីធានាការការពារ និងកំចាត់:

- ប្រើពូជធន់ទ្រាំ
- ស្ទង់កូនដំណាំដែលគ្មានជំងឺ (disease-free transplants)
- ប្រើថ្នាំផ្សិតប្រលាក់ជាមួយគ្រាប់ពូជដើម្បីការពារជំងឺ
- ដាំដំណាំឆ្លាស់ក្នុងរយៈពេល៣-៥ឆ្នាំ ក្រៅពីអំបូរសូឡាណាសេ
- បាញ់ថ្នាំផ្សិតនៅពេលជំងឺរាលដាលខ្លាំង

៧. ជំងឺរុចស្លឹកពណ៌ប្រផេះ ដោយផ្សិត (Gray Leaf Spot)

ភ្នាក់ងារបង្ក: *Stemphylium solani* and *Stemphylium lycopersici* (រូបទី ១៦. ១៧)

ការពិពណ៌នា: ផ្សិតនេះបង្កើត muriform conidia ពណ៌ខ្មៅរាងស៊ីឡាំងលើ conidiophor ពណ៌ខ្មៅ

ការឆ្លងរាលដាល: ពាសពេញពិភពលោក និងកើតមានច្រើននៅក្នុងតំបន់អាកាសធាតុក្តៅ ។

លក្ខខណ្ឌរាលដាលរបស់ជម្ងឺ:

- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺអាចរស់នៅក្នុងកាកសំណល់រុក្ខជាតិ ដំណាំប៉េងប៉ោះដុះម្តង ដំណាំអំបូរសូឡាណាសេផ្សេងៗទៀត និងស្មៅចង្រៃ
- សីតុណ្ហភាពក្តៅល្ងម និងស្លឹកដំណាំសើមយូរដោយសន្សើមពេលយប់ច្រើន ឬភ្លៀងញឹកញាប់ ជាលក្ខខណ្ឌសមស្របបំផុតសំរាប់ជម្ងឺរាលដាល
- ផ្សិត Conidia ឆ្លងរាលដាលតាមរយៈខ្យល់ ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជម្ងឺ:

- ដំបៅមានអង្កត់ផ្ចិតប្រហែល ១-២ម.ម អុចមូលដែលរាលដាលជាពណ៌ប្រផេះនៅចំកណ្តាល
- ដំបៅច្រើនកើតនៅលើស្លឹក អាចធ្វើអោយស្លឹកប្រែពណ៌លឿង និងជ្រុះ
- ដំបៅនេះ អាចកើតនៅលើមែក និងទងស្លឹក ប៉ុន្តែនៅលើផ្លែគ្មានស្នាមអុចនេះទេ ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ការដាំដុះពូជធន់ទ្រាំគឺជាវិធានការការពារជម្ងឺដ៏ចម្បងបំផុត និងអាចរកបានពូជធន់ទ្រាំសំរាប់ការដាំដុះ
- ដាំដំណាំឆ្លាស់ គឺកាត់បន្ថយការរាលដាលជម្ងឺ
- ការប្រើថ្នាំផ្សិតអាចមានប្រសិទ្ធភាព ប្រសិនបើពូជងាយទទួលរងជម្ងឺ ។

៨. ជម្ងឺល្អុយដើម ដោយផ្សិត (Stem Rot or Southern Blight)

ភ្នាក់ងារបង្ក: Sclerotium rolfsii

ការរួចរាលដាល: ពាសពេញតំបន់ក្តៅល្ងម ទទួលអាកាសធាតុត្រូពិច ។

លក្ខខណ្ឌរាលដាលជម្ងឺ : (រូបទី ១៨. ១៩)

- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺរស់នៅក្នុងកាកសំណល់រុក្ខជាតិ ផ្សិតរស់នៅក្នុងដីមានលក្ខណៈក្រាំង និងមានជំរកជាច្រើន
- សីតុណ្ហភាព និងសំណើមខ្ពស់ ជាលក្ខខណ្ឌប្រសើរដល់ការរាលដាលជម្ងឺ
- ដីស្រស់ដែលមិនទាន់ពុកផុយបានផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមជាសំខាន់ដល់ផ្សិត និងធ្វើអោយរាលដាលកាន់តែខ្លាំង ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជម្ងឺ:

- ដើមកើតជម្ងឺស្រពោនភ្លាមៗជាប្រចាំនៅលើដើមទាំងមូល ដំបូងរុក្ខជាតិមិនមាន ពណ៌លឿងទេ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីស្រពោនវាប្រែជាពណ៌លឿង
- សរសៃមីសេលូមពណ៌សដុះនៅលើមែក និងដីក្បែរគល់ដំណាំ។ Sclerotia ដែល មានរាងដូចជាគ្រាប់ពូជ ទើបប្រែពីពណ៌ជាំទៅជាពណ៌ត្នោតបានដុះនៅលើសរសៃ មីសេលូម
- ផ្លែ និងដើមដែលប៉ះដី អាចឆ្លងជម្ងឺនេះ ។

វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ត្រូវទុកពេលអោយដីស្រស់ពុកផុយបានល្អមុនពេលដាំដំណាំ
- ភ្ជួរដីអោយបានជ្រៅដើម្បីកប់ sclerotia
- ចៀសវាងដាំដំណាំនៅចំការដែលកើតជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ
- ការប្រើថ្នាំផ្សិតមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចបំផុត ។

៩-ជម្ងឺមេរុវលើស្លឹក ដោយផ្សិត (Powdery Mildew)

ភ្នាក់ងារបង្ក: *Leveillula taurica* (Oidiopsis) and *Erysiphe* sp. (Oidium) (រូបទី ២០. ២១. ២២. ២៣)

ការពិពណ៌នា: *Leveillula conidiophores* កើតចេញពីស្លឹក stomata *Erysiphe conidiophores* កើតចេញពីផ្ទៃរបស់ mycelium

ការឆ្លងរាលដាល: ពាសពេញពិភពលោក

លក្ខខណ្ឌរាលដាលរបស់ជម្ងឺ:


- ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ រស់នៅជាប៉ារ៉ាស៊ីត និងរស់នៅលើដំណាំស្រស់ និងស្មៅចង្រៃ
- សំណើមខ្ពស់ និងសន្សើមពេលយប់ ជាលក្ខខណ្ឌសមស្របដល់ការរាលដាលជម្ងឺ
- ផ្សិត *Leveillula* អាចកើតឡើង នៅកំឡុងពេលភ្លៀងញឹកញាប់ ។

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាជម្ងឺ:

- ផ្សិត *Leveillula* ធ្វើអោយស្លឹកប្រែពណ៌លឿង និងបាត់បង់សារធាតុបែតង និងស្តុរដុះលើស្លឹកខាងក្រោមដែលមិនអាចមើលឃើញឡើយ
- ផ្សិត *Erysiphe* ជាទូទៅមានស្តុរដុះនៅលើផ្ទៃស្លឹកទាំងសងខាង និងអាចមើល ឃើញដោយភ្នែកទទេ ។



វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- ពូជធន់ទ្រាំត្រូវបានគេកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវ
- ការបាញ់ថ្នាំសង្កត់ក្នុងករណីចាំបាច់ជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយ ។



១~ ជំងឺរោគស្លឹក ផ្លែ ដោយផ្សិត



២~ ជំងឺរោគស្លឹក ផ្លែ ដោយផ្សិត



៣~ ជំងឺរោគស្លឹក ផ្លែ ដោយផ្សិត



៤~ ជំងឺខ្លោចគុណផ្លែ ដោយផ្សិត




៥~ ជម្ងឺស្រពពោលលើកស្លឹក ដោយផ្សិត



៦~ ជម្ងឺស្រពពោលលើកស្លឹក ដោយផ្សិត

៧~ ជម្ងឺខ្វះស្លឹក ដោយផ្សិត




៨~ ជម្ងឺខ្វះស្លឹក ដោយផ្សិត

៩~ ជម្ងឺខ្វះស្លឹក ដោយផ្សិត



មើលបោះ



មើលបោះ



មើលបោះ

១០~ ជំងឺផ្សាចក្រ ដោយផ្សិត



មើលបោះ




មើលបោះ

១១~ ជំងឺផ្សាចក្រ ដោយផ្សិត

១២~ ជំងឺដំបៅកង ដោយផ្សិត




មើលបោះ



មើលបោះ

១៣~ ជំងឺដំបៅកង ដោយផ្សិត



ម៉េចបាន



ម៉េចបាន

១៤~ ជំងឺដំណើរការ ដោយផ្សិត




ម៉េចបាន




ម៉េចបាន

១៥~ ជំងឺដំណើរការ ដោយផ្សិត


១៦~ ជំងឺអុចស្លឹកពីណាប្រដេះ ដោយផ្សិត



ម៉េចបាន



ម៉េចបាន



ម៉េចបាន

១៧~ ជំងឺអុចស្លឹកពីណាប្រដេះ ដោយផ្សិត



ម៉េចបាន៖



ម៉េចបាន៖

១៨~ ជំងឺរលួយដើម ដោយឆ័រ្សិត




ម៉េចបាន៖




ម៉េចបាន៖

១៩~ ជំងឺរលួយដើម ដោយឆ័រ្សិត



ម៉េចបាន៖



ម៉េចបាន៖

២០~ ជំងឺមេរុវលើស្លឹក ដោយឆ័រ្សិត



២១~ ជំងឺមេរោគលើស្លឹក ដោយផ្សិត

២២~ ជំងឺមេរោគលើស្លឹក ដោយផ្សិត

២៣~ ជំងឺមេរោគលើស្លឹក ដោយផ្សិត

អត្ថសញ្ញាណកម្ម និងការគ្រប់គ្រង ជម្ងឺឈាត់សើ

១. តើអ្វីជាជម្ងឺបាក់តេរី?

បាក់តេរីគឺជាសរីរាង្គដ៏តូចដែលគេអាចមើលឃើញបានតាមរយៈមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រូនិចប៉ុណ្ណោះ។ មានបាក់តេរីតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបំផ្លាញរុក្ខជាតិ។ បាក់តេរីអាចបង្កអោយរុក្ខជាតិរលួយ ស្លោក ស្រពោន និងអុចស្លឹក។ បាក់តេរីមិនបង្កើតជាទំរង់ស្ទើរដូចផ្សិតទេ តែវាអាចបង្កើនចំនួនតាមរយៈបំណែកចែកកោសិកា (ដោយបំបែកកោសិកាជាពីរចំណែក) ។ បាក់តេរីខ្លះអាចរស់រានមានជីវិតបានរយៈពេលយូរ ដោយសារស្រទាប់ការពាររបស់ខ្លួនវាទប់ទល់ទៅនឹងភាពស្ងួត។ បាក់តេរីលូតលាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសើម។

ជាធម្មតាបាក់តេរីបង្កើនចំនួនតាមការបំណែងចែកកោសិកា៖ កោសិកាបាក់តេរីលូតលាស់ធំហើយបំបែកខ្លួនជាពីរ។ ការបំបែកខ្លួននេះ គឺប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត។ ឧទាហរណ៍ បាក់តេរីឈ្មោះ អេកូលី (E.Coli) ស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌសមស្រប គឺក្នុងរវាងរយៈពេល ២០ នាទីម្តង វាអាចបំបែកខ្លួនជាពីរចំណែកមានន័យថា បាក់តេរីមួយអាចបង្កើនចំនួនរហូតដល់ប្រមាណ ៤០០០ បាក់តេរី តែក្នុងរយៈពេលចំនួន ៤ ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ។ ក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតា បេសិនជាស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្វះចំណីអាហារ ឬខ្វះគំនរកាកសំណល់នានាដែលសេសសល់ក្នុងចំការ នេះពពួកបាក់តេរីទាំងនេះក៏មិនអាចបង្កើនចំនួនរបស់ខ្លួនបានឆាប់រហ័សដែរ។

បាក់តេរីខ្លះអាចរស់នៅបានរយៈពេលយូរ ដោយបង្កើតជាស្រទាប់ការពារខ្លួន ដើម្បីទប់ទល់ភាពរំហួត។

ភ្នាក់ងារបង្ករោគបាក់តេរី៖

- បាក់តេរីរាងទ្រវែង
- បាក់តេរីបន្លាស់ទីដោយខ្លួនឯង
- បាក់តេរីត្រូវការអុកស៊ីសែន
- បាក់តេរីមានក្រាមអវិជ្ជមាន
- បាក់តេរីគ្មានទំរង់ស្ទើរ

បាក់តេរីចំនួន ២៩ប្រភេទ ដែលជាភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺដល់រុក្ខជាតិ មានដូចតទៅ៖

- អ៊ីរីនីញ៉ា
- អាត្រូបាក់តេរីយ៉ូម
- ពិកតូបាក់តេរីយ៉ូម
- កូរីនីបាក់តេរីយ៉ូម

- រំលែកស្លឹក
- ស្យង់តូម៉ូណាស់
- ស្រីបតូមីស៊ី

រោគសញ្ញាដែលបណ្តាលមកពីជម្ងឺបាក់តេរី

- បាក់តេរីបង្កអោយមានស្នាមជាំដុំៗលេចចេញនៅលើជាលិកាស្លឹក និងបណ្តាលអោយស្លឹករលួយ
- ភ្នាក់ងារបង្ករោគបង្កើតប្រតិកម្មអង់ស៊ីម ដែលកាត់បន្ថយសារធាតុកំប៉ោរ និងជញ្ជាំងកោសិការបស់រុក្ខជាតិ បណ្តាលរលួយទន់រអិលៗ និងមានទឹកខាប់ៗ ។
- ដោយការបង្កើតអ៊ីពែត្រូហ្វី និងអ៊ីពែប្លាស្មា និងការលេចឡើងនៅលើកោសិកា រុក្ខជាតិអាចបង្កើតអោយចេញជាត្រមោង ។
- បាក់តេរីរីករាលដាល និងស្ទះដំណើរការដឹកជញ្ជូនទឹក និងចំណីអាហារទៅចិញ្ចឹមរុក្ខជាតិ ដែលបណ្តាលអោយរុក្ខជាតិស្រពោន ។

ដំណើរការវិភាគរោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺ

កំណត់ចំណាំ: ការវិភាគជាក់លាក់ និងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃជម្ងឺបាន គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងជម្ងឺ ប្រសិនបើអាចកត់សំគាល់រោគសញ្ញាជម្ងឺដំបូងបានទាន់ពេល គឺអាចនៅមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាត់វិធានការការពារជម្ងឺ ។

- យល់ដឹងពីស្ថានភាពលូតលាស់ធម្មតារបស់ដំណាំ
- ត្រួតពិនិត្យសញ្ញា និងរោគសញ្ញា
- ប្រមូលព័ត៌មានមូលដ្ឋាន
- ពិនិត្យលក្ខណៈកើតជម្ងឺ (រលួយឬស អុចស្លឹក ស្រពោន)
- ដឹងពីស្ថានភាពបណ្តាលអោយកើតជម្ងឺ (ភ្នាក់ងារបង្ក ឬកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម)
- ពិសោធន៍ និងសាកល្បងពិនិត្យក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍
- វិភាគរោគវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយ

ព័ត៌មានសំខាន់ៗសំរាប់វិភាគជម្ងឺ

- ថ្ងៃដាំ និងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាននៅកន្លែងដាំ
- ប្រភពពូជ ការសំអាតគ្រាប់ពូជ ដំណុះពន្លកគ្រាប់ពូជ
- ប្រវត្តិកើតជម្ងឺ: រៀបរាប់ពីរោគសញ្ញាដំបូង រហូតដល់ការឆ្លងរាលដាល
- វិធីសាស្ត្រដាំដុះ ការបាញ់ថ្នាំគីមី និងថ្ងៃខែបាញ់

- ប្រវត្តិចំការ និងការដាំដុះ

ជម្ងឺបាក់តេរីលើដំណាំបន្លែ

- ជម្ងឺបាក់តេរីឆេះស្លឹក
- ជម្ងឺបាក់តេរីរលួយក្តោប ឬរលួយផ្កា
- ជម្ងឺបាក់តេរីអុចស្លឹក
- ជម្ងឺបាក់តេរីស្រពោនស្រស់

លក្ខខណ្ឌរាលដាលរបស់ជម្ងឺ

- សំណើមខ្ពស់ ៨០ - ១០០ % សីតុណ្ហភាព ២៥-៣០ អង្សាសេ
- មេរោគចូលក្នុងកោសិការុក្ខជាតិ តាមរុក្ខជាតិរបួស ឬតាមស្លឹកក្នុងកំឡុងពេលភ្លៀងខ្លាំង
- មេរោគរស់នៅក្នុងដីកំប៉ុស្តិ៍មិនទាន់ពុកផុយ រយៈពេល ២ ឆ្នាំ ។

២-ជម្ងឺបាក់តេរីឆេះស្លឹក (រូបទី ១. ២) *Xanthomonas campestris pv. campestris*

- សំណើមខ្ពស់ ៨៥-១០០ % សីតុណ្ហភាព ២៥-៣៥ អង្សាសេ
- មេរោគអាចចូលក្នុងរុក្ខជាតិតាមស្លឹកបាក់ ឬស្លឹកក្នុងកំឡុងពេលភ្លៀងខ្លាំង ឬការស្រោចស្រព
- មេរោគអាចរស់ក្នុងកាកសំណល់កំប៉ុស្តិ៍ មិនទាន់ពុកផុយរយៈពេល ២ ឆ្នាំ
- តែមស្លឹកបង្កើតជាទំរង់អក្សរវេ (V) មានសំលាក និងរាលដាលដល់កណ្តាលស្លឹក
- ជាលិកាស្លឹកពណ៌ខ្មៅនៅកន្លែងកើតជម្ងឺ

ចំណាំ : ជម្ងឺនេះអាចច្រឡំរោគសញ្ញាជម្ងឺអុចស្លឹក

លក្ខខណ្ឌរាលដាលរបស់ជម្ងឺបាក់តេរីរលួយក្តោប (រូបទី ៣. ៤. ៥)

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum

- មេរោគរស់នៅក្នុងដី និងកាកសំណល់រុក្ខជាតិ
- ជម្ងឺរាលដាលខ្លាំងនៅពេលអាកាសធាតុសើមយូរ
- ជម្ងឺរាលដាលពីកន្លែងដែលរុក្ខជាតិមានរបួស និងកន្លែងដាច់ជាលិកា
- ការដាំដុះការប្រមូលផល និងសត្វល្អិតស៊ីបំផ្លាញជាកន្លែងដែលបាក់តេរីជ្រៀតចូលបាន

- សំណើម ២៥-៣០ អង្សាសេ

លក្ខខណ្ឌរាលដាលរបស់ជំងឺបាក់តេរីអុចស្លឹក (រូបទី ៦.៧)

- មេរោគរស់នៅក្នុងគ្រាប់ពូជ និងកាកសំណល់រុក្ខជាតិ
- ជំងឺរាលដាលខ្លាំង នៅពេលភ្លៀងមានរយៈពេលយូរ និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ។


៣-ជំងឺបាក់តេរីស្រពោនស្រស់ (រូបទី ៨.៩.១០)

Ralstonia solanacearum;

- ដំណាំជម្រក ប៉េងប៉ោះ ដំឡូងបារាំង ម្ទេស ត្រប់ និងត្រសក់

លក្ខខណ្ឌរាលដាលរបស់ជំងឺបាក់តេរីស្រពោនស្រស់

- មេរោគរស់នៅក្នុងដីបានយូរ ដោយគ្មានកាកសំណល់រុក្ខជាតិ
- មេរោគអាចចូលក្នុងកោសិការុក្ខជាតិ តាមរយៈឫសដាច់ សត្វល្អិត ណេមាតូត និងការដាំដុះ
- សីតុណ្ហភាព និងសំណើមដីខ្ពស់
- ដំណាំកើតជំងឺមួយៗ ឬកើតជាក្រុមពាសពេញចំការ
- រោគសញ្ញាដំបូងស្លឹកស្រពោនខាងចុង រយៈពេល ២-៣ ថ្ងៃ ស្លឹកស្រពោនរហូតដល់ក្រោម
- បាក់តេរីរាលដាលក្នុងដើមរុក្ខជាតិ
- ចុងក្រោយសរសៃរុក្ខរសមានពណ៌ត្នោត នៅគល់ក្បែរដី



១~ ជំងឺធាក់តើរនេះស្លឹក



២~ ជំងឺធាក់តើរនេះស្លឹក

៣~ ជំងឺធាក់តើរនេះរូបស្លែក្លាប



៤~ ជំងឺធាក់តើ រូបស្លែក្លាប

ស្លែក្តោប



៥~ ជម្ងឺបាក់តេរី រលួយក្តោប

ស្លែបូកគោ



៦~ ជម្ងឺបាក់តេរី អុចស្លឹក



មើងបោះ





ស្លែបូកគោ



៧~ ជម្ងឺបាក់តេរី អុចស្លឹក


៨. ជំងឺធុរកំភ័ក្ត្រ ក្នុងពោធិ៍សាត់



៩~ ជម្ងឺធាក់តើ ត្រូវពោលត្រូវសំ




ជំនាំរម្ង:




ជំនាំត្រូវសំ:

១០~ ការកាត់មេករកធាក់តើអ្វីស



១១~ រោគសញ្ញាជម្ងឺបង្កឡើងដោយកត្តាគ្មានជីវិត




កង្វះសារធាតុគី

មើលបោះ



រោគសញ្ញាត្រូវការកំខ្លាំង

មើលបោះ



កង្វះសារធាតុកាល់ស្យូម

ការកំណត់ចំណង និងវិធានការ គ្រប់គ្រងជម្ងឺវីរុស

ភ្នាក់ងារចំលងជម្ងឺវីរុស (រូបទី ១)

- ភ្នាក់ងារចំលងជម្ងឺវីរុសបំផ្លាញដំណាំអំបូរប៊ុនីយារីដា
- ដំណាំអំបូរប៊ុនីយារីដាពាក់ព័ន្ធជាមួយពពួកសត្វល្អិត ដែលជាភ្នាក់ងារចំលងជម្ងឺវីរុសពីជំរកមួយទៅជំរកមួយទៀត
- ភ្នាក់ងារដែលនៅក្នុងអំបូរផ្សេងគ្នាដូចជាទ្រីបក៏ជាភ្នាក់ងារចំលងជម្ងឺវីរុសដែរ
- វីរុស គឺជាភ្នាក់ងារបង្ករោគតែមួយគត់ដែលអាចរស់នៅក្នុងសត្វល្អិត (វិកទ័រ) និងកោសិកាក្នុងជាតិ
- ភ្នាក់ងារចំលងជម្ងឺវីរុសគឺ *Frankliniella* ហើរមកពីបស្ចិមប្រទេស ទ្រីប *tabaci* និងទ្រីបអំបូរថ្មីទៀត ត្រូវបានកត់ទុកក្នុងបញ្ជី ឧ-ទ្រីប *Ceratothripoides claratris* មកពីប្រទេសថៃ ។
- ពពួកទ្រីបមកពីបស្ចិមប្រទេស (*F. occidentalis*) គឺមានជំរកជាច្រើនបំផ្លាញដំណាំផ្សេងៗ ដូចជាដំណាំផ្កា និងបន្លែ ។ *F.fusca* គឺជាវិកទ័រដែលបំផ្លាញដំណាំសណ្តែកដីដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច (Groundnut bud necrosis) និង *T. tabaci* ចំលងជម្ងឺវីរុសលើដំណាំខ្នុរម្លិក និងដំណាំខ្នុរម្រាំង ។

វីរុស	ត្រីប
- CaCV = Capsicum chlorosis virus	- Ceratothripoides claratris
- CCSV* = Calla Lily Chlorotic Spot Virus	- Thrips palmi
- CSNV = Chrysanthemum stem necrosis virus	- F. occidentalis, F. schultzei
- GRSV = Groundnut ring spot virus	- F. occidentalis, F. schultzei, F. intonsa
- INSV = Impatiens necrotic spot virus	- F. occidentalis, - F. schultzei, F. intonsa
- IYSV = Iris yellow spot virus	- T. tabaci
- MYSV = Melon yellow spot virus	- T. palmi
- PBNV = Peanut bud necrosis virus	- Scirtothrips dorsalis
- PCFV = Peanut chlorotic fan virus	- S. dorsalis
- PYSV = Peanut yellow spot virus	- S. dorsalis
- PSMV = (Physalis severe mottle virus) = an isolate of MYSV	- unknown
- TCSV = Tomato chlorotic spot virus	- F. occidentalis, F. schultzei
- TSWV = Tomato spotted wilt tospovirus	- F. occidentalis, F. schultzei, F. intonsa, F. fusca, F. bispinosa, Thrips tabaci, T. setosus
- TYFRV* = Tomato yellow fruit ring virus (=ToVV, Tomato Varamin virus)	- T. tabaci, Microcephallothrips abdominalis (?)
- TYRV* = Tomato yellow ring virus	- Thrips noted but not identified
- WBNV = Watermelon bud necrosis virus	- T. palmi
- WSMoV = Watermelon silver mottle virus	- T. palmi
- ZLCV = Zucchini lethal chlorosis tospovirus	- F. zucchini

វដ្តជីវិតត្រីប (រូបទី ២)

- ទ្រីបផ្ទុកវីរុសនៅដំណាក់កាលដង្កូវ ។ ពេលដែលវីរុសផ្ទុកក្នុងដំណាក់កាលដង្កូវវាអាចចំលងទៅដំណាក់ កាលបន្តបន្ទាប់ទៀត
- ដំណាក់កាលមេពេញវ័យ គឺជាដំណាក់កាលដែលចំលងជម្ងឺវីរុសទៅរុក្ខជាតិពីដើមមួយទៅដើមមួយ
- ទ្រីបជញ្ជក់ស្លឹករុក្ខជាតិអោយផ្ទុះឆ្មាយរហូតដល់កោសិការុក្ខជាតិ និងស្លឹករុក្ខជាតិជាប់ប្រឡាក់ទឹកមាត់របស់សត្វល្អិតនៅត្រង់ចំនុចនេះ វីរុសបានចំលងទៅរុក្ខជាតិ

ដែលផ្តល់ឱកាសអោយវីរុសជ្រៀតចូលទៅក្នុងកោសិការុក្ខជាតិ និងបង្កអោយ
រុក្ខជាតិកើតជម្ងឺ ។

ការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យភ្នាក់ងារចំណង

- ភ្នាក់ងារចំណង (ទ្រីប) វិធានការគ្រប់គ្រងដោយប្រើអន្ទាក់ស្អិតពណ៌ខៀវ និងរាប់
ចំនួនដើម រុក្ខជាតិ។ ទ្រីប ដែលគ្មានផ្ទុកវីរុសជញ្ជក់រុក្ខជាតិ អាចឃើញស្នាម
បំផ្លាញច្បាស់ ។
- ស្នាមជញ្ជក់បស់ទ្រីបដែលចំណងជម្ងឺវីរុសមានសភាពផ្សេងៗគ្នា ហើយបន្ទាល់ទុក
ស្នាមបំផ្លាញពណ៌ខ្មៅនៅ ត្រង់កន្លែងដែលបានជញ្ជក់ ។
- ដាំ ដំណាំដែលងាយរងជម្ងឺដូចជាដំណាំលំអ និងដំណាំអំបូរ ភីទូនីញ៉ា ។

**វិធានការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យរោគសញ្ញាជម្ងឺវីរុស (រូបទី ៣. ៤. ៥.
៦. ៧. ៨. ៩)**

- ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានរោគសញ្ញា និងរោគសញ្ញាជម្ងឺ
- ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានភ្នាក់ងារចំណង
- វិភាគតាមមន្ទីរពិសោធន៍ ដើម្បីពិនិត្យរោគសញ្ញាជម្ងឺ
- អនាម័យ ឬដកដើមកើតជម្ងឺចោល
- បំបាត់ជំរកសត្វល្អិតចំណងជម្ងឺ
- ដាំដុះពូជធន់ទ្រាំជម្ងឺ ប៉ុន្តែគ្មានប្រភពពូជធន់ទ្រាំជម្ងឺ
- បន្ថែមវិធានការគ្រប់គ្រងជម្ងឺផ្សេងៗទៀត

គោលការណ៍ណែនាំក្នុងការសរសេររបាយការណ៍

- សេចក្តីផ្តើម
- គោលបំណងនៃការសិក្សា
- សម្ភារៈ
- វិធីសាស្ត្រអនុវត្ត
- ទិន្នន័យដែលត្រូវប្រមូល
- ការបង្កើតសំនួរ

ជម្ងឺរាងឈើស្លឹក

ព័ត៌មានលំអិតពីវដ្តជីវិត វិធានការគ្រប់គ្រង និងរោគសញ្ញាជម្ងឺ

- ស្លឹកដណ្តាំរុញខ្លាំង
- ស្លឹកដណ្តាំមានទំហំតូច
- ស្លឹករុញផ្នែកខាងលើ បន្ទាប់មករមូលចូលគ្នា
- ស្លឹកលេចចេញពណ៌លឿងតាមតែមស្លឹក ឬតាមទ្រនង់
- ផ្កាស្លឹក
- ដណ្តាំមានផ្លែ ២ ឬ ៣ បន្ទាប់ពីកើតជម្ងឺ
- ទិន្នផលទាប
- ទំហំផ្លែមិនល្អ

ដណ្តាំដែលកើតជម្ងឺរាងឈើស្លឹក

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះទូទៅ	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះទូទៅ
Cyphomandra betacea	tamarillo	Phaseolus vulgaris	សណ្តែកបារាំង
Datura stramonium	common thornapple	Physalis virginiana	perennial ground cherry
Lycopersicon esculentum	ប៉េងប៉ោះ	Solanum melongena	ត្រប់
Nicandra physalodes	Wild hops	Solanum pseudocapsicum	Jerusalem cherry
Nicotiana benthamiana	Native wild tobacco	Solanum seaforthianum	ផ្កាម្លិះ
Nicotiana tabacum	ថ្នាំជក់	Solanum tuberosum	ដំឡូងបារាំង
Petunia x hybrida	Petunia	Zinnia elegans	Zinnia

ការរាលដាលរបស់ជំងឺតាមរយៈរុយស

- រុយសរស់នៅលើដំណាំជាច្រើនប្រភេទ ដូចជាប៉េងប៉ោះ ថ្នាំជក់ ត្រសក់ ដំឡូងបារាំង ព្រមទាំងអំបូរស្មៅ ជាច្រើនប្រភេទ
- ដំណាំមួយចំនួនដូចជាត្រប់ មិនបង្ហាញរោគសញ្ញាជំងឺរុយសទេ

ការផ្ទុក និងការចំលងវីរុស (រូបទី ១០)

- ការផ្ទុកវីរុសបន្ទាប់ពីសត្វល្អិតជញ្ជក់រុក្ខជាតិកើតជំងឺបានរយៈពេល១៥ ទៅ ៣០នាទី ក្រោយមក ។
- វីរុសជ្រាបចូលតាមរយៈសត្វល្អិតក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង
- ការចំលងវីរុស រយៈពេល ១៥ នាទី
- រុយសរក្សាទុកជំងឺវីរុសបានរយៈពេល ២០ថ្ងៃ និងមិនអាចចំលងទៅកូនចៅជំនាន់ ក្រោយទៀត ។
- រោគសញ្ញាលេចចេញលើរុក្ខជាតិបន្ទាប់ពី ១០ ទៅ ១៤ថ្ងៃ

លក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន

- អាកាសធាតុក្ដៅ និងសំណើមខ្លាំង
- រុយសចេញពេលភ្លៀងខ្លាំង
- ជំងឺរុញលឿងស្លឹកមិនទាក់ទងនឹងរដូវកាលទេ គឺសំខាន់អាស្រ័យលើវត្តមាន និង អវត្តមានពពួកភ្នាក់ងារចំលង
- ស្មៅ និងដំណាំដូចជាថ្នាំជក់ គឺជាជំរករបស់ជំងឺរុញលឿងស្លឹក

គំនិតខ្លះៗលើវិធានការកំចាត់ជំងឺ

ពន្យារពេល - ពន្យារពេល - ពន្យារពេល ភ្នាក់ងារចំលងទៅដំណាំ ហួសពេលបំផ្លាញ អាចបាត់បង់ទិន្នផលតិចតួច

- កូនសំណាបលូតលាស់ល្អ (ដាំក្នុងផ្ទះសំណាញ់)
- រុយសជាពពួកភ្នាក់ងារចំលងដែលចូលចិត្តស៊ីរុក្ខជាតិខ្ចី
- ចៀសវាងដាំដំណាំប៉េងប៉ោះដដែលៗ

គំនិតខ្លះៗលើវិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺ


- ដកដើមប៉េងប៉ោះដុះម្តុំ ថ្នាំជក់ និងស្មៅចង្រៃចេញអោយស្អាត

- សំអាតគ្រាប់ពូជ និងបង្កើតប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនៅពេលដាំ ឬប្រើប្រព័ន្ធស្រោចស្រពតាមដំណាក់ទឹក
- ដាំ ដំណាំខ្ពស់ៗជារបង ដូចជាពោត
- ដាំ ដំណាំដោយគ្របបង្កស្លឹកធម្មតា ឬបង្កស្លឹកការពារពន្លឺ
- ប្រើថ្នាំគីមី ឬថ្នាំផ្សំពីរុក្ខជាតិ ដើម្បីកំចាត់រុយស
- អនាម័យចំការ៖ រៀនកត់សំគាល់រោគសញ្ញាដំបូងដើមត្បើ និងដើមកើតជម្ងឺរញ្ជលឿងស្លឹក និងច្រកដើមកើតជម្ងឺក្នុងចង្ក់ជាពិសេស គឺនៅសប្តាហ៍ទី៣ និងទី៤ ។
គួរការពាររុយសចំលងជម្ងឺពីដើមកើតជម្ងឺទៅ ដើមល្អ ។


**ចំណុចសំខាន់ដើម្បីសិក្សានៅសាលារៀនចំការកសិករ
និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ**

- ការសិក្សាពីការចំលងជម្ងឺរុស
- ការរាលដាលនៃរោគសញ្ញា
- ពពួកស្មៅដែលជាជំរកជម្ងឺរុស
- ការសិក្សាពីវិធានការគ្រប់គ្រងជម្ងឺរុស
- តើយើងអាចរៀបចំមេរៀនតាមប្រធានបទខាងលើនេះបានទេ?

១. ពពួកស្មាត់ងារចម្លងជម្ងឺវីរុស



២. ការផ្ទុក និងការចំណងជម្ងឺ



៣. រោគសញ្ញាជម្ងឺវីរុសលើដំណាំបន្លែ




ម៉េចនោះ




ម្ទេស



ផ្លូវជក់



ដំណាំលម្អ




សណ្តែកដំ

៤. រោគសញ្ញាជម្ងឺវិវិដលើដំណាំប៉េងប៉ោះ




ជម្ងឺរុញលើស្លឹក



ប៉េងប៉ោះ


ជម្ងឺរុញស្លឹក



ជម្ងឺរុញស្លឹកពណ៌លើស្លឹក(ខ្ចីមធារាំង)

រោគសញ្ញា លើខ្ចីមធារាំង

ពណ៌ត្នីដូចពេជ្រ ស្លឹករលួយផ្លែក
ខាងចុង ជាពិសេសរលួយផ្លែក
ដែលផ្ទុកគ្រាប់ពូជខ្ចីមធារាំង។
រុបស្លឹកពណ៌លើស្លឹកខ្ចី ធាក់ធ្លាក់
និងធាត់បង់គ្រាប់ពូជ ។




ស្លាមរុបពណ៌ខ្មៅលើស្លឹកគឺបណ្តាលមក
ពីរុញបង្កដោយជម្ងឺវិវិដ

ស្លាមរុបពណ៌សគឺបណ្តាលមកពី
រុញបង្កដោយជម្ងឺវិវិដ


ការសំគាល់ស្លាមជញ្ជក់សត្វល្អិត



៥-ជម្ងឺវីរុសលើដំណាំស្ពៃ



៦-ជម្ងឺវីរុសលើដំណាំត្រសក់



៧-រោគសញ្ញាកើតលើដំណាំផ្កា




៨- ដើមមានជម្ងឺ

ដើមលូតលាស់ល្អ

ស្លឹកដំណាំរុញ

លើ្រងស្លឹកបន្លោះប្រូតូដូ និងគេមស្លឹក



ម៉េចឆេះ

អ្នកស្រាវជ្រាវ



ឫបទី ៩

ក្របី

អ្នកស្រាវជ្រាវ




ផ្លែស្វាយ



ផ្លែស្វាយ

UGA1243055




១០_ការរាលដាលជំងឺ



ជំងឺវីរុសចំណងការរយៈ រុយស

រុយសរស់នៅលើដំណាំជាច្រើនប្រភេទ

ដូចជាម៉េចឆ្កែ ឆ្កែក ត្រសក់ ដំឡូងឆ្ការ ព្រមទាំងស្មៅជាច្រើន
ដំណាំខ្លះដូចជាត្រប់ មិនបង្ហាញរោគសញ្ញាជំងឺវីរុសទេ



វដ្តជីវិតរុយស



ខ្លឹមសារ

**និងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពី
និងវិធានការគ្រប់គ្រង**

ការងារបង្កប់មីផ្សិត (រូបទី ១)

- ផ្សិតមានទ្រង់ទ្រាយតូច អាចមើលឃើញតាមរយៈមីក្រូទស្សន៍
- គ្មានជញ្ជាំងកោសិកា
- បង្កើតស្ព័រ និងសរសៃមីសេលរួម
- ភាគច្រើនរស់នៅក្នុងកាកសំណល់រុក្ខជាតិ
- ចំណងតាមរយៈខ្យល់ ទឹក និងសត្វល្អិត អាចចំណងតាមសត្វពាហនៈ និងមនុស្ស

លក្ខណៈទូទៅនៃ វិធានការគ្រប់គ្រងមីផ្សិត

- ដាំដុះពូជធន់ទ្រាំជម្ងឺ
- ដាំដុះពូជដែលគ្មានផ្ទុកមេរោគ
- កាត់សំអាតមែករុក្ខជាតិ ឬជីវករបស់ភ្នាក់ងារបង្ករោគ
- ដាំដំណាំឆ្លាស់
- កាប់បំផ្លាញជីវកផ្សេងៗទៀតរបស់ភ្នាក់ងារបង្ករោគ
- សំអាតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងធុងស្រោចស្រព
- ធ្វើចង្កូរបង្ហូរទឹកអោយបានសមស្រប និងដាំដំណាំមានខ្យល់គ្រប់គ្រាន់
- ជំរុញការប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារប្រឆាំងជម្ងឺផ្សិត
- បាញ់ថ្នាំផ្សិត លើរុក្ខជាតិ គ្រាប់ពូជ ឬកន្លែងដែលសាបកូន ក្នុងករណីចាំបាច់ ។

ការងារបង្កប់មីបាក់តេរី (រូបទី ២)

- បាក់តេរីមានកោសិកាតែមួយ និងអាចមើលឃើញតាមរយៈ មីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រូនិច
- បាក់តេរីអាចបំបែកកោសិកាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល ២០នាទី វាអាចបំបែកខ្លួនដោយកោសិកា ២ ទៅ ៤ ហើយចំនួនរបស់វាកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស
- បាក់តេរីរស់នៅក្នុងកាកសំណល់រុក្ខជាតិ គ្រាប់ពូជ ដើមដុះម្សៅ ក្នុងដី និងទឹក
- ចំណងតាមការប៉ះ បែកបាក់អំឡុងពេលធ្វើការនៅក្នុងចំការ ឬ តាមរយៈទឹក សត្វល្អិត ឬរុក្ខជាតិ
- អាចបណ្តាលអោយអុចស្លឹក និងឆេះស្លឹក រលួយស្រទន់ និងស្រពោន ។

លក្ខណៈទូទៅ នៃវិធានការគ្រប់គ្រងជម្ងឺឆ្លង

- ដាំដុះពូជធន់ទ្រាំ
- ដាំដុះពូជដែលគ្មានជម្ងឺ ឬកូនសំណាបល្អ
- ដកសំអាតដើម និងកាត់មែករុក្ខជាតិដែលកើតជម្ងឺចោល ហើយបំបាត់ការចម្លងជម្ងឺ តាមឧបករណ៍កសិកម្ម ក្រោយពីប៉ះដើមដែលកើតជម្ងឺរួច ។
- គ្រប់គ្រងទឹក និងការដាក់ជីអោយបានត្រឹមត្រូវ
- ដាំដំណាំឆ្លាស់ក្នុងចំការដែលគ្មានជំរកជម្ងឺ
- ប្រើជីជំនួយស្លឹក និងសារធាតុទង់ដែង (ចំពោះជម្ងឺអុចស្លឹក) ។

ការងារបង្កជម្ងឺវីរុស (រូបទី ៣)

- វីរុសមានទំហំតូចផ្ទុកដោយច្រវាក់ ARN និង ADN គ្មានកោសិកា និងជញ្ជាំងកោសិកាទេ ។ វាអាចបន្តពូជតាមកោសិកាមានជីវិត និងបំផ្លាញពពួកមីក្រូសរីរាង្គសត្វពាហនៈ និងរុក្ខជាតិ ។ យើងអាចមើលឃើញវីរុសតាមរយៈមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រូនិច ។
- វីរុសបំផ្លាញដំណាំបណ្តាលអោយក្រិន ស្លឹកពណ៌លឿង រុញស្លឹក មានពណ៌ចម្រុះ រាលដាលឆាប់រហ័ស ។
- ចម្លងតាមរយៈការបន្សាំ ការកាត់មែក មើម មេកានិច គ្រាប់ពូជ លំអងផ្កា សត្វល្អិត ណេមាតូត និង ផ្សិត ។

លក្ខណៈទូទៅនៃវិធានការគ្រប់គ្រងជម្ងឺវីរុស


- ដាំដុះពូជដែលធន់ទ្រាំ
- ប្រើពូជដែលគ្មានជម្ងឺវីរុស
- ការពារដំណាំពីភ្នាក់ងារចម្លងជម្ងឺវីរុស (ឧ-គ្របសំណាញ់ អន្ទាក់ទឹក អន្ទាក់ស្អិត និងបាញ់ថ្នាំផ្សំពីរុក្ខជាតិ)
- ដកសំអាតស្មៅដែលជាជំរកសត្វល្អិត ។

ការងារបង្កជម្ងឺណេមាតូត (រូបទី ៤. ៥. ៦)

- ណេមាតូតមានរាងដូចដង្កូវ មិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកទទេបាន ។
- ណេមាតូតរស់នៅក្នុងទឹក និងដី
- ណេមាតូតមួយចំនួនអាចប្រើធ្វើជាថ្នាំជីវសាស្ត្រ ប៉ុន្តែណេមាតូតមួយចំនួនទៀតជាពពួកបង្កជម្ងឺ
- ណេមាតូតអាចបន្តពូជតាមរយៈពង ។

រូបទី ១


គ្នាភ័ងារបង្កជីវិត



ជីវិត


រូបទី ២

គ្នាភ័ងារបង្កជីវិត




Bacterium

រូបទី៣- ការងារបង្កជម្ងឺវីរុស



វីរុស



ការវិវត្តន៍ជម្ងឺវីរុសក្នុងស្រូវ



ជម្ងឺវីរុសក្នុងស្រូវ




ជម្ងឺវីរុសក្នុងស្រូវ




ជម្ងឺវីរុសក្នុងស្រូវ

រូបទី៤~ ការកំណត់រូបរាងនៃសត្វលោម



រូបទី៥~ ជំងឺកង្វះសណ្តែកលោម (សណ្តែក ស៊ីប៊ីយ៉ាញូរូកូសាតិ)



ឯកសារយោង

1. Vegetable Disease a Practical Guide on Cucurbit, Crucifer, Pepper and Tomato disease, Lecture by Lowel L. Black at the Regional Training on Disease Diagnosis, Ecology & Management Phnom Penh, Cambodia, September 2007
2. Tospviruses- Background, Lecture by Prabhat Kumar, Phd, Department of Entomology & Agril. Zoology, Rajendra Agriculture University, Pusa, India at the Regional Training on Disease Diagnosis, Ecology & Management Phnom Penh, Cambodia, September 2007
3. Concept and Principles of Disease and Management, Lecture by Marilyn G. Patricio, PhD Professor in Entomology/ Plant Pathology CLSU, Philippines at the Regional Training on Disease Diagnosis, Ecology & Management Phnom Penh, Cambodia, September 2007
4. Bacterial Diseases of Vegetables: Ecology and Identification Lecture by Marilyne G. Patricio, PhD Professor in Entomology/ Plant Pathology CLSU, Philippines at the Regional Training on Disease Diagnosis, Ecology & Management Phnom Penh, Cambodia, September 2007
5. Identification of Plant- Parasitic Nematodes, Lecture by Pyone Pyone Kyi, Plant Protection Division at the Regional Training on Disease Diagnosis, Ecology & Management Phnom Penh, Cambodia, September 2007

